

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})Trésorier : M. P. OMISOS, 9, cours du Docteur-Long, Lyon (3^e)

ABONNEMENT ANNUEL : France et Colonies Françaises : 700 francs — C.C.P. Lyon 101-98
Etranger 800 francs

qu'entre Erzincan et les environs de Sanandadj, en Iran, où apparaissent les nombres de 28 à 30 chez *sennanensis*.

Pour ces différentes raisons, il semble bien douteux qu'il existe des populations à formules intermédiaires entre celle d'*hopfferi* et celle de *sennanensis*. C'est pourquoi, considérant, comme dans le cas précédent, qu'un caractère cytologique valable s'ajoute maintenant aux caractères alaires très nets séparant déjà *sennanensis* d'*hopfferi*, je pense que le premier peut être considéré comme une bonne espèce.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 10 octobre 1959.

LES PAPILLONS DE SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE (LOIRE)

par R. MOUTERDE.

Depuis plusieurs années, je fais tous les ans un séjour assez prolongé dans cette localité, située en plaine à 10 km N.O. de Roanne. Des attaches familiales m'y invitent, mais je ne recommande pas l'endroit aux lépidoptéristes libres de leur choix.

Le pays en effet est tout en cultures : champs labourés, prairies fauchées ou pâturées. Les haies comportent les arbustes courants : aubépines, prunelliers, fusains, ronces, etc..., avec de vigoureux chênes. Dans le vallonement du ruisseau, des peupliers, des aulnes, des frênes. Quelques résineux d'ornement. Le climat, en un genre différent, ferait penser plutôt aux Dombes qu'à l'Ouest ou au Sud Lyonnais. Ici, pas de vergers d'abricotiers ou de pêcheurs ; les cerises même y gèlent souvent. Le soir, l'humidité monte vite des prés de rivière, à tendance un peu marécageuse.

J'ai pratiquement toujours été là-bas en août et septembre, trop tard pour la chasse à vue (qui pourrait être intéressante en mai, juin et juillet dans les coins bien exposés de la Côte Roannaise, aux gorges de la Loire, aux Monts de la Madeleine). Ne prenant rien à la vue, j'ai utilisé ces dernières années la lampe à vapeur de mercure en chasse de nuit. J'ai attiré des centaines de papillons, qui se répartissent en gros de la façon suivante :

1°) Faune ubiquiste, comprenant l'immense majorité des individus. Inutile de citer les espèces, sinon pour relever la surabondance excessive de certaines : *Ag. c nigrum* L. ; *F. exclamationis* L. ; *Th. processionea* L., etc... Par contre et comme à Lyon, *E. segetum* Schiff. est devenu peu abondant.

2°) Faune plutôt septentrionale et de prés humides. Notons la présence de *Par. egeria* L. sous sa forme *intermedia* Weism. comme en Dombes ; la surabondance de *Th. popularis* Fab., de *Omp. lunosa*, Haw. ; et aussi quelques meilleures espèces : *Ep. simulans* Hfn., *Pyg. anachoreta*, *Dr. curvatula* Bkh., *Dr. lacertinaria* L., *Cer. furcula* Cl. Très peu d'espèces de marais : *Phr. typhae* Thnbg., *Ar. pygmina* Haw., *Ac. niveus* Oliv.

3°) Enfin, quelques captures inattendues, d'affinités plutôt méridionales (ou atlantiques ?) : *Ap. mesogona* God., *E. temera* Hb., *Rh. jodea* Gn., *En. quercaria* Hb., *Syn. sociaria* Hb., *Cos. puppillaria* Hb.

- Amphipyra pyramidea* L. ac.
 — *livida* Schiff. 3 ex.
 — *tragopoginis* L.
Dipterygia scabriuscula L.
Trachea atriplicis L. ac.
 — *secalis* L. c.
Procus furuncula Schiff. c.
Palluperina testacea Schiff. tc.
 — *dumerili* Dup. c.
Trigonophora meticulosa L.
Bryophila perla Schiff.
 — *algae* Fab.
 — *ravula* Hb. tc.
 — *divisa* Esp. r.
Thalpophila matura H. S. tc.
Craniophora ligustri Schiff. c.
Acronycta rumicis L. c.
 — *psi* L.
 — *megacephala* Schiff. ac.
 — *leporina* L.
Laphygma exigua Hb. ar.
Athetis blanda Schiff.
 — *ambigua* Schiff. tc.
 — *clavipalpis* Scop. ac.
Pyrrhia umbra Hfn.
Calymnia affinis L. ar.
 — *trapezina* L. ac.
Phragmatiphila typhae Thnbg.
 1 ex.
Arenostola pygmina Haw. ar.
Erastria trabealis Scop.
Tarache lucida Hfn.
Sarothripus revayana Scop. 1 ex.
Hylophila prasinana L. ac.
Catocala nupta L. ac.
 — *elocata* Esp. tc.
Phytometra chalcytes Esp. 1 ex.
 — *festucae* L. ac.
 — *confusa* Steph.
 — *gamma* L. c.
 — *chrysitis* L. c.
Unca triplasia L. c.
Acontia luctuosa Esp.
Asticta cracca Fab. 1 ex.
Rivula sericealis Scop. c.
Laspeyria flexula Schiff. ac.
Scoliopteryx libatrix L.
Schrankia costaestrigalis Steph. r.
Hypena proboscidalis L. c.
Dasychira fascelina L.
Lymantria dispar L.
Euproctis phaeorrhœa Don.
Callimorpha quadripunctaria Poda
Herse convolvuli L.
Acherontia atropos L. 1 ex.
Hyloicus pinastri L.
Mimas tiliae L.
Sphinx ocellata L.
Amorpha populi L. tc.
Macroglossa stellatarum L.
Celerio euphorbiae L.
Pergesa elpenor L.
 — *porcellus* L.
Palimpsestis duplaris L.
 — *ocularis* L.
Cerura furcula Cl. 1 ex.
 — *bifida* Hb. ac.
Hoplitis milhauseri Fab. 1 ex.
Gluphisia crenata Esp.
Pheosia tremula Cl. c.
Notodonta dromedarius L.
 — *ziczac* L.
 — *phoebe* Sieb.
Lophopteryx camelina L. c.
Pterostoma palpina L. c.
Pygaera curtula L.
 — *anachoreta* Fab. 1 ex.
 — *pigra* Hfn.
Thaumetopoea processionea L. tc.
 — *pityocampa* Schiff.
Abraxas grossulariata L.
Lomaspilis marginata L.
Ligdia adustata Schiff.
Lomographa trimaculata Vill.
Cabera exanthemata Scop. c.
Pingelera capraeolaria Schiff.
Campaea margaritata L. ac.
Ennomos alniaria L. ac.
 — *fuscantaria* Steph. ac.
 — *erosaria* Schiff.
 — *quercaria* Hb. 1 ex.
Selenia bilunaria Esp.
Phalaena syringaria L. ac.
Crocallis elinguaris L.
Plagodis dolabraria L. ac.
Opisthograptis luteolata L. tc.
Semiothisa alternaria Hb.
Synopsis sociaria Hb. 3 ex.
Boarmia rhomboidaria Schiff. tc.
 — *manuelaria* H. S. ar.
Tephronia sepiaria Hfn.

- Pachycnemia hippocastanaria* Hb. — *lacertinaria* L.
1 ex. — *binaria* Hfn. ac.
- Selidosema taeniolaria* Hb. 1 ex. *Cilix glaucata* Scop. ac.
Chiasma clathrata L. *Homeosoma nebulella* Hb.
Aspilates gilvaria Schiff. 1 ex. *Alispa angustella* Hb. ac.
— *ochrearia* Rossi 1 ex. *Euzophera pinguis* Haw.
Ortholita chenopodiata L. *Epischinia prodromella* Hb.
Cidaria prunata L. *Nephoptyx semirubella* Scop. tc.
— *ocellata* L. *Phycita spissicella* Fab.
— *obeliscata* Hb. *Dioryctria mutata* Fuchs
— *designata* Hfn. *Eurhodope advenella* Zinck. ac.
— *rubidata* Schiff. *Calamotropha paludellus* Hb.
— *picata* Hb. *Crambus inquinatellus* Schiff.
— *bilineata* L. — *tristellus* Schiff.
— *alternata* Müll. — *luteellus* Schiff.
— *alchemillata* L. *Ancylolomia tentaculella* Hb.
Euchoeca nebulata Scop. *Acentropus niveus* Olivier 1 ex.
Eupithecia icterata Vill. *Herculia glaucinalis* L.
— *subnotata* Hb. ac. *Cataclysta lemnata* L.
Gymnoscelis pumilata Hb. c. *Lyptotigris ruralis* Scop. tc.
Horisme vitalbata Schiff. *Margaronia unionalis* Hb.
Timandra amata L. *Nomophila noctuella* Schiff.
Scopula immutata L. *Phlyctaenodes palealis* Schiff.
— *imitaria* Hb. — *verticalis* L. c.
Sterrrha dimidiata Hfn. *Diasemia litterata* Scop. ac.
— *degeneraria* Hb. *Mesographe forficalis* L.
— *inornata* Haw. — *martialis* Gn.
— *aversata* L. *Pyrausta sambucalis* Schiff.
— *emarginata* L. — *repandalis* Schiff.
Cosymbia orbicularia Hb. 2 ex. — *cespitalis* Schiff.
— *annulata* Schulze *Cynaeda dentalis* Schiff.
— *pupillaria* Hb. *Orobena extimalis* Scop.
— *punctaria* L. — *straminalis* Hb. 1 ex.
Euchloris smaragdaria Fab. — *limbata* L. ac.
Trichiura crataegi L. *Aphomia sociella* L.
Lasiocampa trifolii Esp. *Galleria mellonella* L.
Drepana falcataria L. ac. *Triodina sylvinus* L.
— *curvatula* Bkh.

Présenté au Groupe de Roanne en sa séance du 19 octobre 1959

NOTES SUR QUELQUES OEDIONYCHINI DE MADAGASCAR

par Jan BECHYNÉ

(Instituto Tropical de Investigaciones Cientificas, El Salvador)

Physomandroya n. gen.

Ce genre se distingue de *Physoma* Weisse par les épipleures des élytres déclives et invisibles de côté, par les côtés du thorax arrondis et épaissis et par l'absence du denticule antéapical à côté externe des tibias postérieurs. Taille ovale, dessus brillant. Génotype : *Physoma decorsei* n. sp.