
BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})

Trésorier : M. P. OMISOS, 9, cours du Docteur-Long, Lyon

ABONNEMENT ANNUEL : France et Colonies Françaises : 700 francs — C.C.P. Lyon 101-98
Etranger 800 francs

Anisodactylus intermedius Dej. — Inond. Rh. à Lyon (GR). Espèce méridionale. A confirmer.

Metophonus brevicollis Serv. — Tous les ex. lyonnais ainsi nommés, que J. OCHS a étudiés, sont en réalité des *puncticeps* Steph. d'après notre collègue. Le véritable *brevicollis* serait méditerranéen. Aussi sa présence dans la région lyonnaise est-elle sujette à caution.

Tachyura inaequalis Kolen. (*bisbimaculatus* Chevr.). — Lyon, bords du Rh. (G). Douteux, à confirmer.

Chlaenius festivus F. — Cité de Miribel (V), par suite de quelque confusion.

Licinus oblongus Dej. — Pilat (REY). Très douteux.

Lebia rufipes Dej. — Citations erronées de St-Jean-d'Ardières (REY) et de Montagny (J).

Brachinus plagiatus Reiche. — Plusieurs ex. existent dans la coll. FALCOZ, étiquetés « Vienne ». Ils ont été dépiqués et repréparés, et une confusion dans la localité en est résultée pour cette espèce méridionale.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 13 mai 1959.

DESCRIPTION D'UNE RACE NOUVELLE DE ZYGÈNE OBSERVÉE DANS LES PYRÉNÉES CENTRALES

par D. LUCAS

Depuis longtemps, une forme de la *Zygaena carniolica*, avait été observée dans les Pyrénées Centrales, dans la région comprise entre Cauterets et Gavarnie, mais dans les localités très restreintes et en petite quantité.

Zygaena carniolica Hb. *descimonti*, n. ssp.

J'ai reçu de mon collègue DESCIMON, agrégé de l'Université, une vingtaine de bons exemplaires de cette zygène, capturés à Aussone, près de Gavarnie (Haute-Garonne), le 31 juillet 1958, sur un terrain de petite étendue.

La forme est peu variable : un seul exemplaire aux ailes supérieures, en dessus, est dépourvu de la tache allongée et extrême. Les sujets sont de grandeur moyenne. Les taches rouges, aux supérieures au-dessus, sont encadrées d'un filet jaune, assez apparent, bien plus que dans certains exemplaires de *Zygaena berolinensis* Stgr., mais ce qui est particulier dans cette forme pyrénéenne, c'est que le dessous des ailes supérieures, présente des taches rouges sur un fond de couleur nettement noirâtre, tandis que dans la forme *berolinensis*, le fond est beaucoup plus clair.

La forme italienne, nommée *podana* Rosci, est très voisine, mais plus grande que *descimonti*.

Il serait intéressant de savoir qu'elle est la nourriture de la chenille de cette nouvelle race.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 10 juin 1959.

BIBLIOGRAPHIE

ALEXANOR, *Revue des Lépidoptéristes Français*, 45 bis, rue de Buffon, Paris (V^e).

Pour faire suite à la Revue de Lépidoptérologie, qui ne paraît plus, notre collègue J. BOURGOGNE, assisté de quelques spécialistes connus, a décidé de créer une nouvelle publication, « Alexanor », du nom d'un des joyaux de la faune fran-