

DICTIONNAIRE

CLASSIQUE

D'HISTOIRE NATURELLE,

PAR MESSIEURS

AUDOUIN, ISID. BOURDON, AD. BRONGNIART, DE CANDOLLE, G. DELA-
FOSSE, DESHAYES, E. DESLONGCHAMPS, DRAPIEZ, DUMAS, EDWARDS,
H.-M. EDWARDS, A. FÉE, D'AUBEARD DE FÉRUSAC, GEOFFROY
SAINT-HILAIRE, ISID. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, GUÉRIN, GUILLE-
MIN, A. DE JUSSIEU, KUNTH, LATREILLE, C. PRÉVOST, A. RICHARD,
et BORY DE SAINT-VINCENT.

Ouvrage dirigé par ce dernier collaborateur, et dans lequel on a ajouté, pour
le porter au niveau de la science, un grand nombre de mots qui n'avaient
pu faire partie de la plupart des Dictionnaires antérieurs.

TOME ONZIÈME.

MO-NSO.

PARIS.

REY ET GRAVIER, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

Quai des Augustins, n° 55 ;

BAUDOUIN FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

Rue de Vaugirard, n° 17.

~~~~~

JANVIER 1827.

leur infusion pour remplacer celle du Thé de la Chine.

**MONARDE FISTULEUSE**, *Monarda fistulosa*, L., Gaertner, de *Fruct.*, t. 66. Originnaire du Canada, cette Monarde est plus grande que la précédente. Sa tige rameuse, articulée, velue, porte des feuilles pétiolées, ovales, lancéolées, arquées, dentées, très-longues, d'un vert pâle. Les fleurs qui sont violacées et tubuleuses forment des capitules terminaux. (A. R.)

**MONARRHÈNE**, *Monarrhenus*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Synanthérées et de la Syngénésie nécessaire, L., établi par Cassini qui l'a placé dans la tribu des Vernoniées. Il présente les caractères essentiels suivans : involucre oblong campanulé, formé d'écaillés imbriquées; les extérieures ovales, oblongues, obtuses, concaves, appliquées, coriaces et velues au sommet; les intérieures étalées, longues, linéaires, scarieuses, luisantes et légèrement frangées sur les bords et au sommet; réceptacle petit, plane et absolument nu; calathide oblongue, n'ayant au centre qu'une fleur régulière et mâle, et à la circonférence un grand nombre de fleurs tubuleuses et femelles. La fleur centrale mâle offre un rudiment d'ovaire extrêmement court et surmonté d'une longue aigrette soyeuse; sa corolle est à cinq divisions munies de glandes sur leur face extérieure; leurs étamines ont le filet large et membraneux; le tube des anthères saillant hors de la corolle, et pourvu d'appendices au sommet ainsi qu'à la base. Les fleurs de la circonférence présentent un ovaire oblong, un peu aminci inférieurement, strié, pourvu à la base d'un gros bourrelet cartilagineux, et surmonté d'une aigrette comme celle de la fleur centrale. La corolle est tubuleuse, grêle, divisée en trois ou quatre divisions longues et étroites. Le style est à deux branches, longues, grêles, glabres et divergentes. Le genre *Monarrhenus* se rapproche beaucoup du *Tessaria* de Ruiz et Pa-

von ou *Gynheteria* de Willdenow. Il se compose de deux espèces que Lamarck a décrites, dans l'Encyclopédie, comme variétés d'une même espèce qu'il nommait *Conyza salicifolia*; Cassini les a nommées *Monarrhenus pinifolius*, et *M. salicifolius*. Ce sont des Plantes ligneuses à rameaux couverts de feuilles linéaires et entières, à fleurs nombreuses disposées en panicules ou en corymbes. Elles croissent dans les îles de France et de Mascareigne. (C. N.)

**MONAS. MICR.** V. MONADE.

**MONASE**, *Monasa*. OIS. (Vieillot.) Syn. de Barbacan. V. TAMATIA. (B.)

**MONAUL**, *Monaulus*. OIS. Genre de la méthode de Vieillot qui correspond à notre genre Lophophore. V. ce mot. (DR. Z.)

**MONAVIA**. BOT. PHAN. (Adanson). Syn. de Mimulus. V. ce mot. (B.)

**MONAX**. MAM. Espèce du genre Marmotte. V. ce mot. (B.)

**MONBIN**. BOT. PHAN. V. MOMBIN et SPONDIAS.

**MONDAIN**. OIS. Race de Pigeons domestiques. (B.)

\* **MONDÉ ET MONDI**. MAM. V. COATI.

**MONE**. MAM. V. GUENON et MONA.

**MONEDULA**. OIS. Nom scientifique du Choucas. V. CORBEAU. (B.)

**MONÉDULE**, *Monedula*. INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Porte-Aiguillons, famille des Fouisseurs, tribu des Bembecides, établi par Latreille et ayant pour caractères : labre en triangle allongé; mâchoires et lèvres formant une promuscule fléchie; côté interne des mandibules ayant deux ou trois dentelures; palpes maxillaires atteignant au moins l'extrémité des mâchoires, de six articles; les labiaux de quatre; cellule radiale et la dernière des cubitales séparées par un intervalle remarquable.

Ces Hyménoptères ressemblent, au