

---

**BULLETIN MENSUEL**

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937  
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES  
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc

**Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>me</sup>)**

Trésorier : M. P. OMISOS, 9, cours du Docteur-Long, Lyon

---

---

**ABONNEMENT ANNUEL** : France et Colonies Françaises : 700 francs — C.C.P. Lyon 101-98  
Etranger . . . . . 800 francs

---

---

années précédentes et que ma lampe à mercure n'en a jamais attiré un seul exemplaire ; pourtant chacun sait que les *Rhizotrogus* viennent bien à la lumière.

Précisons que toutes ces captures ont été faites au « Pont-d'Arc », aux environs immédiats de l'hôtel Labrot, à l'accueil si sympathique.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 13 mai 1959.

## EPHEMEROPTERES DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

par le D<sup>r</sup> J. BALAZUC

La répartition des Ephéméroptères en France est encore très mal précisée. Nous donnons ici une petite liste d'espèces capturées dans le département de l'Ardèche. Trois d'entre elles ont été mentionnées dans la littérature. Les autres ont été recueillies par nous, dans le cycle des recherches que nous poursuivons depuis longtemps sur la faune entomologique du Vivarais. Leur détermination est due à la regrettée M.-L. VERRIER : la mort cruelle et prématurée de cette excellente collègue a interrompu une collaboration qui devait comporter l'étude d'un matériel beaucoup plus important ; et même, de nos récoltes passées, une partie seulement a été examinée. Il reste notamment à identifier les espèces que nous avons capturées dans la rivière d'Ardèche à Pont de Labeaume (mai 1953) et dans la Volane à Antraigues (juillet 1950) : cette dernière localité a livré une larve inconnue à Mlle VERRIER.

### LEPTOPHLEBIIDAE

*Thraululus bellus* Etn. — Tournon, dans le Doux (LÉGER, Mlle GAUTHIER). Pour la répartition, voir M.-L. VERRIER, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1953, pp. 54-55.

*Habroleptoides modesta* Hagen. — Ruisseau de Celles-les-Bains, avr. 1949. Espèce des régions montagneuses (Vosges, Alpes) : cf. H. BERTRAND et M.-L. VERRIER, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1949, pp. 121-124.

### EPHEMERELLIDAE

*Ephemerella ignita* Poda. — Labastide, dans l'Allier, juin 1954. Largentière, dans la Ligne, juin 1954.

### CAENIDAE

*Caenis macrura* Steph. — Largentière, dans la Ligne, juin 1954.

### BAETIDAE

*Baetis bioculatus* L. — Largentière, dans la Ligne, juin 1954. Bourg-St-Andéol, ruisseau de la Fontaine de Tourne, juin 1954.

*Baetis pumilus* Burm. — Largentière, dans la Ligne, juin 1954.

*Baetis* sp. (*rhodani* Pict. ?) — Ruisseau de Celles, avr. 1949.

### ECDYONURIDAE

*Ecdyonurus venosus* F. — Ruisseau de Celles, avr. 1949 (H. BERTRAND et M.-L. VERRIER, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1949, pp. 121-124.

*Ecdyonurus insignis* Eat. — Chauzon, dans l'Ardèche, juin 1950. Casteljau, dans le Chassezac, juin 1954. Voir M.-L. VERRIER, *Rev. Sc. nat. Auvergne*, 1952, pp. 21-25.

*Ecdyonurus fluminum* Pict. — Casteljau, dans le Chassezac, juin 1954.

*Ecdyonurus lateralis* Curt. — St-Etienne-de-Lugdarès, hameau du Bez, dans l'Hubac des Plaines, juin 1954. Labastide, dans l'Allier, juin 1954. Sa répartition, aujourd'hui mieux connue, comprend tout le midi de la France (M.-L. VERRIER, *Rev. Sc. nat. Auvergne*, 1952, pp. 21-25).

*Rhitrogena semicolorata* Curt. — St-Georges-les-Bains (D<sup>r</sup> RIEL, in LACROIX, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 61, 1914, pp. 5-10).

*Rhitrogena aurantiaca* Burm. — St-Georges-les-Bains (*id.*, 65, 1918, pp. 91-97).

*Rhitrogena alpestris* Eat. — Ruisseau de Celles, avr. 1949 (voir : H. BERTRAND et M.-L. VERRIER, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1949, pp. 121-124).

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 9 septembre 1959.

## SUR UNE NOUVELLE FORME DE MICRAGONE (Lépid. Attacide)

par P.-C. ROUGEOT

Aux cinq espèces de *Micragone* obtenues par nous au Gabon, (*M. lichenodes* Holl., *nubifera* Holl., *agathylla elisabethae* Bouv.; *martinae* Roug.; *joicei* Bouv.), il convient d'ajouter une sixième forme encore inédite, que je dédie à ma fille Colette sous le nom de :

### *M. colettae* n. sp.

Holotype : mâle capturé au piège lumineux, par temps pluvieux, à N'Toum (District de Libreville), le 5 mai 1956 (ma collection).

L'autre sexe inconnu.

Envergure : 71 mm.

Antennes : brun-roux clair, quadripectinées (une douzaine d'articles) sur un peu plus de la moitié de leur longueur.

Yeux brun-noir.

Tête, thorax, abdomen brun-roux à brun-violacé, avec de nombreuses écailles jaunâtres, pattes également roussâtres, les tarses étant irrégulièrement marqués d'ocracé.

Carène mésothoracique cachée sous la pilosité ; abdomen nettement plus long que l'aile postérieure.

Tergite VIII brun, en forme de mitre, portant de chaque côté cinq saillies obtuses et noires, celles de la base étant les plus grandes. Ailes antérieures : ont sensiblement la même forme que dans *M. Herilla* Westw. ; grande espèce d'Afrique Occidentale, mais avec la saillie apicale plus anguleuse en dedans, et le bord externe moins fortement denté.

Face dorsale : brun-violet foncé, virant au noirâtre dans une large portion de l'aire externe, au-dessus de la cellule. Frange concolore. Ça et là des mouchetures ou stries jaune-bistre à lilas-pâle, particulièrement nombreuses le long de la costa, et dans la moitié antérieure de la région subapicale.

La plupart des dessins sans netteté ; rayure interne (de la couleur fondamentale, avec une irradiation lilas) oblique dans la cellule, légèrement convexe et plus étroite en arrière de la cubitale ; rayure externe