

---

**BULLETIN MENSUEL**

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937  
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES  
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc

**Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>me</sup>)**

Trésorier : M. P. OMISOS, 9, cours du Docteur-Long, Lyon

---

**ABONNEMENT ANNUEL** : France et Colonies Françaises : 700 francs — C.C.P. Lyon 101-98  
Etranger . . . . . 800 francs

---

## CAPTURES DE LEPIDOPTERES A CRAVANT (YONNE)

(3<sup>me</sup> note)

par P. DARDENNE.

Poursuivant l'inventaire des papillons capturés à Cravant et dans les proches environs, il semble intéressant, tant pour témoigner du caractère hétérogène de la faune de cette région que pour préciser des répartitions géographiques incomplètement connues, de signaler les captures suivantes (les espèces citées sont précédées du n° qu'elles portent au catalogue LHOMME ; pour celles qui n'y ont pas été répertoriées, le n° est celui du catalogue REBEL).

1157. *Lithina partitaria* Hb., 19-4-58, Cravant. Cette espèce méridionale n'était pas connue au nord de la région lyonnaise où elle n'a été que rarement signalée (cat. MOUTERDE, p. 68) ; elle fut toutefois, selon le cat. Lhm. capturée autrefois dans le Cher par SAND.

1255. *Orthonama lignata* Hb., 28-8-58, Cravant. « Espèce surtout septentrionale », écrit le cat. Lhm. ; elle fut signalée par SAND de St-Florent (Cher), la présente capture confirme ce renseignement.

1511. *Sterrha rubraria* Stgr., 20-8-58, Cravant. « Seul l'examen de l'armure génitale auquel j'ai procédé, écrit M. HERBULOT, peut donner une certitude de détermination ». L'espèce est réputée rare, en tout cas elle est difficile à reconnaître.

1546. *Alsophila quadripunctata* Esp., 14-12-58 Cravant. Cette capture appuie la citation du cat. Lhm. : Yonne : Cerisiers (ROMAN).

1929. *Acentropus niveus* Ol., 13-8-58, Cravant. Espèce rarement signalée, selon le cat. Lhm ; M. VIETTE en a observé une éclosion massive au bord de la Saône à St-Jean-de-Losne, Côte-d'Or (Rev. fr. de Lép., tome XI, p. 59).

3505. *Wockia asperipunctella* Bruand, 7-5 et 14-5-56, 17-5-57 St-Bris-le-Vineux (Y.).

3541. *Elachista bedellella* Sirc., 17-5-57, St-Bris-le-Vineux (Y.).

3584. *Elachista polutella* Dup., 3-5-56, Cravant. L'espèce fut signalée par SAND de l'Indre et du Cher, mais le cat. Lhm. doute que ces deux renseignements soient exacts. Le même ouvrage indique juillet comme époque d'apparition, or JANMOULLE (Lambillionea, 1955, p. 82) signale une capture en Belgique le 29-5-55.

3839. *Niphonympha albella* Z., 25-4-56, Voutenay (Y.). L'espèce était très abondante dans une friche parsemée de genévriers ; le papillon n'émerge guère du gazon court et s'y faufile prestement à la moindre alerte ; la difficulté de la capture peut expliquer, au moins partiellement, que cette espèce ait été peu observée.

4278. (cat. Rebel) *Opostega salaciella* Tr., 20-4-57, Cravant.

4657. (cat. Rebel) *Incurvaria rubiella* Bjerck., 12-5-57, Cravant.

4775. (cat. Rebel) *Micropteryx aglaella* Sup., 8-6-57, Cravant. Les papillons dansent dans le soleil à partir de 10 h. T.U. autour des fleurs de deutzia et de troène, se reposant par instants sur les feuilles et les fleurs.

La rédaction de cette note n'a été possible que grâce à l'extrême obligeance des rares spécialistes en « micros », qui ont droit à toute ma gratitude et que je remercie bien sincèrement.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 10 octobre 1959.