

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

**Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>me</sup>)**Trésorier : M. P. OMISOS, 9, cours du Docteur-Long, Lyon (3<sup>e</sup>)

---

**ABONNEMENT ANNUEL** : France et Colonies Françaises : 8 N.F. — C.C.P. Lyon 101-98  
Etranger ..... 9 N.F.

---

à l'exception de l'aire terminale des antérieures qui garde sa couleur cendré-bleuâtre, et de l'aire externe des postérieures qui tourne au brun. — Le thorax, l'abdomen et tout l'ensemble du corps sont envahis par cette teinte brun-rouge.

Type : 1 ♂, Espagne, Province de Sevilla, Villamanrique, 2-IV-56 (ma Collection) ;

Paratypes : 5 ♂♂, id., 6-IV-55 et 2 à 7-IV-56 (Coll. BARAUD et ma Collection) ;

1 ♂, Espagne, Prov. de Madrid, Galapagas, 1-V-55, A. MARTIN leg. (Coll. Museum de Madrid).

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 14 septembre 1960.

## CONTRIBUTION A LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE QUELQUES HELOPINAE FRANÇAIS

Par J.-P. et J.-L. NICOLAS.

L'excellente étude de M. P. ARDOIN sur les Helopinae français, parue récemment dans les Annales de la Société entomologique de France, nous a permis d'étudier enfin convenablement le matériel de ce groupe que nous possédions.

Dans ce travail, une large part est réservée à la répartition géographique des espèces ; il représente certainement à l'heure actuelle la seule mise au point précise à cet égard, et il a fait ressortir l'intérêt d'un certain nombre de captures d'Helopinae faites soit par nous soit par des collègues qui ont bien voulu nous autoriser à les présenter ici.

*Nalassus dryadophilus* Muls. P. ARDOIN dit de lui qu'il « ne semble pas avoir remonté... beaucoup plus haut que le Vaucluse ».

Rappelons d'abord qu'une récente note du Dr H. CLEU nous apprend que cet insecte existe en Ardèche, dans la région d'Aubenas. Par ailleurs, le Dr E. ROMAN a eu la très grande obligeance de nous communiquer la liste des captures de cette espèce qu'il a faites, dans une autre partie de ce département, à la Voulte-sur-Rhône en octobre 1930, mais aussi dans la Drôme : La Forest près Malissard 1940, Malissard avril 1942, Chante-loube près Aouste sept. 1942, Piégros-la-Clastre sept. 1942.

Enfin nous avons eu l'occasion de trouver cet insecte beaucoup plus au N. encore : dans l'extrême S. du département du Rhône, à Condrieu, où nous en avons fait d'assez nombreuses captures en avril 1958 et mai 1959, sous les écorces des peupliers qui poussent dans les alluvions sableuses de la rive droite du fleuve.

*N. dryadophilus* remonte donc le couloir rhodanien jusqu'au S. de la région de Lyon. Au N.E. de cette ville par contre, il existe sur les îles du Rhône (La Pape, Miribel) un biotope très comparable à celui de Condrieu, mais plusieurs prospections ne nous ont pas permis d'y trouver un seul *N. dryadophilus* et aucun spécimen de cette espèce n'a encore été pris dans cette région à notre connaissance.

*N. harpaloides* Küster. P. ARDOIN ne le connaît que du Ventoux. Nous l'avons trouvé à la limite des départements de la Drôme et des Hautes-

Alpes, au col de Cabre : un exemplaire dans une vieille souche de conifère, 22-VII-56, sur le versant W. du col — localité qui semble entièrement nouvelle.

*N. ecoffeti* Küster. de qui P. ARDOIN dit « toute capture certaine à l'E. du Rhône (fleuve) serait intéressante à signaler », existe dans l'Isère ; nous l'y avons trouvé en deux points de ce département, à Communay : Bois de Cornavent, sous des écorces de châtaigniers, avril et mai 1957, et à Cour-et-Buis, mars 1957, dans la partie occidentale des Bois de Bonnevaux. Par ailleurs, le Dr ROMAN, dans une récente note de chasse parue dans le Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon, cite sa capture dans la Drôme.

*N. assimilis* Küster. La citation classique de Dijon est basée sur la capture d'un exemplaire faite au siècle dernier par ROUGET, aux environs immédiats de cette ville : « à Talant, dans la petite combe qui conduit à la route de Plombières, au-dessus du Moulin Vesson, sur une feuille basse de Verbascum, 21 juin 1856 ». Nous avons eu l'occasion d'examiner cet insecte dans la collection ROUGET, conservée au Musée d'Histoire Naturelle de Dijon : capture certaine, mais unique, et peut-être accidentelle, aucune autre n'ayant été faite, à notre connaissance, au N. de Lyon.

*N. laevioctostriatus* Goeze. Espèce très largement répandue, mais totalement absente dans la région dijonnaise, aucun exemplaire n'ayant jamais été trouvé par personne, semble-t-il, sur les terrains calcaires ou les terrains alluviaux de cette région. L'espèce est très abondante en revanche sur les terrains anciens de l'Autunois et du S.W. de la Côte d'Or (environs d'Arnay-le-Duc).

*Probatiscus ebeninus* Villa. Deux exemplaires de cet insecte ont été trouvés à la Sainte-Baume par notre collègue et ami G. LEDOUX (aux alentours de l'Hôtellerie, sous des pierres, 23 juin 1956) et cette capture offre le double intérêt de révéler une localité certainement nouvelle, et de plus située relativement loin de la mer, les captures de France continentale citées jusqu'à présent ayant été faites sur le littoral ou très près de celui-ci.

Avant de terminer, nous ne saurions trop remercier M. P. ARDOIN de l'amabilité avec laquelle il a accepté de confirmer nos déterminations, et des conseils précieux qu'il nous a prodigués, ainsi que nos collègues le Dr ROMAN et G. LEDOUX qui ont bien voulu nous confier certaines de leurs captures et nous autoriser à les publier.

#### BIBLIOGRAPHIE

P. ARDOIN. — Contribution à l'étude des Helopinæ de France. Annales de la Société Entomologique de France, (1958 - vol. 127).

Dr H. CLEU. — Les Helopinæ du Bassin de l'Ardèche. l'Entomologiste tome XV n° 3, juin 1959.

Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon. Notes de chasse, mars 1960.

A. ROUGET. — Catalogue des Insectes Coléoptères du département de la Côte-d'Or.