

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOUT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES

et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>me</sup>)Trésorier : M. P. OMISOS, 9, cours du Docteur-Long, Lyon (3<sup>e</sup>)

---

---

**ABONNEMENT ANNUEL** : France et Colonies Françaises : 8 N.F. — C.C.P. Lyon 101-98  
Etranger ..... 9 N.F.

---

---

GESTION — PERTES ET PROFITS.

Ce compte s'explique par lui-même.

Remarquons cependant l'accroissement plus sensible des frais de Bulletin 880 000 contre 752 000 ; le montant des cotisations encaissées passant de 608 000 à 677 000.

Enfin, hormis les prudentes et judicieuses dotation et provision habituelles, les charges et frais de gestion, malgré une légère augmentation, 61 689 contre 56 560, n'en demeurent pas moins très modestes et n'appellent aucune observation spéciale.

Je vous engage donc, Messieurs, à approuver les comptes qui vous sont présentés.

Le Censeur : R. VIGNE.

## PARTIE SCIENTIFIQUE

### LISTE DES HETEROCERES CAPTURES DANS LA CLUSE DE GRENOBLÉ

par R. TOUCHON (*Veurey-Voroize — Isère*)

I — PREMIER SUPPLÉMENT A LA LISTE DES NOCTUELLES  
PUBLIÉE DANS LE BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON  
n° 6, du 10 juin 1958 (p. 162 et suivantes).

A — *Errata* :

- p. 171. HADENA Schrk. ; lire *lepida* et non *lepidea*.  
p. 173. AGROCHOLA Hb. ; supprimer *A. rutililla* Esp. Cette espèce, qui appartient au genre *Spudaea* Snell., n'a pas été capturée par l'auteur dans la Cluse de Grenoble.  
p. 177. AUTOGRAPHA Hb., supprimer *A. v. aureum* Hb. et lire à la place : *A. pulchrina* Haw.

B — *Addenda* : Captures à ajouter à la liste :

*Noctuinae* :

- EUXOA *agricola* B. = *conspicua* auct. nec Hb. — Veurey, X ; L.  
OCHROPLEURA Hb. (sg. *Ogygia* Hb.) *nigrescens* Höfn. — Veurey, VII ; L.  
PARADIARSA *punicea* Hb. — Veurey, VII ; L., rare.  
AMATHES *ashworthii* Dbl. ssp. *candelarum* Stgr. — Veurey, VII, VIII ; L.  
AMATHES *triangulum* Hfn. — Veurey, VI-VIII ; L.  
CERASTIS *leucographa* Schiff. — Veurey, IV ; L.  
MESOGONA *acetosellae* Schiff. — Veurey, IX ; L.

*Hadeninae* :

- HELIOPHOBUS *reticulata* Goeze — Veurey, VII ; L.  
POLIA *hepatica* Cl. — Veurey, VII ; L.  
MAMESTRA *nana* Hfn. — Veurey, VII ; L.  
HADENA *bicruris* Hfn. — Veurey, VI ; L.  
MYTHIMNA *impura* Hb. — Veurey, VI ; L.  
(sg. *Leucania* O.) *obsoleta* Hb. — Veurey, VI ; L.

*Cuculliinae* :

- CUCULLIA *santonici* Hb. ssp. *odorata* Gn. — Veurey, VIII ; L.

- CUCULLIA *thapsiphaga* Tr. — Veurey, VI ; L.  
CUCULLIA *scrophulariae* Schiff. — Veurey, V, VI ; L.  
CALOPHASIA *platyptera* Esp. — Veurey, V ; L.  
XYLENA *vetusta* Hb. — Veurey, XI ; L.  
BLEPHARITA *satura* Schiff. — Veurey, IX, X ; L.  
AGROCHOLA *macilenta* Hb. — Veurey, XI ; L.

*Apatelinae* :

- APATELE *leporina* f. *bradyporina* Hb. — Veurey, V-VIII ; L.  
CRYPHIA *ravula* Hb. — Veurey, VII, VIII ; L.

*Amphipyrynae (Zenobiinae)* :

- APAMEA *remissa* Hb. et f. *obscura* Haw. — Veurey, V-VIII ; L.  
APAMEA *illyria* Frr. — Veurey, VI ; L.  
APAMEA *anceps* Schiff. — Veurey, V-VII ; L.  
MESAPAMEA (1959) *secalis* L. f. *lilacina* Warren — Veurey, VIII 1959 ;  
L., rare.  
OLIGIA Hb. *latruncula* Schiff. f. *aethiops* Haw. — Veurey, VII ; L.  
CALLOPISTRIA *latreillei* Dup. — Veurey, IX ; L.  
CARADRINA *kadenii* Frr. — Veurey, IX ; L.  
CARADRINA (sg. *Paradrina* Brsn.) *selini* B. — Veurey, X ; L.  
IPIMORPHA (*Zenobia*) Hb. *retusa* L. — Veurey, VII ; L.  
COSMIA *diffinis* L. — Veurey, VII ; L.  
ENARGIA *ypsillon* Schiff. — Veurey, VII ; L.

*Jaspidiinae* :

- EUSTROTTIA *olivana* Schiff. — Veurey, VII, VIII ; L.  
EUSTROTTIA *candidula* Schiff. — Veurey, VIII ; L.

*Plusiinae* :

- TRICHOPLUSIA *ni* Hb. — Veurey, L. — Migration de mai 1958 — *ni* a été  
abondant de mai à septembre 1958. Aucun n'est apparu en 1959.  
ABROSTOLA *trigemina* Werneb. — Veurey, IV-VIII ; L.  
ABROSTOLA *asclepiadis* Schiff. — Veurey, IV-VIII ; L.

*Othreinae* :

- LYGEPHILA *pastinum* Tr. — Veurey, VI-IX ; L.  
LYGEPHILA *viciae* Hb. — Veurey, VI-IX ; L.  
AEDIA *leucomelas* L. — Veurey, VIII ; L.

*Hypeninae* :

- BOMOLOCHA *crassalis* F. (*fontis* Thunberg) — Veurey, VII ; L.

Les quelques changements intervenus dans la nomenclature des familles, genres et espèces, depuis la parution de la liste de juin 1958, m'ont été communiqués par Monsieur Charles BOURSIN.

II — NOUVELLE LISTE D'HETERO CERES DE LA CLUSE DE GRENOBLE  
(Classification du Catalogue des Lépidoptères de France  
de Léon Lhomme, 1923-1935).

AMATIDAE

DYSAUXES Hb.

- D. punctata* F. — Veurey, VII, VIII ; L. et vole au soleil.

LITHOSIDAE

PELOSIA Hb.

*P. muscerda* Hfn. — Veurey, VII ; L., rare.

ILEMA Hb.

*I. depressa* Esp. — Veurey, VII ; L.

*I. complana* L. — Veurey, VII ; L., commun.

*I. griseola* L. — Veurey, V-VIII ; L.

*I. sororcula* Hfn. — Veurey, V-VIII, L.

LITHOSIA Fab.

*L. quadra* L. — Veurey, VII, VIII ; L., commun.

PHILEA Zett.

*P. irrorella* L. — Veurey, VIII ; L.

PAIDIA Hb.

*P. murina* Hb. — Veurey, VIII ; L.

MILTOCHRISTA Hb.

*M. miniata* Forst. — Veurey, VI-VIII ; L., commun.

TYRIA Hb.

*T. jacobaeae* L. — Veurey, VI-VIII : L. et vole au soleil, commun.

EUPREPIA O.

*E. striata* L. — Veurey, vole sur prairies sèches, VIII.

HYPHORAIA Hb.

*H. testudinaria* Fourc. — Veurey, V ; L., rare.

PHRAGMATOBIA Stph.

*P. fuliginosa* L. — Veurey, V-VIII ; L., commun.

DIACRISIA Hb.

*D. lubricipeda* L. — Veurey, IV, V ; VIII, prairies et L., commun.

*D. lutea* Hfn. — Veurey, IV, V ; VII, VIII, prairies et L., commun.

*D. sannio* L. — Veurey, V, VI ; VII, VIII ♂ ♀ prairies sèches,

♂ L., commun — ♀ plus rare.

*D. mendica* Cl. — Veurey, IV ; L., commun — f. *binaghii* Turati ♂.

*D. caesarea* Goeze — Veurey, V ; L., plus rare que les précédents.

PERICALLIA Hb.

*P. matronula* L. — Veurey, L., un exemplaire 6. VII, 1957.

ARCTIA Schrk

*A. caja* L. — Veurey, V-VII, VIII, IX ; L., commun, très abondant en 1956, tendance aux formes claires.

*A. villica* L. — Veurey, VI, VII ; L., commun.

CYMBALOPHORA Rbr.

*C. pudica* Esp. — Veurey, IX ; L., pas commun.

ATOLMIS Hb.

*A. rubricollis* L. — Veurey, VI, VIII ; L., commun.

LIPARIDAE

DASYCHIRA Stph.

*D. fascelina* L. — Veurey, V ; VI ; VIII, IX ; L., assez rare. Deux générations.

*D. pudibunda* L. — Veurey, IV-VII ; L., très commun.

ARCTORNIS Germ.

*A. l nigrum* Muell. — Veurey, VI-VIII ; L. et élevage — assez commun (colonie sur *Tilia parvifolia*, proche du terrain de chasse).

STILPNOTIA H. et W.

*S. salicis* L. — Veurey, V, VI ; L., peu commun ; L'abondance si répandue ailleurs n'a jamais été observée par moi dans la cluse de Grenoble. Quelques rares mâles viennent à L.

LYMANTRIA Hb.

*L. dispar* L. — Veurey, VI-IX ; L., même remarque que pour *S. salicis*.

*L. monacha* L. — Veurey, VII-IX ♂ ♀ L., plus commun que les précédents, chenilles sur le cèdre.

OCNERIA Hb.

*O. rubea* Schiff. — Veurey, VII, VIII ; L.

PORTHESIA Stph.

*P. similis* Fuessly — Veurey, VII, VIII ; L., pas rare.

EUPROCTIS Hb.

*E. phaeorrhaea* Donovan — Veurey, VII, VIII ; L., plus rare que le précédent.

CALLIMORPHIDAE

CALLIMORPHA Latr.

*C. dominula* L. — Veurey, VI, VII, pas rare ; vole de jour dans les lieux humides, vient à L.

*C. quadripunctaria* Poda — Veurey, VII, VIII, pas rare au vol en battant les buissons, vient à L.

SPHINGIDAE

HERSE Oken

*H. convolvuli* L. — Veurey, VI, VIII, IX ; L., commun, vole le soir sur *Saponaria officinalis*, etc....

ACHERONTIA O.

*A. atropos* L. — Veurey, V, VIII-X ; L., élevage autrefois abondant.

L'emploi des produits arsenicaux pour détruire les doryphores aux divers stades de leur vie a raréfié *A. atropos*.

Dans la cluse de Grenoble, le froid rigoureux du mois de février 1956, ayant détruit les doryphores, aucun traitement arsenical ne fut employé sur les champs de pommes-de-terre. Au mois de septembre de cette même année les *Acherontia* furent abondants (15 observés au cours d'une seule nuit).

HYLOICUS Hb.

*H. ligustris* L. — Veurey, VI-VIII ; L., élevage, commun.

*H. pinastri* L. — Veurey, V-VIII ; L., élevage, commun. Chenilles vivant sur le cèdre.

MIMAS Hb.

*M. tiliae* L. — Veurey, IV-VI, VII, VIII ; L., commun — f. *brunnea* Bartel, rare : 12/V/58.

SPHINX L.

*S. ocellata* L. — Veurey, V-VIII ; L., commun.

AMORPHA Kirb.

*A. populi* L. — Veurey, V-VIII ; L., très commun.

HAEMORRHAGIA Gr. et Rob.

*H. tityus* L. — Veurey, V, VIII, butinant dans les sous-bois et sur les lisières, un peu plus rare que le suivant.

*H. fuciformis* L. — Veurey, V, VI, butinant sur les arbustes en fleurs, particulièrement les lilas, assez commun.

PROSERPINUS Hb.

*P. proserpina* Pall. — Voreppe, VI 1928, posé à terre. La région de Voreppe est considérée comme un habitat de nombreux *proserpinus*. Les papillons y sont très rares, alors que leurs chenilles sont répandues et parfois abondantes sur *Epilobium palustre*, *hirsutum* et *rosmarinifolium*, mais leur élevage est délicat.

MACROGLOSSUM Sc.

*M. stellatarum* L. — Veurey, toute l'année sur les fleurs ou posé sur les troncs d'arbre, très commun.

CELERIO Oken

*C. euphorbiae* L. — Veurey, V, VI, VIII, IX ; L. et élevage, très commun et f. *rubescens* Garb. Veurey, VII ; L. et f. *suffusa* Tutt. Veurey V, VI ; L. — Un exemplaire pris à Veurey le 11 mai 1959 présente un thorax et un abdomen couverts de taches rouges, les étroites bandes blanches qui entourent le thorax et la tête sont fortement tachées de rouge, les ailes supérieures sont très sombres.

*C. vespertilio* Esp. — Veurey, V, VII ; L., butine le soir sur *Saponaria officinalis*, etc..., pas rare, chenille commune sur *Epilobium rosmarinifolium* (berges et lits des torrents) élevage facile.

*C. hippophae* Esp. — Veurey, VII, IX, butine le soir sur les fleurs, très rare. Sur les bords de l'Isère et sur ses îles, les chenilles sont parfois abondantes sur *Hippophae rhamnoides* (argousier) par groupe de 5 à 10, elles mangent en plein soleil à l'extrémité des branches les plus élevées ; leur « camouflage » est remarquable, leurs dos gris-vert, leurs ventres plus pâles donnent l'illusion des feuilles de l'arbuste, cependant que leurs derniers anneaux portent de chaque côté du corps une tache jaune orange éclatant, de la couleur exacte et de la dimension du fruit de l'argousier. Malgré la perfection du mimétisme, la vie diurne et aérienne des chenilles les laisse terriblement exposées à leurs ennemis, oiseaux et parasites. Ce qui peut expliquer la rareté du papillon.

*C. lineata (livornica)* Esp. — Veurey, V, IX ; L. et butinant le soir sur les fleurs, rare en dehors des périodes de migration où il devient surabondant. J'ai pu observer deux de ces voyages en juillet 1946 et mai 1958, le premier plus important que le second. Je signale la capture le 20 mai 1958, d'un individu dont la teinte vert olive de la tête, du thorax et de l'abdomen est remplacée par une teinte jaune, les ailes supérieures sont grises et blanches, sans trace de vert, les ailes inférieures sont jaune paille cerclées de noir.

PERGESA Walk.

*P. elpenor* L. — Veurey, V, VI, IX, X ; L. et butinant sur les fleurs, très commun, chenille sur *Epilobium* divers.

*P. porcellus* L. — Veurey, V, VI, IX, X ; L. et butinant sur les fleurs, très commun, chenille sur *Epilobium* divers.

THYATIRIDAE

HABROSYNE Hb.

*H. derasa* L. — Veurey, V-VIII ; L. et M., commun.

THYATIRA Hb.

*T. batis* L. — Veurey, V-VIII ; L. et M., très commun.

PALIMPSESTIS Hb.

*P. or* F. — Veurey, V-VIII ; L., commun.

*P. ocularis* L. — Veurey, V, VIII ; L., commun.

*P. duplaris* L. — Veurey, VIII ; L., rare.

POLYPLOCA Hb.

*P. diluta* F. — Veurey, VIII, IX ; L. et M., parfois commun (abondant en 1956).

*P. ridens* F. — Veurey, III-V ; L.

CERURIDAE

CERURA Schrk.

*C. furcula* Stgr. — Veurey, IV-IX ; L. et élevage.

*C. bifida* Stgr. — Veurey, IV-IX ; L. et élevage.

DICRANURA B.

*D. erminea* Esp. — Veurey, V, VI ; L. et élevage, plus répandu que *D. vinula*.

*D. vinula* L. — Veurey, IV-VI ; L. et élevage.

STAUROPUS Germ.

*S. fagi* L. — Veurey, IV-VIII, ♂ très commun, ♀ rare.

HOPLITIS Hb.

*H. milhauseri* F. — Veurey, IV-VI ; L., assez commun.

GLUPHISIA B.

*G. crenata* Esp. — Veurey, IV, V, VII, VIII ; L., commun.

DRYMONIA Hb.

*D. querna* F. — Veurey, V-VII ; L., ♂ pas rare, ♀ rare.

*D. trimacula* Esp. — Veurey, IV-VI ; L., ♂ pas rare, ♀ rare.

*D. chaonia* Hb. — Veurey, IV-VI ; l., ♂ ♀. La plus commune des *drymonia*.

PHEOSIA Hb.

*P. tremula* Cl. — Veurey, IV, V, VIII ; L., commun.

NOTODONTA O.

*N. dromedarius* L. — Veurey, V-VIII ; L., pas rare.

*N. ziczac* L. — Veurey, IV-VI, VIII, IX ; commun.

*N. anceps* Goeze — Veurey, IV-VI ; L. pas rare.

*N. phoebe* Sieb. — Veurey, IV-VIII, commun. A signaler la capture le 14 juillet 1958 d'un exemplaire de belle taille, dont la tête et le thorax sont blancs pur, et l'abdomen noir foncé. Les ailes supérieures sont blanches recouvertes d'une poussière grise, sur laquelle sont esquissés en blanc les dessins et les macules. Les ailes inférieures sont d'un blanc pur. Si cette forme albine devenait plus commune, elle serait bien nommée *albithorax*.

*N. tritophus* Esp. — Veurey, VIII ; L., rare.

OCHROSTIGMA Hb.

*O. velitaris* Hfn. — Veurey, V-VIII ; L. rare.

*O. melagona* Bkh. — Veurey, V-VII ; L., rare.

LOPHOPTERYX Stph.

*L. cuculla* Esp. — Veurey, V, VII, VIII ; L., très commun.

*L. camelina* L. — Veurey, IV-VIII ; L., commun.

PTEROSTOMA Germ.

*P. palpina* L. — Veurey, V-VIII ; L., commun.

PTILOPHORA Stph.

*P. plumigera* Esp. — Veurey, XI, XII ; L.

PHALERA Hb.

*P. bucephala* L. — Veurey, V-VIII ; L., très commun.

PYGAERA O.

*P. anachoreta* F. — Veurey, VIII ; L., rare.

*P. curtula* L. — Veurey, III-V, VI-VIII ; L., commun.

*P. pigra* Hfn. — Veurey, IV, V, VIII, IX ; L., un peu moins répandu que le précédent.

THAUMETOPOEIDAE

THAUMETOPOEA Hb.

*T. processionea* L. — Veurey, VII, VIII ; L. et chenilles, plus rare que le suivant.

*T. pityocampa* Schiff. — Veurey, VII, VIII ; L. et chenille, commun, chenilles sur pins et cèdres.

ATTACIDAE

SATURNIA Schrk.

*S. pyri* Schiff. — Veurey, IV, V ; L. et élevage, commun.

EUDIA Jordan

*E. pavonia* L. — Veurey, III-V, peu rare. ♂ vol, ♀ L.

AGLIA O.

*A. tau* L. — Veurey, III, V, pas rare. ♂ vol, rarement L. ; ♀ L.

LEMONIIDAE

LEMONIA Hb.

*L. dumii* L. — Veurey, Voreppe, X, XI, assez rare, ♂ L., ♀ à terre sous buissons ou herbes sèches.

COSSIDAE

COSSUS F.

*C. cossus* L. — Veurey, VI, VII ; L., commun.

*C. terebra* F. — Veurey, VII ; L.

ZEUZERA Latr.

*Z. pyrina* L. — Veurey, V-VIII, pas rare.

DYSPESSA Hb.

*D. ulula* Bkh. — Veurey, V ; L.

LASIOCAMPIDAE

MALACOSOMA Hb.

*M. neustria* L. — Veurey, VI, VIII ; L., pas rare.

*M. castrensis* L. — Veurey, VI, VIII ; L., pas rare.

*M. alpicola* Stgr. — Veurey — La Buffe (1623 m.) ♀ posée VII 1944.

TRICHIURA Stph.

*T. crataegi* L. — Veurey, VIII, X ; L., ♂ commun, ♀ rare.

POECILOCAMPA Stph.

*P. populi* L. — Veurey, XI, XII ; L., ♂ ♀ peu rare.

LASIOCAMPA Schrk.

*L. quercus* L. — Veurey, VII, VIII, ♂ vol, ♀ L. ou posée.

*L. trifolii* Esp. — Veurey, VIII, IX ; L., ♂ commun, ♀ plus rare.

MACROTHYLACEA Rbr.

*M. rubi* L. — Veurey, IV, V. ♂ vol, ♀ L. ou posée.

COSMOTRICHE Hb.

*C. potatoria* L. — Veurey, VII, VIII ; L., ♂ commun, ♀ plus rare.

EPICNAPTERA Rbr.

*E. tremulifolia* Hb. — Veurey, IV, V, L., ♂ assez commun, ♀ plus rare.

GASTROPACHA O.

*G. quercifolia* L. — Veurey, VI-VIII, élevage et L. peu rare.

*G. populifolia* Esper. — Veurey, VIII ; L. plus rare que le précédent.

ODONESTIS Germ.

*O. pruni* L. — Veurey, VI, VII ; L., ♂ commun, ♀ rare.

DENDROLIMUS Germ.

*D. pini* L. — Veurey, VI-VIII ; L. ♂ pas rare, ♀ rare.

ENDROMIDAE

ENDROMIS O.

*E. versicolor* L. — Veurey, vu un exemplaire ♂ volant en avril 1927 à Chalais (800 m.) sur les extrémités d'une branche de Charme (*Carpinus betulus*) — capturé L. un ♂ très frais — Veurey, IV, 1956.

HETEROGENEIDAE

COCHLIDION Hb.

*C. limacodes* Hfn. — Veurey, VII, VIII ; L., peu rare.

DREPANIDAE

DREPANA Schr.

*D. falcataria* L. — Veurey, IV-V, VII-IX ; L., commun.

*D. harpagula* L. — Veurey, V-VIII ; L. commun.

*D. binaria* Hfn. — Veurey, IV-VI, VII-IX ; L., très commun.

*D. cultraria* F. — Veurey, III-V ; L. assez rare.

CILIX Leach

*C. glaucata* Sc. — Veurey, III-V ; L., peu rare.

AEGERIIDAE

AEGERIA

*A. apiformis* Cl. — Veurey, VI, posé et voletant sur des troncs de peupliers, commun.

HEPIALIDAE

Classification de P. VIETTE

TRIODINA

*T. sylvinus* L. — Veurey, VIII, IX ; L. et prairies.

KORSCHTELLELLUS

*K. lupulinus* L. — Veurey, V ; L.

*K. fusconebulosus* De Geer. — Veurey — La Buffe (1 623 m.) — Ecllosion abondante de papillons de belle taille sortant du sol sur le sommet lui-même couvert d'une prairie à la végétation luxuriante (*Aster alpinus*, *Geum montanum*, *Polentilla aurea*, *Alchemilla alpina*, etc...) le 20 juillet 1944 à midi.

PHYMATOPUS

*P. hectus* L. — Veurey, V, VI ; L.