

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Abonnement }
annuel } 10 francs.SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

1753 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques Postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****ORDRE DU JOUR**

DE LA

Séance générale du Lundi 12 Mars 1923, à 20 heures1^o Vote sur la candidature de :

MM. Hassler, Ducarre, Bérard, Romanetto, Duray, Montet, Perret-Valorge, Chevalier et de M. Crosset (Jos.), 15, rue Burdeau Lyon, parrains MM. Bonna-mour et Nicod. — M. Casanove (F. de), professeur au Lycée de Brest (Finistère). — M. Gouillon (Jean-Baptiste), gardien de la paix, 97, rue Molière, Lyon, parrains MM. Ravinet et Nicod. — M. Vacher de Lapouge (D^r), bibliothécaire à l'Université, 18, quai Claude-Bernard, Lyon, *Physiologie*, parrains MM. Couvreur et Nobécourt. — M. Glick (Perry A.), Research Entomologist, Post office box 348, Phoenix, Arizona (U. S. A.), *Lépidoptères*, parrains MM. Clerc et Riel. — M. Tompkins de Garnett (Richard), 583, Merrimac Street, Oakland, California (U. S. A.), *Coléoptères, spécialement Cicindélides, Carabiques, Buprestides, Cérambycides et Scarabacides*. — M. Frison (D^r René), Rouillé (Vienne), *Botanique*, parrains MM. Riel et Pétrequin. — M. Léorat (D^r Gaston), 7, rue de Tournon, Annonay (Ardèche). — M. Nicolas (Albert), directeur d'Ecole, Saint-Vallier (Drôme), parrains MM. Damians et Riel. — M. Porter (Prof. D^r Carlos E.), Casilla 2974, Santiago (Chili), parrains MM. Brèthes et Riel. — M. Finet (Eugène), pharmacien, place d'Armes, Romans (Drôme). — M. Gaudet (Joseph), pharmacien, Viriville (Isère), parrains MM. Riel et Nicod.

petites coques. Le Chalcidide sort en dévorant une partie de cette coque. MM. Gauthier et du Dresnay montrent ces chenilles avec les cocons dans leur peau desséchée. Mayr avait déjà signalé *Litomastix truncatellus* chez un Lépidoptère voisin, *Eupithecia absinthiata* Cl.

SECTION BOTANIQUE

Séance du 27 Février 1923

M. MEYRAN analyse les publications reçues et présente le programme du 56^e Congrès des Sociétés savantes, qui se tiendra à Paris, en 1923.

M. COUTAGNE présente des plants racinés et des fruits de l'*Opuntia vulgaris* Miller, qu'il a rapportés le 20 février, d'une localité probablement nouvelle de cette espèce intéressante, naturalisée depuis au moins trois siècles dans quelques stations du Valais et du revers méridional des Alpes, au nord de la Lombardie. L'origine de cette naturalisation si curieuse d'une espèce américaine, a fait l'objet de bien des discussions : un amateur de plantes grasses du XVI^e siècle l'aurait-il introduite ? ou quelque oiseau ayant traversé l'Atlantique ? La nouvelle station que signale M. COUTAGNE s'étend sur plus d'un kilomètre de long, au nord de la voie ferrée de Toulon à Saint-Raphaël, sur des talus d'argiles rouges permienes, à l'est de Gonfaron.

M. THIÉBAUT fait part ensuite de quelques observations sur la flore de Crémieu (Isère), et rappelle tout d'abord les botanistes lyonnais qui ont le mieux fait connaître les richesses de cette localité. La végétation du massif calcaire de Crémieu est constituée, d'une part, par des plantes de la zone inférieure du Jura (bien que les crêtes n'atteignent pas 450 mètres d'altitude), puis par des espèces propices aux stations xérothermiques, et surtout par des plantes simplement calcicoles, que l'on retrouve en grande partie, soit dans le Mont-d'Or lyonnais, soit sur les pentes de la Côteire du Rhône. Elle prend un caractère spécial par la présence de formes propres à la région du sud-est, telles que : *Iberis Timeroyi*, *Geranium modestum*, *Rhymnus saracillidii* et *Villarsii*, *Knautia Timeroyi*.

M. THIÉBAUT présente ces dernières, ainsi que deux formes hybrides récoltées dans cette localité, par M. des Maisons et lui, en mai dernier. Ce sont *Sorbus confusa*, hybride des *S. Aria* et *torminalis* (connu depuis quelques années à Couzon) et enfin *Orchis Bergoni* de Nanteuil, hybride des *O. Simia* et *Aceras eulthropophora*, non signalé encore dans la région lyonnaise.

A propos d'hybrides, M. COUTAGNE donne quelques renseignements sur *Acer Martini*, qu'il considère comme hybride des *A. campestre* et *monspesulanum*, bien que cette dernière espèce soit fort rare, sinon disparue, dans la région de Moutiers (Savoie), où *A. Martini* est fort répandu.

M. THIÉBAUT cite un fait de disparition de l'un des parents, alors que l'hybride persiste. Dans une propriété de Sainte-Foy-lès-Lyon, enclose de murs très élevés, croissaient en abondance *Primula grandiflora*, *P. officinalis* et leur hybride *P. variabilis*. A la suite de la sécheresse de l'été 1921, *P. grandiflora* a complètement disparu, alors que subsistent *P. officinalis* et *variabilis*. Il est par conséquent hasardeux, lorsqu'on rencontre une plante présumée hybride, de nier son hybridité parce qu'on ne constate pas la proximité des deux parents.