

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gén. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; Trésorier : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement }
annuel } 10 francs.SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

2507 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques Postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions.**

Ont été admis à la séance du 11 octobre :

MM. del Valle, Tournaire.

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Lundi 25 Octobre 1926, à 17 heures1^o Vote sur l'admission des candidats présentés à la séance du 11 octobre.2^o Présentation de :

M. Courtois (Benoît), directeur du Laboratoire municipal, 35, rue Bossuet, Lyon (6^e). — M. Dissard (René), instituteur, Saint-Dier-d'Auvergne (Puy-de-Dôme), *Coléoptères, Lépidoptères*. — M. Widmann (Marcel), 36, avenue de Villeneuve-l'Etang, Versailles (Seine-et-Oise). — M. Gavelle (Gaston), 39, avenue de la Californie, Nice (Alpes-Maritimes), *Entomologie générale sp. Carabiques et cavernicoles*, par MM. Riel et Nicod. — M. Tallon (Gabriel), ingénieur-chimiste à la Compagnie Alais, Froges et Camargue, Salindres (Gard), *Phanérogames. Phytogéographie*, par MM. Braun-Blanquet et Roger Heim. — M. Odic (Dr), 101, Grande-Rue, Sèvres (Seine-et-Oise), par MM. Damians et Riel.

moins pour leur classification que ne l'ont oru certains auteurs tels que QUÉLET et PATOUILLARD. Mais c'est là une autre question que nous abordons un autre jour.

Présentation de champignons.

Russula xerampelina Fr. (La Tour-de-Salvagny). On sait que cette sp. si variable et si difficile à reconnaître à l'état jeune, prend avec l'âge une odeur que ROMELL a comparée à celle des écrevisses cuites. Les spores de $10/10,5 \times 9/10 \mu$ sont munies de spinules aiguës, étroites et assez denses.

Pluteus nanus Pers. (*idem*). Il est bon de rappeler que *P. phlebophorus* n'est pas seul à être « porte-veines », c'est-à-dire à avoir le chapeau veiné-plissé. Ce caractère lui est commun avec *P. nanus* et cette communauté a dû entraîner des confusions. C'est un des inconvénients produits par des noms spécifiques qui évoquent un caractère non absolument différentiel, mais existant chez plusieurs sp. ; d'ailleurs plusieurs mycologues, dont M. KONRAD rapprochent ces deux sp. qui diffèrent surtout par leur chapeau : glabre chez *P. phlebophorus* et velouté chez *P. nanus*.

Flammula astragalina Fr. Chênelette (Rhône). Belle sp. toujours bien caractérisée par le noircissement de sa chair. Spores $7 \times 5 \mu$.

Hebeloma anthracophilum R. Maire. Cette sp. a été décrite par R. MAIRE (*B. S. M.*, t. XXIV, p. LVII et t. XXVI, p. 190), c'est dire qu'on ne saurait ajouter le moindre caractère à la diagnose princeps. Notons seulement que les spores, si elles sont verruqueuses, le sont très faiblement. Celles de ce lot trouvé à Chênelette par M. JOSSEMAND, étaient plutôt guttulées que munies de véritables verrues en saillie. R. MAIRE dit d'ailleurs : « verruculeuses » et non verruqueuses.

Cette sp. qui, paraît-il, a été confondue avec *Flammula carbonaria* en est bien différente non seulement microscopiquement mais même par l'ensemble de ses caractères macroscopiques.

» *Stegia Ilicis* Fr. (Charbonnières). Sur feuille de Houx (*Ilex aquifolium*).

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Séance du 4 Octobre

Captures.

M. G. SÉRULLAZ signale les captures suivantes :

Hypocaelus procerulus (Mannh.). — Deux exemplaires en août, à Saint-Julien-de-Ratz (Isère), sur un tronc de sapin mort envahi par la moisissure. L'insecte a été signalé de la Grande-Chartreuse par BONVOULOIR.

Hallomenus binotatus (Quens.). — Deux exemplaires : Forêt du Roi, Grande-Sûre (Isère), sur un polypore de sapin (fin juillet). MULSANT signale l'insecte de la Grande-Chartreuse.

Cænocara bovistæ (Hoffm.). — Deux exemplaires : Grande-Sûre, en août, en battant des branches mortes de sapins.

Elatér nigrinus (Herbst). — Quatre exemplaires, sur les sapins (fin juillet), Grande-Sûre.