



**UNE NOUVELLE RACE DE LITHOPHANE LEAUTIERI B.  
D'ESPAGNE (LEP. NOCTUIDAE)**

**Contributions à l'Étude des « Noctuidae-Trifinae », 118<sup>1</sup>.**

par Charles BOURSIN (Paris).

Monsieur le Prof. von BUDDENBROCK et sa femme ont obtenu de chenilles de *Lith. leautieri* Boisd., élevées par eux-mêmes aux environs de Grenade (Espagne) en mai 1957 sur le cyprès (éclosions en octobre et novembre), une série d'exemplaires qui me furent confiés pour étude et qui se différencient suffisamment des autres races connues de l'espèce pour mériter un nom particulier :

*Lithophane leautieri* Boisd. **andalusica** n. ssp.

Est caractérisée par sa très grande taille, presque aussi grande que celle de la ssp. *nicaeensis* Brsn., la plus grande connue. La moyenne des exemplaires dépasse en effet 40 mm et plusieurs atteignent 45 mm (taille moyenne de la forme typique : 39-40 mm<sup>2</sup>). Les dessins sont très nets et fortement marqués en noir, la majorité des exemplaires étant, en outre, relativement foncée dans l'ensemble. La réniforme est colorée, la plupart du temps, d'une teinte brun-jaunâtre très nette. Les exemplaires obtenus présentent une certaine variation dans la taille et dans l'accentuation des dessins, certains se rapprochant de la f. *monochroma* Brsn., qui peut apparaître dans toutes les races, l'espèce étant très plastique. Par sa teinte foncée, cette nouvelle race se rapproche de la ssp. *hesperica* Brsn., du Sud-Ouest de la France et forme ainsi une sorte d'intermédiaire entre la ssp. *nicaeensis* Brsn. et cette dernière. En outre, par l'ensemble de ses caractères, elle semble représenter une transition vers les exemplaires d'Afrique du Nord : ssp. *ochreimacula* Roths.

Envergure : de 40 à 45 mm.

Holotype : 1 ♂, Grenade (Andalousie/Espagne), e. l. chenille 16 mai 1957, écl. 3 novembre (Coll. Prof. v. Buddenbrock).

Paratypes : une quinzaine d'exemplaires des deux sexes, même localité, même date de capture, éclosions en octobre-novembre. (Coll. v. Buddenbrock et Boursin).

Cette nouvelle race sera figurée dans un travail ultérieur.

1. Voir 117 in « Zeitschr. d. Wien. ent. Ges. », 1962.

2. Voir Boursin in « Bull. Soc. Linn. Lyon », 1957, p. 19, et 1957, pp. 61-62.

**CUCULLIA PRENANTHIS BSD.  
ESPECE NOUVELLE POUR LA FRANCE (LEP. NOCTUIDAE).**

**Contributions à l'Étude des « Noctuidae-Trifinae », 119<sup>1</sup>.**

par Charles BOURSIN (Paris).

Un exemplaire ♂, très caractéristique, de cette espèce, a été capturé par le Dr ROQUES, de Nice, aux environs de Berthemont-les-Bains, vallée de la Vesubie (A.-M.), le 27 juin 1959, à la lumière, exactement au plateau de Berthemont, en bordure de la falaise nord, qui surplombe d'une vingtaine de mètres le petit torrent de la Cougne (alt. env. 900 m).

1. Voir 118 dans le présent Bulletin, 1962, p. 251.