

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gen. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; Trésorier : M. E. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement annuel	} France et Colonies fr ^{es}	10 fr.
		} Etranger

SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

3072 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions.***Ont été admis à la séance du 27 novembre :*

MM. Pleynet, Boissière, Viviant, Picard, Kennedy, Zweifel, Mouillère, Chavoz, Billiet, Poulette, Jupiter, Châtre, M^{mes} Seidel, Chauvinet, MM. Lefèvre, Faure, Durantet, Ravinet, Chavand, Baume, Aufranc, Chevalier, Berthelon, Perret, Richard, Montmayeur, Franc, M^{lle} Vacher, M^{me} Thomas, M. Goux, M^{me} Steeg, MM. Servage, Bardin, Barrillon.

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Mardi 11 Décembre 1928, à 20 heures.**(ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE)**¹⁰ *Vote sur l'admission des candidats présentés à la séance du 27 novembre, auxquels sont ajoutés :*

M. Gauthier (Roger), étudiant en médecine, Maison des Etudiants, 8, rue Jeanne-Kœler, Lyon, parrains MM. Thiébaut et Guinochet. — M. Boutté, chef d'escadron, 405^e R. A., rue Berthelot, Caluire (Rhône), parrains MM. Ravinet et Nicod. — M. Lyonnet (Maurice), préparateur en pharmacie, 8, rue Notre-Dame, Lyon, parrains MM. Pichet et Pouchet. — M. Brunon (André), ingénieur-chimiste, les Cazardes, Grigny (Rhône), parrains MM. Cl. Roux

Depuis plusieurs années je me propose d'aller rechercher le chêne vert à grappes des forêts de Laverne pour le mieux étudier. Mais craignant de ne pouvoir faire encore cette année cette excursion, j'ai pensé qu'il serait bon de signaler aux jeunes botanistes l'intérêt que présenterait l'étude plus complète de cette curieuse espèce ou variété du *Quercus Ilex*.

Présentation de plantes fraîches.

Cerydallis latea, Belley (Ain); *Digitalis furfurescens*, Châteauevieux (Rhône); *Carum verticillatum* (ibid), etc.

GROUPE DE VOIRON

Exposition mycologique des 14 et 15 Octobre

Chaque année, depuis sa fondation, le groupe de Voiron organise en automne une exposition de champignons.

Celle de 1928 fut particulièrement intéressante. En dehors des 257 espèces différentes figurant à l'exposition, il convient de citer une innovation qui fut très goûtée du public. Sur une table spéciale furent placés en évidence, les champignons les plus dangereux (*Amanita phalloides*, *Amanita virosa*, etc.), ainsi que les espèces comestibles, communes dans la région.

Nous adressons nos félicitations à MM. VIBERT, H. RÉVEILLET, MORELLET, A. BONNAT, APPERCEL, PION-ROUX, membres du Bureau, ainsi qu'à tous nos collègues qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur peine pour contribuer au succès de l'exposition.

Voici quelques renseignements sur les champignons rares ou critiques qui y furent exposés.

Armillaria imperialis Fr. — Cette espèce est souvent confondue et désignée, dans la région de Grenoble, sous le nom de *Armillaria robusta* A. et S. Elle diffère de cette dernière par plusieurs caractères importants, notamment par ses feuillets décurrents et par la présence d'un double anneau sur le pied. Voici la diagnose de cette espèce d'après les spécimens récoltés à Saint-Pierre-d'Entremont (Isère), par M. Henri RÉVEILLET.

Chapeau 90-120-(135) mm., d'abord globuleux, puis convexe étendu, enfin évasé; non mamelonné, ferme, compact, très épais, non hygrophane, sec, brun fauve tendant parfois au brun cuivré; glabre, sauf à la marge, mais semblant pelucheux par tessellation, entièrement crevassé-craquelé, non zoné. — Marge d'abord involutée, longtemps enroulée, toujours arrondie, même à la fin quand le chapeau est évasé; non striée, vergetée par cutifraction, tomenteuse au bord.

Cuticule assez résistante, très séparable.

Chair très épaisse, ferme, dure sous la dent, blanc pur de partout, immuable.

Lamelles pas très serrées, égales (lamellules très rares) mais fourchues à tous les niveaux; étroites, épaisses, arquées, longuement décurrentes, très séparables, blanches puis paille ocré. Arête entière, un peu obtuse, concolore.

Pied: 60-100 × 20-40 mm., dur, très plein, un peu ventru au milieu et pointu-pénétrant à la base; d'ailleurs variable; brun ocre, brun fauvâtre, un peu plus pâle que le chapeau et, comme lui, pseudo-squameux par éclatement du revêtement; sec.

Anneau double. Le premier, interne, laisse peu de traces; le deuxième, externe, est persistant, ample et membraneux; en dessus, il est isabelle et strié; en dessous, il est brun chocolat.