

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gén. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; *Trésorier* : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement annuel	France et Colonies fr ^{es}	10 fr.	SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)
	Etranger	15 fr.	

3086 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux
c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

Admissions.

Ont été admis à la séance du 8 janvier :

MM. Charpiot, Guichard, Chevalier, Gravier, Breyton, Terrasse, Desarthe, Allingry, Delerce, Palisse, Ferriot, M^{me} de Vilmorin, M. Graeffe, M^{lle} Reynaud.

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Jeudi 24 Janvier 1929, à 17 heures

1^o *Vote sur l'admission des candidats présentés le 8 janvier, auxquels sont ajoutés :*

M. Offner (D^r Jules), chef de travaux de Botanique à la Faculté des Sciences, 17, rue Hébert, Grenoble (Isère), parrains MM. Mirande et Burollet. — M. Mercier (J.), étudiant en médecine, 14, rue Bonnard, Lyon-Montchat, parrains MM. Ravinet et Nicod. — M. Edel (Henri), externe aux Hôpitaux, 9, quai de Serbie, Lyon, parrains MM. Jossierand et Pouchet.

2^o *Présentation de :*

M. Mazade (Henri), pharmacien, place du Marché, Bourg-de-Péage (Drôme). — M. Defillon (Francisque), pharmacien, place Jacquemart, Romans (Drôme). — M. Morel (Paul), pharmacien, place Jacquemart, Romans. — M. Dupré (Auguste), pharmacien, rue Mathieu-de-la-Drôme, Romans, par MM. Henri et Ravinet. — M. Chabrol (D^r Léon), 54, rue Jean-Jaurès, Vichy (Allier), *Préhistoire*, par MM. Bouttet et Larue. — M. Arlé (Roger), 89, rue des Pyrénées, Paris (20^e), *Hyménoptère, vespiformes, Chrysidides, spéc. Bethyloïdes*,

La réaction que nous venons d'indiquer se produit aussi bien sur du matériel sec que sur des spécimens frais.

Chez les *Psalliota* et chez les *Panæolus*, les spores ne changent pas sensiblement de couleur dans l'acide sulfurique et n'abandonnent à l'acide aucune substance colorée (c'est particulièrement net pour les spores jeunes qui restent jaunâtres ou olivacées dans l'acide).

Cette nouvelle réaction qui n'est évidemment que d'une faible utilité en ce qui concerne le genre *Psalliota* dont les limites sont faciles à saisir, pourra au contraire être employée pour préciser les limites du genre *Panæolus*.

C'est ainsi qu'elle nous confirme que le *Panæolus guttulatus* Bres. est bien un *Panæolus* et non un *Psilocybe*, comme l'avaient cru MM. HEIM et RÉMY qui l'avaient redécrit sous le nom de *Ps. aleuriata* (B. S. M., tome XLI, p. 459).

L'*Agaricus separatus* Linné dont nous préciserons ultérieurement la position taxonomique en nous basant sur des caractères anatomiques montre également une réaction négative ; il est donc très certainement affine aux *Panæolus*.

Enfin l'*Agaricus fœniseei* Pers. transporté des *Psilocybe* aux *Psathyra* suivant les auteurs n'appartient certainement pas à ces genres car ses spores restent immuables dans l'acide sulfurique ; c'est donc définitivement que l'on peut placer désormais cette espèce dans les *Panæolus* comme l'étude anatomique nous avait déjà conduit à le faire (*Le Botaniste*, série XVII, p. 187-188).

Présentation de champignons frais

Malgré la sécheresse, il est présenté près de trente espèces parmi lesquelles nous mentionnerons :

Ananita cæsarea Scop. (Cuisiat, Ain, par M. CORNATTON).

Entoloma lividum Bull. (*id.*, et aussi : Saint-André-de-Corcy, par M. VALAN-SIO.)

Russula integra L. (Chênelette (Rhône), par M. GABIER et La Tour-de-Salvagny, par M. JOSSE-RAND). Il y aurait lieu de donner une bonne description de cette sp. très polymorphe et dont le nom a servi à désigner collectivement plusieurs sp. qui en sont pourtant bien distinctes. Nous reviendrons sur ce groupe.

Inocybe Bongardii Wein. (Francheville (Rhône), par M. POUCHET). Cette sp. est incontestablement voisine de *I. cervicolor* et elle en est incontestablement distincte. Son odeur est bien plus agréable ; sa coloration est plus rougeâtre et sa taille est plus grande.

Cantharellus cibarius Fr. var. *neglectus* Souché (*id.*).

M. J.

SECTION BOTANIQUE

Séance du 23 Octobre

Le marais de Cormoranche (Ain) en août 1928

Par M. QUENEY

M. QUENEY donne des indications sur la florule du Marais de Cormoranche (Ain) qu'il a eu l'occasion de visiter à différentes reprises dans le courant d'août 1928. Il rappelle qu'elle a fait précédemment l'objet de comptes rendus du D^r MAGNIN (*Soc. Bot. de Lyon*, 1872), du D^r GIDOT (*Soc. Bot. de France*, 1876) et de notre vice-président, M. MEYRAN (*Feuille des Jeunes Naturalistes*, 17^e année). Mais ces herborisations avaient été faites, soit au