

**BULLETIN BI-MENSUEL**

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

ET DES

**SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON**

RÉUNIES

Secrétaire gen. : M. P. NICOD, 123, r. St-Georges ; Trésorier : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| Abonnement<br>annuel | } France et Colonies fr <sup>es</sup><br>Etranger . . . . | 10 fr. |
|                      |   | 15 fr. |

|   |
|---|
| SIÈGE SOCIAL A LYON :<br>33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal) |
|---|

3112 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux  
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions.***Ont été admis à la séance du 28 février :*M<sup>me</sup> Berthier, MM. Bancillon, Tachon, M<sup>me</sup> Déchavanne, MM. Karcher, Luizard, Cotton, André, Duret, Smith, Buisson.**ORDRE DU JOUR**

DE LA

**Séance générale du Mardi 12 Mars 1929, à 20 h. 30****1<sup>o</sup> Vote sur l'admission des candidats présentés le 28 février auxquels sont ajoutés :**M. Meriaud, 2, place Saint-Nizier, Lyon, parrains M. Patissier et M<sup>me</sup> Aijet. — M. Guétat (Joseph), Maubec, par Bourgoin (Isère). — M. Vibert (Laurent), chalet Rouge, route de Grenoble, Bourgoin, parrains MM. Marès et Pouchet.**2<sup>o</sup> Présentation de :**M<sup>lle</sup> Pichon (Maria), 2, rue Eugène-Manuel, Villeurbanne (Rhône), par M. Gaillard et M<sup>me</sup> Huchard. — M<sup>lle</sup> Pichon (Juliette), 2, rue Eugène-Manuel, Villeurbanne (Rhône), par M. Gaillard et M<sup>me</sup> Huchard. — M. Paulus (R.-M.), Saverne (Bas-Rhin), *Botanique, Flores d'Alsace-Lorraine et de la haute montagne, Fougères*, par MM. Grauvogel et Riel. — M. Rousseau (Paul), instituteur, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, par Changis (Seine-et-Marne), *Mycologie*. — M. Pinaut (J.-A.), 45, rue du Surmelin, Paris (20<sup>e</sup>), *Mycologie*. — M. Unamuno (Dr R.-P. Luis M.), Laboratorio de Cryptogamia, Real jardin botanico, Madrid (Espagne), *Mycologie*. — M. Amstutz (Henri), Meslières

tandis que les plus évoluées s'adonnent à l'élevage ou à la culture. Si on suit les transformations qu'ont subies les sociétés des hommes, on est frappé par le parallélisme des deux évolutions.

M. Prost termine en insinuant que nous pourrions améliorer les conditions sociales de notre vie en nous inspirant des actes des Fourmis qui ignorent les défauts et les passions de l'homme.

Après la conférence, d'intéressants clichés sur les insectes ont été projetés et commentés par M. Prost.

## SECTION ENTOMOLOGIQUE

Séance du 5 Février

### Captures de Coléoptères

Par M. A. MÉQUIGNON.

Le Dr RIEL m'ayant demandé de lui déterminer quelques Coléoptères provenant de ses propres chasses ou de celles de feu GRILAT, je m'empresse de signaler quelques captures particulièrement intéressantes.

CLIVINA COLLARIS Herbst. — *Rhône* : Lyon, île du Grand-Camp, le 9 mars 1928.

AGATHIDIUM NIGRINUM Sturm. — *Ain* : la Pape, vallon de Sermenaz, le 26 avril 1912, 1 individu.

COLOBICUS EMARGINATUS Latr. — *Rhône* : bois de Marcy, le 23 août 1912, 1 individu.

AGRILUS ASPERRIMUS Mars. (REYI Bauduer). — *Ain* : Villars-les-Dombes (Grilat), 1 individu, le 3 août 1913. Espèce rare et difficile à distinguer des *A. laticornis* Ill. ♀.

HYPOLITHUS (*Hypnoidus* auct.) GROUVELLEI Buys. — *Basses-Alpes* : Allos, juillet, 1 ♀. J'ai pu comparer cet exemplaire, capturé par le Dr RIEL, au type même d'Henri du Buysson, trouvé à Saint-Martin-Vesubie par Ant. GROUVELLE et conservé actuellement au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Cette espèce avait déjà été reprise dans les Basses-Alpes, par P. de PEYERIMHOFF, puis par A. HUSTACHE, au Cheval-Blanc. Le ♂ est encore inconnu et la ♀ reste fort rare.

CTENICERA PECTINICORNE L. et SELATOSOMUS AENEUS var. CAERULEUS Schilsky. — *Ain* : Colombier-du-Bugey, mai 1925. Espèces des régions montagneuses.

CRYPTOCEPHALUS SINUATUS Harold. — *Hautes-Alpes* : La Bessée, le 8 juillet 1927.

CRYPTOCEPHALUS BILINEATUS var. BISBILINEATUS Pic. — *Haute-Savoie* : Chamonix, le 13 juillet 1913.

PACHYBRACHYS PRADENSIS Muls. — *Isère* : Décines, le 27 juillet 1913.

RHIZOTROGUS ASSIMILIS Herbst. — *Hautes-Alpes* : La Bessée, 1 ♀, le 5 juillet 1927.

### Diagnoses de Coléoptères exotiques

Par M. Pic.

*Phrixothrix acuminatus* n. sp. Elongatus, elytris postice acuminatis, nitidus, griseo aut fusco pubescens, testaceus, capite thoraceque nigris, illis sat fortiter et sparse punctatis; elytris impressis, elongatis, ad medium paulos dilatatis, postice valde attenuatis et apice subopacis, antice minute sat sparse punctatis.

Longueur : 13 millimètres.

République Argentine (coll. Pic).

Voisin de *P. hirtus* E. Ol., mais moins robuste avec les élytres plus longuement acuminés et le prothorax foncé.

*Nemostira Salvazai* n. sp. Sat elongata, pro parte glabra, nitida, nigra, supra rufa, membris nigris; capite sat lato, diverse sed fortiter punctato, oculis sat approximatis; antennis gracilibus, articulo ultimo longissimo, thorace parum breve, sat lato, postice transverse sulcato, diverse pro parte sparse punctato; elytris thorace valde latioribus, subparallelis, postice attenuatis, dense pro parte lineato-punctatis; pedibus sat gracilibus.

Longueur : 13 millimètres.

Laos (coll. Pic).

Voisin de *N. humeralis* Pic, en diffère par la ponctuation moins fine des élytres, le prothorax plus fortement ponctué et la coloration rousse de l'avant-corps.

*Bruchus albosuturalis* n. sp. Oblongo-elongatus, niger, supra dense luteo pubescens, thorace postice medio albo lineato, scutello et sutura albo pubescentibus, infra corpore pro majeure parte dense albo pubescente, membris rufis, pygidio medio reducte albo lineato.

Longueur : 3,5-4 millimètres.

Brésil (coll. Pic).

Espèce très distincte par son revêtement fait de deux colorations avec la ligne blanche suturale prolongée sur le prothorax et le pygidium.

*Bruchus grossoensis* n. sp. Oblongo-elongatus, pro parte dense griseo pubescens, rufus, thorace pro parte lateraliter elytris lateraliter late et apice pectoreque nigris; thorace obconico, pro parte granuloso; elytris parum elongatis, lateraliter subarcuatis; pedibus posticis validis, tibiis curvatis.

Longueur : 2,5 millimètres.

Brésil (coll. Pic).

Voisin de *B. carneofasciatus* Pic par sa forme mais de coloration tout autre.

*Bruchus bicoloriceps* n. sp. Oblongo-elongatus, parum nilidus, pro parte griseo pubescens, rufus, capite medio nigro, elytris ad humeros et lateraliter postice irregulariter piceis, sutura picea.

Longueur : 3 millimètres.

Brésil (coll. Pic).

Voisin du précédent, plus brillant, tête plus courte, largement foncée entre les yeux, élytres non maculés de foncé à leur sommet interne.

*Bruchus alboscutus* n. sp. Oblongo-subovatus, parum nitidus, nigro-piceus, supra pro parte rufescens, antennis, pedibus 4 anterioribus, posticis pro parte, abdomine pygidioque testaceis scutello dense albo pubescente, elytris minute et disperse griseo maculatis; capite sat breve, pro parte rufot, pro parte piceo; antennis sat brevibus, apice valde dilatatis; thorace rufo, medio piceo, breve et lato, antice attenuato; elytris latis, sat brevibus, nigro-piceis, ad bosim paulo rufescentibus.

Longueur : 4 millimètres.

Brésil (coll. Pic).

Par sa forme se rapproche de *B. breveapicalis* Pic, mais coloration plus foncée et élytres nettement mouchetés de gris.

*Chrysochus gunnanus* v. nov. *minutus*. Oblongus, nigro-cyaneus, supra violaceus; thorace sparse et diverse fortiter punctato; elytris minute et pro majeure partie irregulariter sat-dense punctatis, humeris valde prominulis.

Longueur : 7 millimètres.

Chine (coll. Pic).

Diffère de la forme-type par la coloration du dessus plus uniforme, la ponctuation plus fine ou plus rapprochée des élytres, le prothorax autrement ponctué.

*Cyaniris (Gynandropkthalma) bicoloriceps* n. sp. Oblonga, nitida, supra-glabra et minute punctata, testacea, capite postice nigro, elytris ad basim et ante apicem transverse nigro fasciatis, fascia postica reducta, antennis apice, tibiis, tarsisque anticis et intermediis pro parte piceis.

Longueur : 4-4,5 millimètres.

Cochinchine (coll. Pic).

Voisin de *C. cochinchinensis* Lef., en diffère, à première vue, par la tête bicoloré, les dessins franchement noirs et différents de élytres.

### Insecte présenté

*Bembidion (Trepanes) Doris* Gyll. (Coléoptères Carabidés). Plusieurs exemplaires déterminés par M. J. -JACQUET ont été capturés par M. AUDRAS à Rossillon (Ain), au bord d'un étang parmi les roseaux. Cet insecte, surtout septentrional, ne figure pas dans le catalogue du département de l'Ain, par GUILLEBEAU et n'est indiqué dans le catalogue de Saône-et-Loire, que d'Auntun, étang de la Croisette (FAUCONNET) et de Moulins (OLIVIER).

### APPEL AUX NATURALISTES

Le Laboratoire de Cancérologie (Société Internationale de recherches contre le Cancer), 17, square de Messine, Paris (8<sup>e</sup>), demande aux naturalistes qui excursionnent en montagne en juillet de bien vouloir récolter la plus grande quantité possible d'Ellébore blanc (*Veratrum Album*) pour recherches sur le cancer et étude histochimique approfondie de cette plante.

La correspondance et les notes devront être adressées à M<sup>me</sup> PACAUD, 45, boulevard Brune, Paris (14<sup>e</sup>), et les plantes expédiées directement au Laboratoire, 17, square de Messine, Paris (8<sup>e</sup>).

En raison du but hautement humanitaire de ces recherches, nous demandons instamment à nos collègues de bien vouloir s'y intéresser.

### ÉCHANGES, OFFRES ET DEMANDES

M. LEPIGRE, préparateur à l'Insectarium du Jardin d'Essai d'Alger, recherche, pour l'établissement dont il fait partie, le quatrième tome de SPULER (*Chenilles de lépidoptères paléarctiques*) ou, à défaut, tout ouvrage ayant trait aux Chenilles paléarctiques.

M. DERVIN-VILLEMENOT, à Lucquy (Ardennes), achèterait : cocons vivants de *Saturnia pyri*, *cynthia*, *aglaia tau*, chrysalides de sphynx ; de même oothèques de *mantis religiosa* (non du Midi).

Le Gérant : O. THÉODORE.