

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON.

Année 1860

(NOUVELLE SÉRIE.)

TOME SEPTIÈME.



LYON.

IMPRIMERIE DE F. DUMOULIN, LIBRAIRE,
rue St-Pierre, 20.

PARIS.

CHEZ F. SAVY, LIBRAIRE,
rue Bonaparte, 20.

1860. — Février 1861.

DESCRIPTION
D'UNE
ESPÈCE NOUVELLE DE COLÉOPTÈRE
DU GENRE **DASYTES**,

PAR
E. MULSANT et **REVELIÈRE**.

(Lue à la Société Linnéenne de Lyon, le 9 juillet 1860)

Dasytes tibialis.

Oblong; d'un noir luisant ou brillant; hérissé en dessus de poils noirs sur le prothorax, mi-couchés et concolores sur les élytres: celles-ci parées chacune de deux taches d'un orangé testacé: l'antérieure, presque en triangle transverse, rapprochée du bord externe, prolongée dans ce point du septième au tiers de la longueur, étendue transversalement presque jusqu'au quart interne: la seconde, de largeur presque égale, obliquement dirigée, presque des deux tiers de la largeur des étuis, vers le bord sutural qu'elle n'atteint pas, des huit aux neuf dixièmes de la longueur de celui-ci. Dessous du corps et cuisses d'un noir luisant: trochanters, tibias et tarses, d'un flave testacé.

Long. 0,0033 (1 1/2 l.). Larg. 0,0011 (1/2 l.).

Corps oblong; médiocrement convexe. luisant et garni de poils. Tête inclinée; peu convexe; d'un noir luisant; marquée de points assez grossiers et médiocrement rapprochés, donnant chacun naissance à un poil noir, hérissé; marquée, près de l'épistome, de deux légères fossettes: parties de la bouche d'un noir luisant, avec les mâchoires fauves. Antennes prolongées à peine jusqu'aux angles postérieurs du prothorax; noires;

grossissant faiblement et graduellement à partir du troisième article : celui-ci plus long que large : les quatrième à dixième plus larges que longs, subdentés au côté interne : le onzième ovalaire, renflé dans son milieu, rétréci en pointe vers l'extrémité. *Prothorax* tronqué en devant; subarrondi ou arqué sur les côtés, mais un peu plus rétréci dans sa seconde moitié que dans la première; subarrondi aux angles de devant et plus arrondi aux postérieurs; un peu en arc dirigé en arrière, à la base; rebordé dans sa périphérie; de moitié plus large que long; convexe; d'un noir luisant ou brillant; marqué de points grossiers, médiocrement rapprochés, donnant chacun naissance à un poil noir, hérissé; rayé de deux lignes longitudinales un peu sinueuses, naissant chacune dans la direction du côté de l'œil et prolongée jusqu'aux angles postérieurs. *Écusson* en triangle, à côtés curvilignes, au moins aussi large à la base qu'il est long sur son milieu; déprimé transversalement; noir; luisant; pointillé; peu hérissé des poils. *Élytres* un peu plus larges en devant que le prothorax dans son diamètre transversal le plus grand; deux fois et demie à trois fois aussi larges que lui; subparallèles et graduellement et faiblement élargies jusqu'aux trois quarts de leur longueur, obtusément arrondies à l'extrémité, prises ensemble; peu convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés; munies à ceux-ci d'un rebord invisible en dessus et s'effaçant postérieurement; munies d'un rebord sutural presque nul en devant; d'un noir luisant, parées chacune de deux taches d'un orangé testacé: la première, presque liée au bord externe, où elle est prolongée du septième au tiers de la longueur de l'étui, transversalement étendue au côté interne jusqu'au tiers ou presque au quart de la largeur, en ligne courbe à son bord antérieur, échancrée en arc à son bord postérieur, graduellement moins développée en longueur de dehors en dedans, terminée à son côté

interne en pointe un peu arquée : la seconde, oblique, presque parallèle au bord postérieur, ordinairement de longueur uniforme, quelquefois plus développée près de la suture : dans ce premier cas, une fois et quart plus longue que large, naissant vers les deux tiers de la largeur et un peu plus avant que les deux tiers de la longueur, obliquement dirigée vers le rebord sutural qu'elle ne touche pas ou qu'elle atteint à peine, des quatre cinquièmes ou plus rarement (quand elle offre plus de développement près de la suture) presque des deux tiers aux neuf dixièmes de la longueur des étuis; un peu moins grossièrement ponctuées que le prothorax; garnies de poils concolores, mi-hérissés; souvent déprimées près de la suture, vers le tiers ou les deux cinquièmes. *Repli* étroit sur les côtés de la poitrine, réduit postérieurement à une tranche. *Dessous du corps* noir; luisant, finement ponctué; garni de poils fins. *Pieds* médiocres; garnis de poils fins; noirs sur les cuisses, d'un fauve testacé sur les trochanters, les tibias et les tarsi.

Cette espèce habite la Corse; elle se trouve sur le *Cakile maritima*.
