

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON. D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})

Trésorier : M. H. BONVALLET, 20, rue Molière, Lyon (6^e).

ABONNEMENT ANNUEL :	France et Union	10 F	— C.C.P. Lyon 101-98
	Etranger	11 F	
	Scolaires	5 F	

Les participants de Lyon rejoindront Saint-Etienne par chemin de fer ou cars (départ vers 7 h de Perrache, vérifier l'horaire), ou encore par voitures particulières, pour se trouver au rendez-vous général fixé devant la gare de Châteaureux où le car de Roanne les attendra à l'arrivée du train, vers 8 h 45. Toutes instructions seront données au siège où il convient de se faire inscrire pour fixation à l'avance du nombre de places à réserver dans le car de Roanne.

DONS

Dr J.-L. NICOLAS, Lyon : 20 F (en contribution aux frais de publication du bulletin). — M. REVELLET, Valence : 10 F. — M. P. BENOIST, à Bois-le-Roi : 20 F. — Dr SAPALY : 5 F. — M. TOURSEILLIER, Paris : 10 F. — M. MOMOT, Paris : 10 F. — M. L. FROQUET : 4,60 F. — M. G. NÉTIEN : 10 F. — M. MARCHAL : 15 F.

PARTIE SCIENTIFIQUE

UNE NOUVELLE POLYMIXIS HB. D'ESPAGNE (LEP. NOCT.) (Description préliminaire)

(Contributions à l'Etude des « Noctuidae-Trifinae », 127)¹

par Ch. BOURSIN (Paris).

Au cours d'un voyage d'exploration, que nous avons effectué en Espagne en octobre dernier, notre collègue M. Y. DE LAJONQUIÈRE et moi-même, nous avons capturé, le premier soir de chasse, un exemplaire d'une espèce nouvelle du genre *Polymixis* Hb. (*Antitype* auct. p.p.), que je décris ci-après :

Polymixis lajonquierei n. sp.

♂, Antennes brièvement dentées et ciliées. Aspect général très foncé, gris-noirâtre, les ailes antérieures avec les dessins indistincts, sauf les taches orbiculaire et réniforme, très grandes, qui se détachent principalement la seconde, en gris-blanchâtre sale sur le fond.

Ailes postérieures gris-blanchâtre sale, avec les discocellulaires et la postmédiane très marquées en foncé, ainsi qu'une bande terminale de la même teinte, relativement étroite. En outre, les nervures se détachent très nettement en foncé.

Abdomen recouvert d'écaillés d'un noir profond et jaune clair mélangées, avec la touffe anale d'un jaune fauve et des crêtes abdominales sur presque tous les segments, les plus fortes sur les segments 1 à 4, leur base étant de la teinte de la touffe anale.

♀ inconnue.

Envergure : 41 mm.

Holotype : 1 ♂, La Vid (Burgos) (Espagne), 2 octobre 1962 (Coll. Y. de Lajonquière).

Armature génitale ♂ : du même type que celle des *Pol. flavicincta* Schiff., *rufocincta* Hb.-G. et *chrysographa* Wgnr. (*philippsi* Pglr. appar-

1. Voir 126 dans ce même Bulletin, 1963, n° 3, p. 72.

tient également à ce groupe mais est plus différenciée). S'en distingue par la forme de l'extrémité des valves, de l'ampulla et par la constitution du pénis, caractères qui seront décrits en détail plus tard.

Affinités : Cette intéressante nouvelle espèce, qui appartient au groupe des *Pol. flavicincta* Schiff., *rufocincta* Hb.-G. et *chryso-grapha* Wgnr., se distingue de celles-ci par sa teinte noirâtre, très différente de celle de toutes les espèces voisines et qui la fait ressembler un peu à une *Mam. brassicae* L. foncée, par ses antennes brièvement dentées et ciliées ainsi que par les caractères de l'armure génitale. Elle doit prendre place après *Pol. rufocincta* Hb.-G. Il s'agit vraisemblablement d'un élément atlanto-méditerranéen. Elle sera figurée, ainsi que son armure génitale, dans un travail ultérieur.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 10 avril 1963.

Erratum.

Par suite d'une perturbation dans l'envoi des épreuves, une faute d'impression s'est glissée dans mon précédent article, intitulé « Une espèce de *Noctua* L. (*Triphaena* O.), européenne et française, méconnue depuis 173 ans, etc... », paru dans ce même Bulletin, n° 3, 1963, p. 72. Page 75, au milieu, et p. 79, dans la synonymie, la date de parution de *Noctua consequa* Hb. (fig. 105), 1809-1813 doit être corrigée en : **1800-1803**.

QUELQUES CAPTURES INTERESSANTES POUR LA FAUNE ESPAGNOLE DONT UNE ESPECE NOUVELLE POUR L'EUROPE (Contributions à l'Étude des « Noctuidae-Trifinae », 129) ¹

par Ch. BOURSIN (Paris).

Cardepija sociabilis Grasl. 1^{re} génération *ghigii* Trti.

3 superbes exemplaires ♂♂ de cette forme, dans son habitus très différente de la deuxième génération, que l'on prend habituellement, ont été capturés par MM. DE LAJONQUIÈRE et BARAUD au Cabo de Gata, près d'Almeria (Espagne sud-est), le 7 avril 1960.

Mythimna umbrigerata palaeoarctica Brsn. et Rungs.

J'ai signalé cette espèce comme nouvelle pour l'Europe dans le « Zeitschr. d. Wien. ent. Ges. », 1962, p. 97, d'après une ♀ prise par M. J.-R. CARON aux environs de Malaga. Un second exemplaire tout à fait semblable et également ♀ a été capturé par M. Y. DE LAJONQUIÈRE à Orgiva (Grenade) le 20 avril 1960.

Blepharita spinosa Chrét. bona sp. nouvelle pour l'Europe.

Une série d'exemplaires des deux sexes de cette espèce, décrite d'Algérie et connue jusqu'à présent seulement d'Afrique du nord, voisine des *Bleph. solieri* Dup. et *compitalis* Drdt., a été capturée par MM. Y. DE LAJONQUIÈRE et BARAUD à Villamanrique (Séville) et Orgiva (Grenade) en avril 1955 et 56 et octobre 1960, dont détail ci-après.

1. Voir 128 in « Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen », Bericht Nr. 1170, 1963.