

# ANNALES

DE LA

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON.

---

*Année 1860*

(NOUVELLE SÉRIE.)

TOME SEPTIÈME.



LYON.

IMPRIMERIE DE F. DUMOULIN, LIBRAIRE,  
rue St-Pierre, 20.

PARIS.

CHEZ F. SAVY, LIBRAIRE,  
rue Bonaparte, 20.

1860. — Février 1861.

# NOTE

SUR L'HARMONIA LYNCEA.

( COCCINELLIDE ),

PAR

**E. MULSANT.**

( Présentée à la Société Linnéenne de Lyon , le 14 mai 1860. )

---

L'espèce de Coccinellide désignée par Olivier sous le nom de *lyncea*, dont je n'avais eu sous les yeux qu'un seul exemplaire, celui de la collection Dejean, a beaucoup d'analogie avec l'*Harmonia 12-pustulata*; mais elle doit constituer une espèce particulière. Elle se distingue de cette dernière, ainsi que je l'avais dit, par son prothorax orné sur la ligne médiane de la partie noire, d'une ligne blanche prolongée jusqu'aux trois quarts de la longueur du segment prothoracique; par le réseau noir des élytres plus étroit; par les taches ou mailles de ce réseau conséquemment plus développées; par la deuxième tache juxta-suturale réniforme, entaillée dans le milieu de son bord antérieur; par la postérieure, transverse, en espèce de parallélogramme, une fois plus large que longue; par ses tibias et tarses et parfois la totalité des pieds, d'un flave ou livide testacé. Ces caractères se sont trouvés constants sur un certain nombre d'individus que j'ai eu l'occasion d'examiner.

Cette espèce est exclusivement méridionale. L'exemplaire d'Olivier provenait du Portugal; celui de la collection

Dejean, d'Espagne. Elle a été prise à Hyères par M. Cl. Rey et par feu M. Foudras.

Elle peut donc être caractérisée ainsi :

**Harmonia lyncea**, OLIVIER.

*Brièvement ovale. Prothorax noir, paré d'une ligne médiane postérieurement raccourcie, d'une bordure antérieure étroite, d'une bordure latérale large, formant une tache irrégulièrement quadrangulaire prolongée jusqu'aux angles postérieurs, flaves. Elytres ornées d'un réseau noir, étroit, enclosant six taches d'un jaune pâle : trois marginales ou liées au bord externe qui reste flave ; (la postérieure ou apicale une fois plus large que longue) : trois, internes ou juxta-suturales en quinconce avec les précédentes (la deuxième réniforme). Trochanters, tibia et tarsi, et parfois tous les pieds, d'un flave testacé.*

*Coccinella lyncea*, OLIV. Entom. t. VI, p. 4036, 404, pl. 7, fig. 145.

*Harmonia lyncea*, MULS. Spéc. des Coléopt. trim. sécurip. p. 92, 16.