

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gen. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; *Trésorier* : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement annuel	} France et Colonies fr ^{es}	10 fr.
		} Etranger

SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

3061 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions***Ont été admis à la séance du 11 mars :*

M^{mes} Maréchal, Grillet-Champagnat, MM. Laurent, Paradisi, Pernelle, Gairal de Sérezin, Lafond, Laffay, Chervet, Watson, Magne, Vercasson, Gaudry, Payre, Strausbaugh, Bergeron, Meyer, Gelas, Drioux, Schâffer, Servelle, Bézaziau, Lebrat, Raymond, l'Insectarium du Hamma (Alger), MM. Grange, Schoneich, Chosson, Besson, Colleur.

RÉUNION DU COMITÉ DE PUBLICATION

MM. les Membres du Comité de Publication sont priés de se réunir jeudi 27 mars, à 17 heures, pour la clôture du volume de 1929.

SECTION BOTANIQUE**ORDRE DU JOUR**

DE LA

Séance du Mardi 25 Mars, à 20 heures

- 1^o M^{lle} A.-M. BEAUVERIE. — Présentation de plantes de Sibérie envoyées à l'herbier Bonaparte par l'herbier de Tomsk.
- 2^o M. A. TRONCHET. — La constitution des plantules anormales de dicotylédones s'accorde-t-elle avec les conceptions de phyllorhife et convergent ?
- 3^o Présentation de plantes fraîches.

SAINTE-CLAIRE DEVILLE a été le premier à rencontrer cet Haliplide en France, dans les marais tourbeux de Rang du Fliers (Pas-de-Calais). Il habite aussi la région lyonnaise. M. le Dr GUIGNOT¹ a reconnu *H. lineolatus* dans un lot de Coléoptères aquatiques, recueillis par M. G. AUDRAS ; cet entomologiste a capturé l'espèce dans le département de l'Ain, à Aranc, à Molon et à Izenave.

Séance du 4 Mars

Insecte présenté

M. J. JACQUET présente *Diachromus germanus* L. var. *bimaculatus* Joukl. (Col. Carabidae). Cette variété diffère du type de Linné par la présence à la base des élytres d'une tache triangulaire noirâtre entourant l'écusson ; décrite de Moravie, elle est considérée comme très rare en France. M. CHOSSON en a capturé plusieurs individus à Beynost (Ain).

Nouveaux coléoptères exotiques

Par M. PIC.

Xystropus inhirsutus v. nov. *diversicolor*. Nigro-subaeneus, thorace pro majeure partie circa élytrisque rufis. — Brésil (coll. Pic). — Diffère de la nuance typique par le prothorax bicolore et le élytres plus clairs.

Poecilosthus testaceitarsis n. sp. Oblongo-sub-ovatus, parum nitidus, niger, élytris nigro-sub-cyaneis, palpibus tarsisque testaceis.

Oblong-subovalaire, peu brillant, très noir avec les élytres faiblement bleutés, les palpes et tarsi testacés ; tête densément et ruguleusement ponctuée ; prothorax court et très large, un peu angulé sur les côtés, sillonné au milieu et orné de plusieurs impressions dont deux discales profondes, assez fortement et en partie densément ponctué ; écusson convexe, peu ponctué ; élytres un peu plus larges que le prothorax, très bombés sur le milieu, subacuminés et infléchis à l'extrémité, faiblement striés-ponctués, intervalles finement ponctué et réticulés. Longueur : 9 millimètres, Pérou (coll. Pic).

Très voisin de *P. inhumeralis* Pic, mais de coloration tout autre ; en diffère, en outre, par le prothorax sillonné au milieu et les élytres encore plus surélevés sur leur milieu.

Pseudopachymerus multimaculatus (nov.) Minutus, oblongus, rufescens, pro parte niger, dense albo pubescens, multi nigro aut brunneo maculatus, membris pro majeure parte testaceis. Longueur : 3 millimètres. Brésil (coll. Pic).

A placer près de *P. ruficornis* Chev. dont il n'est peut-être qu'une variété.

Variation : La var. *binotatus* mihi, du Brésil, a les élytres ornés d'une macule humérale élargie noire et d'une autre postmédiane externe faite de plusieurs macules jointes, le pygidium est brièvement maculé de foncé sur les côtés. La var. *paulonotatus* mihi, de Jatahy, offre un revêtement gris presque concolore, les élytres étant très peu maculés et le prothorax a le milieu du disque rembruni.

Pseudo pachymerus maculatopygus n. sp. Minutus, oblongus, niger, dense griseo pubescens, multi nigro aut brunneo maculatus, membris pro majeure parte testaceis, pygidio medio nigro rotundato maculato. Longueur : 3 millimètres. Brésil (coll. Pic).

Ressemble au précédent, ayant comme lui des macules foncées au prothorax et sur les côtés des élytres (variant de nombre, ou de grandeur) et

¹ Dr GUIGNOT, *Bullet. Soc. Ent. de France*, 1928, n° 19, p. 298.

s'en distinguant, à première vue, par le pygidium orné d'une grande macule arrondie noire.

Bruchus bicoloripes n. sp. Oblongus, nitidus, griseo uniformiter, parum dense, pubescens, niger antennis ad basin, pedibus 4 anticis, tibiis tarsisque posticis testaceis.

Oblong, brillant, revêtu d'une pubescence grise uniforme, noir, avec partie des membres testacés ; antennes assez robustes ; prothorax assez court et large, très rétréci en avant ; élytres subarqués sur les côtés, un peu creusés sur la suture, striés-ponctués ; cuisses postérieures dentées. Varie par les pattes postérieures toutes noires (v. *jatayensis*), ou testacées (v. *indiversipes*). Longueur : 3 millimètres, Brésil (coll. Pic).

Peut se placer près de *B. Bondari* Pic, mais revêtement pubescent uniforme avec le pygidium non orné d'une courte ligne blanche.

Sagra minuta n. sp. Oblonga, nitida, nigro-aenea ant olivacea, supra pro parte violacea, pro parte viridis, elytris purpureis, externe violaceo marginatis.

Oblong, brillant, noir à reflets bronzés ou olivâtres, avec l'avant-corps violacé, le milieu du front et du prothorax verdâtre, les élytres pourprés à bordure latérale violacée ; tête éparsément ponctuée ; antennes robustes ; prothorax court et large, anguleusement dilaté sur les côtés antérieurs, à ponctuation forte, diversement écartée ; écusson très petit ; élytres larges et peu longs, subsinués sur les côtés, un peu rétrécis à l'extrémité, ornés d'une ponctuation assez forte, diversement écartée et de plis fins irréguliers. Longueur : 6 millimètres. Yunnan (coll. Pic).

Diffère de *S. Petili* Lac., en outre de la coloration, par la ponctuation irrégulière des élytres et la présence de nombreux plis.

Nodostoma Martini v. nov. *atrovittata* Rubra, élytris in disco et oblique nigro vittatis, membris pro parte nigris. Tonkin (coll. Pic).

La forme-type *N. Martini* Lef. n'a pas de bandes noires aux élytres.

Notes de chasse et d'élevage

(Troisième note¹)

Par M. J. LACROIX

J'ai fait en 1929 (du 30 juin au 23 octobre), un certain nombre de chasses de nuit (lampe et miellée) qui m'ont donné de nombreux Lépidoptères dont j'ai donné la liste dans le dernier volume des *Mémoires de la Soc. de Vulgarisation des Sc. Nat. des Deux-Sèvres*. J'ai observé en outre, sur les miellées, un certain nombre d'autres bestioles que je crois utile de signaler simplement aujourd'hui sans insister davantage.

Saint-Martin-de-la-Coudre (Charente-Inférieure), le 8 août (miellées visitées entre 20 heures et 21 h. 30, heure réelle bien entendu) : *Cryptops anomalans* Newp. (Myriapode), s'est laissé tomber sur le sol à l'approche de la lumière ; *Meconema thalassina* De Geer (Orthoptère) ; *Carabus purpurascens* F. (Coléoptère).

Même localité, le 10 août : *Chaetechelyne vesuviana* Newport (Myriapode), à 21 h. 30 ; *Phasgoniwa viridissima* L. (Orthoptère), à 22 h. 45 ; *Phaneroptera falcata* Poda (Orthoptère), à 22 h. 45 ; *Meconema thalassina* De Geer, de 21 h. 30 à 22 h. 45 ; *Acheta campestris* L. (Orthoptère), un exemplaire non adulte ; *Ectobius lividus* F. (Orthoptère), assez nombreux exemplaires ; *Carabus purpurascens* F. ; *Chrysopa flavifrons* Brauer (Névroptère), un exem-

¹ Voir ma deuxième note in *Bull. bi-mensuel Soc. Linn. de Lyon*, n° 19, 6 décembre 1929.