

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937  
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON. D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

**Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>me</sup>)**

Trésorier : M. H. BONVALLET, 20, rue Molière, Lyon (6<sup>e</sup>).

---

<b>ABONNEMENT ANNUEL :</b>	France et Union .. . . . .	10 F	— C.C.P. Lyon 101-98
	Etranger .. . . . .	11 F	
	Scolaires .. . . . .	5 F	

---

tient également à ce groupe mais est plus différenciée). S'en distingue par la forme de l'extrémité des valves, de l'ampulla et par la constitution du pénis, caractères qui seront décrits en détail plus tard.

**Affinités :** Cette intéressante nouvelle espèce, qui appartient au groupe des *Pol. flavicincta* Schiff., *rufocincta* Hb.-G. et *chrysographa* Wgnr., se distingue de celles-ci par sa teinte noirâtre, très différente de celle de toutes les espèces voisines et qui la fait ressembler un peu à une *Mam. brassicae* L. foncée, par ses antennes brièvement dentées et ciliées ainsi que par les caractères de l'armure génitale. Elle doit prendre place après *Pol. rufocincta* Hb.-G. Il s'agit vraisemblablement d'un élément atlanto-méditerranéen. Elle sera figurée, ainsi que son armure génitale, dans un travail ultérieur.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 10 avril 1963.

#### Erratum.

Par suite d'une perturbation dans l'envoi des épreuves, une faute d'impression s'est glissée dans mon précédent article, intitulé « Une espèce de *Noctua* L. (*Triphaena* O.), européenne et française, méconnue depuis 173 ans, etc... », paru dans ce même Bulletin, n° 3, 1963, p. 72. Page 75, au milieu, et p. 79, dans la synonymie, la date de parution de *Noctua consequa* Hb. (fig. 105), 1809-1813 doit être corrigée en : **1800-1803**.

### QUELQUES CAPTURES INTERESSANTES POUR LA FAUNE ESPAGNOLE DONT UNE ESPECE NOUVELLE POUR L'EUROPE (Contributions à l'Étude des « Noctuidae-Trifinae », 129) <sup>1</sup>

par Ch. BOURSIN (Paris).

*Cardepija sociabilis* Grasl. 1<sup>re</sup> génération *ghigii* Trti.

3 superbes exemplaires ♂♂ de cette forme, dans son habitus très différente de la deuxième génération, que l'on prend habituellement, ont été capturés par MM. DE LAJONQUIÈRE et BARAUD au Cabo de Gata, près d'Almeria (Espagne sud-est), le 7 avril 1960.

*Mythimna umbrigerata palaeoarctica* Brsn. et Rungs.

J'ai signalé cette espèce comme nouvelle pour l'Europe dans le « Zeitschr. d. Wien. ent. Ges. », 1962, p. 97, d'après une ♀ prise par M. J.-R. CARON aux environs de Malaga. Un second exemplaire tout à fait semblable et également ♀ a été capturé par M. Y. DE LAJONQUIÈRE à Orgiva (Grenade) le 20 avril 1960.

*Blepharita spinosa* Chrét. bona sp. nouvelle pour l'Europe.

Une série d'exemplaires des deux sexes de cette espèce, décrite d'Algérie et connue jusqu'à présent seulement d'Afrique du nord, voisine des *Bleph. solieri* Dup. et *compitalis* Drdt., a été capturée par MM. Y. DE LAJONQUIÈRE et BARAUD à Villamanrique (Séville) et Orgiva (Grenade) en avril 1955 et 56 et octobre 1960, dont détail ci-après.

1. Voir 128 in « Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen », Bericht Nr. 1170, 1963.

C'est une espèce d'assez grande taille (38/41 mm) qui se différencie de ses voisines principalement par les caractères de l'armure génitale, notamment par la forme de l'apex proximal supérieur du sacculus, qui constitue un clavus modifié, l'ampulla et la forme du cucullus. Extérieurement, elle se distingue de *solieri* Dup. par ses dessins beaucoup plus marqués et plus nets.

Il s'agit d'un élément atlanto-méditerranéen qui pourrait se trouver dans le Midi de la France.

Villamanrique : 20 ♂♂, du 8 avril au 11 avril 1955.

3 ♂♂, 1 ♀, 6 et 8 avril 1956.

Orgiva : 2 ♂♂, 1 ♀, 5 et 11 octobre 1960 (Coll. de Lajonquière, Baraud, Boursin et Heinicke).

*Photedes pygmina* Haw. **libyodes** n. sp.

Une série d'exemplaires de cette espèce a été capturée dans les Provinces de Grenade et de Séville par MM. DE LAJONQUIÈRE et BARAUD. Très différents des exemplaires européens normaux, ils ressemblent d'une manière frappante à la ssp. *africana* Ob., figurée dans les « Et. Lép. Comp. », XVI, 1918, pl. XDI, fig. 4049 à 4051, provenant de Géryville, Aflou, etc... Cette race est caractérisée par sa grande taille (26/30 mm), par le rembrunissement très marqué de la nervure cubitale, rembrunissement qui s'étend en éventail le long des nervures vers le bord terminal, et par les ailes inf. presque blanches. Les exemplaires d'Andalousie présentent également les principaux de ces caractères, la plupart sont d'une grande taille, l'un d'eux mesure 32 mm, mais le rembrunissement de la nervure cubitale est encore plus marqué, se détachant très nettement sur le fond, et les ailes inférieures sont brunâtre et non blanches. La majorité des exemplaires mesure en moyenne 30 mm, mais la taille de quelques uns se rapproche de celle des individus européens normaux. La teinte générale est brunâtre, seuls un ou deux exemplaires sont légèrement rougeâtres. L'armature génitale des deux sexes est semblable à celle de la forme typique.

Il y a lieu de signaler ici que la « *Tapinostola* » *mabiliei* Lucas, décrite du Tarf (Algérie), n'est qu'une forme de *Photedes pygmina* Haw. (*Photedes pygmina* Haw. = *mabiliei* Lucas **nov. syn.**), caractérisée par la ligne postmédiane fortement indiquée par une rangée de points noirs. Elle a été décrite ultérieurement par HAMPSON, précisément d'Algérie, comme Ab. 1 de cette espèce in « Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. », IX, p. 288, 1910 et nommée *fasciata* par Warren in SEITZ, Vol. III, p. 236, 1911. Une autre forme, où les lignes transversales sont également bien indiquées, a été nommée *transversa* par STAUDINGER.

Holotype : 1 ♂, Orgiva (Grenade), Espagne, 16 oct. 1960 (Coll. de Lajonquière).

Paratypes : plusieurs ♀♀, id. et Lanjaron (Grenade), Espagne, 17 oct. 1960 (Coll. de Lajonquière et Boursin).

Villamanrique (Séville), Espagne, 1 et 6 oct. 1960 (Coll. de Lajonquière, Baraud et Boursin).

Je remercie vivement M. DE LAJONQUIÈRE d'avoir bien voulu m'abandonner quelques Paratypes de cette nouvelle race.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 10 avril 1963.