

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON. D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})Trésorier : M. H. BONVALLET, 20, rue Molière, Lyon (6^e).

ABONNEMENT ANNUEL :	France et Union	10 F	— C.C.P. Lyon 101-98
	Etranger	11 F	
	Scolaires	5 F	

ADDITIONS AU CATALOGUE DES MACROLEPIDOPTERES DES PYRENEES-ORIENTALES

par J. BARAUD.

La parution d'un nouveau catalogue régional est toujours accueillie avec sympathie par l'entomologiste intéressé par ladite région, et chacun de comparer ses propres chasses à la nouvelle liste offerte.

C'est ce petit travail que je viens d'effectuer à propos du catalogue des Lépidoptères des Pyrénées-Orientales établi par Claude Dufay (1).

Depuis 5 ans que je chasse dans les Pyrénées-Orientales, en particulier au lieu-dit « les Ambollas », non loin de Vernet-les-Bains, il est normal que j'aie capturé bon nombre des espèces indiquées dans ce catalogue, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à trouver dans mes chasses 23 espèces non citées dans cet ouvrage.

Ces espèces nouvelles sont les suivantes :

Eudia pavonia L. : Plusieurs exemplaires ♀ : Céret, Forêt de la Masane, Ambollas (V).

Dendrolimus pini L. : Ambollas, 2 ex. (VIII).

Cerura erminea Esp. : Ambollas, 1 ex. (VII).

Drymonia querna F. : Ambollas, commun (VII-VIII).

Drymonia ruficornis Hfn. : Céret, Ambollas, assez commun (IV).

Lophopteryx cuculla Esp. : Ambollas, 7 ex. (VII-VIII).

Pygaera pigra Hufn. : Ambollas, (VII-VIII).

Noctua interposita Hb. : Ambollas, 7 ex. (V, VII). Cette espèce, méconnue, vient d'être rétablie par Ch. BOURSIN qui lui a consacré ici-même en mars 1963 un article où ont été données toutes précisions nécessaires.

Anaplectoides prasina Schiff. : Ambollas, 1 ex., (VII).

Tholera cespitis Schiff. : Ambollas, 1 ex. (VIII).

Panolis flammea Schiff. : Vernet, Ambollas, 3 ex. (IV-V).

Mythimna alopecuri syriaca Osth. : Vernet, 1 ex. (V). Cette espèce, longtemps confondue avec *M. sicula* Tr., a été reconnue en France par E. DE LAEVER (2). Elle était jusqu'ici connue des Basses-Alpes, de la Drôme et de l'Ardèche. L'exemplaire capturé à Vernet a été vérifié par ses genitalia.

Amphipyra livida Schiff. : Ambollas, 3 ex. (VII-VIII).

Amphipyra tetra F. : Ambollas, 1 ex. (VII).

Apamea remissa Hb. f. *obscurata* Haw. : Ambollas, 1 ex. (VII).

Cosmia affinis L. : Ambollas, 5 ex. (VII-VIII).

Dicycla oo L. : Ambollas, 1 ex., (VII).

Stilbia anomala Haw. : Ambollas, 1 ex., (VIII).

Bena prasinana L. : Ambollas, 1 ex., (VII).

Ephesia diversa Geyer : Ambollas, 1 ex., (VII).

Zanclognatha tarsicrinalis Knoch : Ambollas, en série, (VII-VIII).

Zanclognatha grisealis Schiff. : Ambollas, en série, (VII-VIII).

Polyploca ridens F. : Ambollas, 10 ex., (IV).

J'ajoute que chaque fois qu'un doute était possible, ces captures ont été vérifiées soit par Ch. BOURSIN, soit par Cl. DUFAY, soit par moi-même. à l'aide des genitalia.

Cette liste concerne tous les Macrolépidoptères, à l'exception des Geometridae auxquels je ne peux m'intéresser faute de temps.

Il serait possible d'ajouter la localité « Ambollas » à de nombreuses espèces citées par le catalogue, mais je pense que cela serait de peu d'intérêt.

Je voudrais pour terminer revenir sur trois espèces diurnes qui me paraissent importantes :

Tout d'abord *Pieris ergane* Geyer ; j'ai signalé la capture de cette espèce en 1960 (3) à Conat ; depuis, en août 1961 et août 1962, j'ai repris ce papillon, toujours dans la même localité, ainsi qu'en mai 1962 ; les exemplaires de 1^{re} génération sont assez différents de ceux de la génération estivale et cette question fera l'objet d'une communication prochaine en cours de rédaction.

Ensuite, *Callophrys avis* Chapm. : cette espèce, toujours rare en France, n'est signalée dans les Pyrénées-Orientales que d'Amélie-les-Bains ; je peux affirmer qu'elle n'est pas localisée au Vallespir et que je l'ai reprise dans le Conflent, à Ria-Sirach et à Conat : 5 exemplaires en fin avril — début mai 1962, mélangés à d'innombrables *Callophrys rubi* L.

Enfin, *Colias australis* Verity : cette espèce, récemment séparée de *C. hyale* L., est représentée en France par la ssp. *calida* Vty. J'ai signalé (4) la capture de plusieurs exemplaires de la ssp. *australis* s. str. (détermination G. BERNARDI) à Vernet-les-Bains et aux Ambollas. Il n'est pas surprenant d'y rencontrer cette sous-espèce typique qui occupe l'Espagne ; elle est même peut-être assez répandue mais méconnue de par la difficulté de séparer les deux sous-espèces.

Il est vraisemblable que les chasses futures permettront encore de nombreuses captures inédites pour les Pyrénées-Orientales, dans ce département qui offre tant de diversité de la flore et du climat ; la proximité de l'Espagne ne peut qu'y contribuer.

BIBLIOGRAPHIE.

1. DUFAY Claude. — Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées-Orientales, fasc. 6. Macrolépidoptères. Supplément à « Vie et Milieu », tome XII, fasc. 1, 1961.
2. DE LAEVER E. — Rev. Fr. Lép., 1952. XIII, 282.
3. BARAUD J. — Alexanor, 1961, 2, 7.
4. » — P.V. Soc. Linn. Bordeaux, 1961 (à paraître).

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 12 janvier 1963.

RAPHIDIA COGNATA RAMBUR (RAPHIDOPTERA) DANS LE TARN

par P. RÉAL et P. MONSARRAT.

Au début de juin 1961 nous avons chassé de façon intensive à Verdalle (Tarn) et nous comptons publier, plus tard, surtout une importante liste de Lépidoptères Hétérocères. Mais l'exploitation des résultats n'étant pas immédiate, nous donnerons d'abord quelques notes sur des groupes de moindre importance.

Ainsi, dans une clairière à quelques kilomètres à l'Ouest de Verdalle, nous avons capturé un exemplaire femelle de *Raphidia cognata* Rambur. Il est intéressant de le signaler d'abord parce que cette espèce est plutôt septentrionale en France et que c'est là une répartition fonda-