

Bulletin de la Société
entomologique de France

Société entomologique de France. Auteur du texte. Bulletin de la Société entomologique de France. 1928.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

- La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

[CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE](#)

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter utilisationcommerciale@bnf.fr.

1928. — N° 9

BULLETIN



DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832
RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE
PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

*Natura maxime miranda
in minimis.*



PARIS
AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, VI^e
1928

———— Le Bulletin paraît deux fois par mois

Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère capturée
dans les ferriers de Marmottes [COL. STAPHYLINIDAE]

par J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE.
[avec la pl. 3, de M. P. MARIÉ].

Oxypoda consobrina, n. sp. — Téguments en majeure partie noirs, peu brillants, couverts d'une pubescence couchée très fine. Pronotum d'un brun châtain foncé; les marges latérales passant au ferrugineux par transparence. Élytres d'un testacé ferrugineux, un peu plus foncé sur les côtés, avec une grande tache triangulaire rembrunie, mal limitée, partant des épaules et se terminant en pointé au quart postérieur de la suture. Abdomen noir, avec le tiers postérieur du 7^e tergite et les parties visibles du 8^e segment ferrugineux. Palpes et antennes bruns, ces dernières non sensiblement plus claires à la base. Pattes testacées; les fémurs intermédiaires et postérieurs légèrement obscurcis.

Tête de grosseur normale; tempes sensiblement parallèles en arrière des yeux; ponctuation du dessus fine, mais nette et assez espacée.

Antennes longues et grêles; 3^e article sensiblement plus court que le 2^e; 4^e pas beaucoup plus court que le 3^e, nettement plus long que large; les suivants (5 à 10) subégaux, tous plus longs que larges; le dernier aussi long que les deux précédents réunis.

Pronotum pas beaucoup ($1/4$ environ) plus large que long, assez bombé sur son disque; la partie postérieure des côtés rectiligne, les angles postérieurs bien marqués, arrondis seulement à leur extrême sommet. Ponctuation du disque analogue à celle de la tête, mais plus serrée. Pubescence fine et couchée, les poils divergeant de part et d'autre de la ligne médiane.

Élytres, considérés ensemble, à peu près carrés, leur largeur aux épaules un peu inférieure à la longueur comprise entre la pointe de l'écusson et l'extrémité de la suture; le bord apical rentrant en angle très obtus sur la suture et marqué de chaque côté, au droit du bourrelet abdominal, d'une échancrure arrondie très profonde. Surface supérieure des élytres très aplanie, légèrement déprimée de chaque côté de l'écusson; rebord sutural très bien marqué, un peu saillant en arrière. Ponctuation serrée, un peu râpeuse, plus forte que celle du pronotum.

Dessus de l'abdomen couvert d'une ponctuation très fine, très serrée, chacun des points ayant la forme d'une courte hachure très nette, dirigée dans le sens de la longueur de l'insecte; dans l'impression de

base de chacun des trois premiers tergites visibles, les points sont ronds, un peu moins fins et beaucoup plus espacés, surtout sur les côtés.

Tarses postérieurs conformés à peu près exactement comme ceux de l'*Oxypoda longipes* Muls. Rey : le premier article sensiblement de la longueur des deux suivants, les articles 2, 3 et 4 décroissant progressivement et le dernier (ongle non compris) un peu plus court que les deux précédents réunis.

Basses-Alpes : environs de Larche, vers 2.000 mètres d'altitude, deux individus trouvés dans des terriers de Marmotte par M. P. MARIÉ.

Types in coll. P. MARIÉ et J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE.

Cette espèce se place à côté de l'*O. longipes* Muls. Rey, qui habite en Europe les nids souterrains de la Taupe et du Hamster. Elle en est tellement voisine que j'ai longtemps hésité à la décrire. Je m'y résous cependant, en raison de la parfaite constance des nombreux *O. longipes* que je possède, provenant de localités variées, et aussi bien des nids de Hamsters que des nids de Taupes.

Comparée à l'*O. longipes*, l'*O. consobrina* s'en distingue :

- 1° par ses antennes beaucoup plus longues et plus fines ;
- 2° par le pronotum moins court, moins déprimé sur la ligne médiane, avec les angles postérieurs mieux marqués ;
- 3° par les élytres beaucoup plus aplatis, avec la suture plus saillante en arrière ;
- 4° par la ponctuation abdominale, beaucoup plus nette, et composée de points en hachures longitudinales, alors que cette disposition est à peine sensible chez le *longipes*.

Un *Oxypoda* de ce groupe a déjà été trouvé dans les litières d'hiver de la Marmotte : c'est l'*O. Falcozi* Dev. (*Bull. Soc. ent. Fr.* [1913], p. 134), découvert par M. FALCOZ aux environs de Briançon. Il est extrêmement remarquable que les deux représentants du groupe qui sont commensaux des Marmottes constituent, par rapport à l'*O. longipes*, deux variations de sens inverse : l'un (*Falcozi*) épais et trapu, à antennes courtes, l'autre (*consobrina*) allongé, déprimé, à antennes longues et grêles.

Quoi qu'il en soit, la valeur de la nouvelle espèce ne pourra être définitivement appréciée que lorsqu'elle aura été retrouvée en nombre. Il y aura lieu, à ce moment, d'examiner son appareil copulateur et de le comparer aux excellentes figures qui ont été données par L. FALCOZ (*Contribution à l'étude des Microcavernes*, pp. 116 et 117) pour les *O. longipes* et *Falcozi*.

**

Dans ce même fascicule du *Bulletin* M. P. MARIÉ publie une planche hors texte qui contient les figures des cinq espèces nouvelles de Coléoptères découvertes depuis trois ans dans les terriers de Marmottes.

La figure n° 3, au centre de la planche, représente l'*Oxypoda consobrina* qui fait l'objet de la présente description. Les quatre autres espèces ont été décrites par moi en 1927 dans le *Bulletin de la Société entomologique de France*, page 41 et suivantes.


Description de Diptères nouveaux

par E. SÉGUY.


1. *Syllegomydas maroccanus*, n. sp. ♂. — Tête noire couverte d'une pruinosité d'un gris jaunâtre. Pilosité frontale blanche, pilosité faciale noire ou brune. Antennes noires : premier article plus long que le second. Trompe et palpes petits. Thorax brun ; mésonotum à pruinosité cendrée coupée par quatre bandes brunes ; pleures à pilosité blanche. Pattes fortes, noires ; genoux et base des articles du tarse roux ; fémurs III à pilosité noire, face interne avec deux rangées d'épines courtes, réduites sur la moitié basale ; tibias III à pilosité noire, quelques spinules réparties sur toute leur longueur. Ailes jaunies. Abdomen : tergites d'un noir mat à pilosité couchée, noire, l'apex des segments bordé d'une étroite bande d'un blanc d'ivoire ; sternites d'un brun roux. Appareil copulateur brun, à pilosité courte, noire. — Long. 13-15 mm.

Maroc : Grand-Atlas : pont de l'Oued Korifla (Zaers) 17-V-1927 (F. LE CERF) ; Rabat (THÉRY).


2. *Syllegomydas proximus*, n. sp. — ♂. Tête à pilosité blanchâtre. Antennes noires : troisième article trois fois plus long que les articles I-II réunis. Trompe légèrement saillante. Thorax d'un brun grisâtre, roux sur les callus ; mésonotum avec trois bandes brunes, réunies en arrière. Pattes noirâtres : les deux paires antérieures plus pâles ; tarsi bruns ; genoux jaunâtres ; fémurs III avec quelques faibles épines internes sur le tiers apical. Pelotes et griffes jaunes. Ailes vitreuses. Abdomen entièrement d'un brun noir luisant, les tergites I-VI avec une étroite bande apicale d'un blanc d'ivoire. Appareil copulateur brun. — Long. 15-17 mm.




1




2



3



4



5

JEUILLERAT del.

Coléoptères des terriers de Marmottes

(1) *Aleochara marmotae* Dev. ♂ — (2) *Atheta Mariéi* Dev. ♂ — (3) *Oxypoda consobrina* Dev. — (4) *Cryptophagus Arclomyos* Dev. — (5) *Catops Joffrei* Dev. ♀

Planche publiée par M. P. MARIÉ (Voir page 150).