

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON
FONDÉE EN 1822]

DES

**SOCIÉTÉS BOTANIQUE, DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
RÉUNIES**

et de leurs GROUPES de ROANNE, VIENNE et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE]

Secrétaire général : M. le D^r BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	}	France et Colonies Françaises	15 francs
		Etranger.. . . .	20 —
2.329 Membres		<i>MULTA PAUCIS</i>	Chèques postaux c/c Lyon, 101-88

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Mardi 10 Novembre, à 20 h. 30

1^o *Vote sur l'admission de :*

M. Pedon, 45, rue des Salins, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), *Mycologie*, parrains MM. le Professeur Beauverie et Nobécourt. — M^{lle} Massot, pharmacien, Tain-l'Hermitage (Drôme), parrains MM. Queney et Nétien. — M. Carpenet Emile, 3, rue de la Vieille, Lyon, parrains MM. Christien et A. Bergeret. — M. Brumant, ingénieur d'agriculture coloniale, à Mayama, par Brazzaville, (Moyen Congo, A. E. F.), *Entomologie*, parrains D^r Bonnamour et M. Testout.

Rectification. — A la liste présentée en octobre, au lieu de M. Métrot Aimé, professeur à Champagnole, lire : M. Métrod Georges.

2^o Questions diverses.

SECTION BOTANIQUE

Séance du Lundi 9 Novembre, à 20 h. 30

1^o M. QUENEY. — La broussaille algérienne.

2^o M. NÉTIEN. — La vallée de la Cance (Ardèche), avec projections.

3^o Présentation de plantes fraîches.

Séance du 8 Juin 1936

Revision dans la Flore de Cariot
des stations de « *Lathyrus sphaericus* » Retz.

Par MM. REVOL et NÉTIEN

Reprenant la série de nos recherches à apporter aux Flores lyonnaises, nous proposons pour cette espèce l'article suivant :

Lathyrus sphaericus Retz (*Flore de Cariot*, 1889, 8^e édition, tome II, p. 205).

Plante méridionale remontant la vallée du Rhône, jusqu'au Jura, ne dépassant pas le département du Doubs.

Assez commune. Pelouses sèches, lieux sableux, champs de culture.

Région lyonnaise. — Commune aux environs de Lyon : gravières de la vallée du Garon, gravières de Grigny, côtière méridionale de la Dombe, Neyron, plateau de Sermenaz, Miribel.

Isère. — Plaine de l'Est-lyonnais : Décine, Jons, Massif de Chamagnieux, Grenoble, Vif, Séchilienne.

Savoie. — Environs de Chambéry.

Drôme et Ardèche. — Commune rive droite du Rhône, entre Ampuis et Sarras et tout le département.

Ain et Jura. — Saint-Didier-sur-Chalaronne, Souclin, Le Reculet, bois de Baye et presqu'île d'Aire, Le Revermont, coteau de Jasseron, des Soudaniers et de Guiron.

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Complément à la description d'une nouvelle forme française de *Géomètre* (Lépidopt.)

Par M. Henri TESTOUT (Lyon)

1^o CORRIGENDA

Des erreurs de composition typographique s'étant glissées dans notre article du *Bulletin* (juin 1936), il y a lieu de rétablir le texte de la façon suivante :

Page 97, lignes 8, 10 et 12, lire : f. *grisea* ; f. *Korbi* ; f. *ussuriensis* ; f. (= forma) au lieu de F.

Ligne 12, lire : planche 11 au lieu de planche II.

Ligne 13, lire : Ussuri au lieu de Ussrui, et supprimer Sinérie.

2^o ADDENDA

Tout récemment de nouvelles formes de *Colotois pennaria* L. ont été décrites par M. RUDOLPH, dans une étude sur cette espèce (*Notulae Entomologicae, Helsingfors*, XV, 1935, t. 1-2, p. 43 à 49) et dont voici la liste :

Ab. *lugubrata* Rudolph (*loc. cit.*, p. 46, fig. 9).

Ab. *cuneata* Rudolph (*loc. cit.*, p. 47, fig. 11).

Ab. *vicinalis* Rudolph (*loc. cit.*, p. 47, fig. 12).

La diversité des aberrations décrites jusqu'à présent, démontre bien la grande variabilité de *Colotois pennaria* L.

Je remercie vivement M. F. DERENNE-MEYERS, l'éminent directeur de *Lambillionea*, qui a bien voulu me communiquer très aimablement ces renseignements nouveaux.