

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

## SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

Reconnue d'utilité publique par décret du 9 août 1937.

Secrétaire général : M. le D<sup>r</sup> BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	} France et Colonies Françaises. . . . .	25 francs
		} Étranger. . . . .

1.772 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

## PARTIE ADMINISTRATIVE

## ORDRES DU JOUR

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Mardi 14 Février, à 20 h. 30.

1<sup>o</sup> Vote sur l'admission de :

M. G. LAFAY, 59, rue de la République, Beaujeu, Rhône, parrains, MM. Guillemoz et D<sup>r</sup> Bonnamour. — M. Milo BURLINI, Ponzano Veneto, Treviso, Italie ; parrains, MM. G. Coen et D<sup>r</sup> Bonnamour. — M. CAUSSE, 20, rue de Paris. Chaumontel par Luzarches (Seine-et-Oise), parrains, MM. Joachim et Josserand (*Mycologie*). — M. Victor PARIAUD, 35, chemin Feuillat, Lyon, 3<sup>e</sup> (*réintégration*). — M. Joannès PERRET, 30, rue de la Convention, Roanne (Loire) (*réintégration*). — M. Henry COPIN, 4, rue Bab, Carthajna, Tunis, Tunisie (*réintégration*). — M. Louis Duport, 278, rue de Créqui, Lyon, 3<sup>e</sup> (*réintégration*). — M<sup>me</sup> A. TRONCHET, 243, rue du Quatre-Août, Villeurbanne, Rhône (*réintégration*). — M. Jacques RICARD, Sainte-Foy-lès-Lyon, Rhône (*réintégration*). — M. Henri de POOTER, 34, rue de la Forge, Gand, Belgique, parrains, MM. Leys et Guillemoz. — M. Paul HEINEMANN, 108, rue de la Limite, Bruxelles, 3, Belgique ; parrains, MM. Imler et Josserand (*Mycologie*).

2<sup>o</sup> Proposition d'échange de publication.3<sup>o</sup> Liste des dons et souscriptions.4<sup>o</sup> Questions diverses.SECTION D'ANTHROPOLOGIE, DE BIOLOGIE  
ET D'HISTOIRE NATURELLE GÉNÉRALE

Séance du Samedi 11 Février, à 17 heures.

1<sup>o</sup> M. le D<sup>r</sup> ARCELIN. — Silex solutréens de Forsaint (Tunisie).

bières à Sphaignes), la petite taille (qui a fait prendre cette espèce pour un *Naucoria*), l'espacement des lamelles et les dimensions relativement grandes des spores<sup>1</sup>.

#### 4) CONCLUSION.

Nous proposons donc de désigner cette espèce de la manière suivante :  
*Fulvidula fulgens* (J. FAVRE et R. MAIRE) R. KUHNER.

---

### SECTION ENTOMOLOGIQUE

#### *Calopterus Prevosti* Dej., ab. *Duvali* Dej. (Carab. Pterostichinae).

Par M. J. JACQUET.

M. MOURGUES a capturé le 15 août dernier un exemplaire ♀ de cette aberration *Duvali* Dej. à Saint-Germain-de-Calbert, dans la Lozère.

Elle diffère du type *Calopterus Prevosti* Dej. par une forme plus ample, le corselet moins sinueux, rétréci en arrière, les points élytraux plus largement impressionnés.

Les exemplaires alpins sont de forme plus étroite, et d'aspect plus élégant.

Sainte-Claire Deville dans sa note sur « les divers *Platysma* des Alpes occidentales »<sup>2</sup> ne signale aucune présence de cette espèce en dehors de la région alpine et subalpine.

Cependant *C. Prevosti* est aussi signalé de Belcaire dans l'Aude<sup>3</sup>.

La capture de l'ab. *Duvali* par M. MOURGUES, dans la Lozère, pourrait permettre de penser qu'elle constituerait une race. Seules d'autres captures dans le Massif Central, permettraient de résoudre la question.

---

#### *Prionomerinae* sud-américains (Col. Curculionides).

Par A. HUSTACHE.

#### PRIONOMERUS HANSI n. sp.

Noir, le rostre, les antennes, les quatre pattes postérieures, les tarsi antérieurs, les cinq derniers segments ventraux et le pygidium d'un rouge tirant sur le jaune. Pubescence dorsale variée. sur le prothorax d'un jaune gris, sur l'écusson blanche, sur les élytres brune sur la base, fauve sur le tubercule central, blanche et formant un court trait transversal, postmédian, traversant une aire subdénudée, métallique à reflet bleu foncé. cendrée brune en arrière sur les trois premiers interstries et le sommet.

Tête étranglée derrière les yeux, ces derniers gros, contigus et convexes. Rostre moins long que le prothorax, presque droit, en avant cylindrique luisant, finement pointillé, en arrière un peu rétréci et densément pubescent.

Prothorax presque aussi long que large, fortement rétréci dans sa moitié antérieure, les côtés parallèles en arrière, pourvu près du milieu de deux

---

1. Nous avons vainement cherché, dans nos échantillons de *N. fulgens*, les cristaux hyméniens jaunâtres qui sont si fréquents chez les *Fulvidula*. De nouvelles observations seraient nécessaires pour déterminer si cette absence est spécifiquement caractéristique.

2. *Ann. S. G. E.*, v. LXXI, p. 617.

3. *Miscellanea*, Carabidae, p. 22.