

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDEE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937
des SOCIETES BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

Siège social et Secrétariat général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^e)

La partie administrative se trouve au centre de ce Bulletin.

CATALOGUE DES COLEOPTERES BUPRESTIDES DE FRANCE

par L. SCHAEFER (fin) ¹.

Anthaxia impunctata Ab. — Var : Ste-Baume et Hyères (types), abbaye du Thoronet, Toulon, le Fenouillet, Riboux, Ollioules, Cavalaire ; Bouches-du-Rhône : Marseille (type), St-Chamas, Rognac, Calissanne, Eyguières ; Vaucluse : Malaucène, Cairanne, Cheval-Blanc ; Drôme : Nyons ; Gard : Nîmes ; Hérault : St-Gély, les Matelles, St-Guilhem. C'est une espèce autonome (1955, 25).

Evolue vraisemblablement dans *Ulex parviflorus* et *Genista scorpius*.

cyanescens Gory. — Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, assez répandu. A confirmer de Corse. La s. sp. *bedeli* Ab. n'est sans doute pas française.

Larve dans les tiges sèches d'*Eryngium campestre* (SCHAEFER, BL, 1951, 231).

similis Saund., *morio* auct. — Alpes, étage subalpin ; Jura, Alsace, Vaucluse, Var. A confirmer du Massif central.

v. *mariani* Gerini.

Dans *Pinus silvestris* et probablement dans les *Abies*, *Picea*, *Larix*.

marmottani Bris. s. sp. **hispanica** Cobos (*Boll. Soc. Ent. Ital.*, 1953, 103). — Je l'ai découverte en 1964 dans les Pyrénées-Orientales : col de Fine près de Sahorre, 2 ex. (BL, 1966, 116). A été retrouvée au même endroit en 1968, un ex., par G. TEMPÈRE (*in litt.*).

Vit sans doute dans le Pin de Salzman.

rugicollis Lucas. — Pyrénées-Orientales : environs de Banyuls-sur-Mer à la Salette et Réthorie (L. AUBER, 1935 ; SCHAEFER ; etc.), Valbonne près de Collioure (BAUDON, 1954 ; SCHAEFER ; etc.).

Dans ces deux stations vit certainement dans *Pinus pinea*.

carmen Obenb. ; Schaefer, A, 1936, 350 et 1937, 252. — Pyrénées-Orientales : Vernet-les-Bains, le Canigou, col de Fine, la Massane, Font-Romeu, Montlouis, val d'Eyne, Formiguères, Conat, Nohèdes. Port-Vendres. Douteux dans le Gers.

Dans *Pinus silvestris*, *salzmanni*, *uncinata*.

corsica Reiche. — Corse ; répandu dans les peuplements de Pins laricio de 500 à 1300 m. Aurait été rencontré anciennement dans les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes : Embrun ; non repris depuis.

v. *binotulata* Obenb.

Vit dans le Pin laricio.

istriana Rosenh. ; Schaefer, M, 1936, 19 et 61. — Alpes-Maritimes : St-Martin-Vésubie, St-Etienne-de-Tinée, Beuil ; Hautes-Alpes : Molines ; Var : Roque-Esclapon ; Vaucluse : Mt Ventoux, Puymeras ; Basses-Alpes : Allos, St-Paul-sur-Ubaye, Mgne de Lure ; Drôme : Vercors ; Savoie : Lanslebourg, Termignon ; Pyrénées-Orientales : Vernet, forêt de Balatg, Selaber, forêt de Font-Romeu, Montlouis.

v. *impubescens* Schaefer.

Vit probablement dans *Pinus silvestris* et *uncinata*.

helvetica Stier. — Toutes les Alpes, commun. Vaucluse : Mont Ventoux ; Var : Roque-Esclapon. Mts du Jura et du Bugey. Alsace :

1. La première partie a paru dans le Bulletin n° 9, novembre 1971, p. 275-284.

Trois-Epis, ballon de Guebwiller, Soppe-le-Bas. Massif central : Mt Aigoual (Lozère et Gard), Mt Lozère, St-Germain-de-Calberte, Pont-de-Montvert, forêt de Mercoire (Lozère) ; Ardèche ; Aveyron : Causse Noir ; Puy-de-Dôme.

v. *nigrocyanea* Rey, *pecirkai*, *tetrasticha*, *apennina* Obenb., *glabrocyanea* Schaeef.

Dans *Abies*, *Picea*, *Larix*.

nigrojubata Roubal ; Schaeef., *M*, 1936, 21 et 85. — Alsace : env. de Colmar et de Mutzig, Lautenbach ; Hautes-Alpes : forêts de Boscodon et de Morgon ; Var : Roque-Esclapon, forêts de Malay et de Brouis ; Aude : Axat, forêts de la Plaine, d'En Malo, du Bac Estable et des Fanges ; Pyrénées-Orientales : forêt de Balatg, col de Fine près de Sahorre, forêt de Boucheville, bois de Coubezet.

v. *demuthi* Schaeef., *nigrocærulans*, *lætipennis* Obenb.

Paraît propre aux *Abies* et *Picea*.

sepulchralis F. — Alpes, Pyrénées, Massif central. Vers le N : Maine-et-Loire, Calvados, Seine-et-Marne, Saône-et-Loire, Meurthe-et-Moselle, Alsace.

v. *schuleri*, *subalpina* Schaeef. Contrairement à ce que j'ai écrit dans ma Faune, 1949, la v. *schuleri* n'a rien de commun avec l'*A. kochi* Obenb. d'Italie.

Attaque les divers Pins ; peut-être *Picea* et *Abies*.

quadripunctata L. — France montagnaise. Jura, Vosges, Alpes, Massif central, Pyrénées. Généralement abondant. Acclimaté à basse altitude : Meurthe-et-Moselle, Côte-d'Or, Rhône.

v. *angulicollis* Küst., *veneti*, *uniformis* Schaeef.

Dans le Sapin, l'Epicéa, le Mélèze, *Pinus uncinata*.

godeti C.G., *submontana* Obenb. — Jura, Vosges, Alpes, Massif central, Pyrénées. Vers le N : Maine-et-Loire, Sarthe, Eure, région parisienne, Aisne, Somme, Marne, Ardennes, Alsace.

v. *granulata* Küst., *piceæ*, *scheerpeltzi*, *spaethi* Obenb.

Dans les divers Pins et non dans les *Picea*, *Abies*, *Larix*, semble-t-il.

nigritula Ratz. — Départements méditerranéens et Corse ; Pyrénées-Atl. ; Landes, Gironde, Charente-Maritime, Lot-et-Garonne, Tarn, Aveyron, Lozère, Ardèche, Vaucluse, Drôme. A confirmer : Allier, Puy-de-Dôme, Savoie, Haute-Marne, Nièvre, Alsace.

Larve sous l'écorce des *Pinus pinaster*, *halepensis*, *pinea*, *laricio*, *salzmanni*.

CHRYSOBOTHRINI

G. CHRYSOBOTHRIS Esch.

chryso stigma L. — Assez répandu dans les forêts des Alpes : Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Isère, Savoie, Haute-Savoie. Massif central, très rare : Puy-de-Dôme, Cantal, Loire.

v. *patkiewiczzi*, *uralensis* Obenb., *reinecki* Schir., *lunderi* Pochon.

Dans les Pins, Sapins et Mélèzes.

affinis F. — Presque partout. Corse.

v. *heterochroa* Obenb., *ruteri* Schaeef.

Très polyphage : Chênes, Châtaignier, Hêtre, Orme, Saule, Aulne, Abricotier, Prunier, Cerisier, Amandier, Pommier, Poirier, Pêcher, Figuier, Noyer, Mûrier, Bouleau, Charme, Peuplier, Frêne, Eglantier.

solieri C.G. — Type : Bordeaux. France méridionale et Corse. Vers le N : Charente-Maritime, Sarthe, Calvados, Eure, région parisienne, Alsace.

v. *milliati* Schaeff., ♀ *quadridens* Rey.
Dans les divers Pins.

CORCIBINI Bedel
G. COREBUS C.G.

florentinus Herbst, *fasciata* Vill. — France méridionale. Vers le N : Loire-Atl., Deux-Sèvres ; Maine-et-Loire, Touraine et Blésois, Seine-et-Marne, Saône-et-Loire, Ain, Jura, Alsace.

v. *obscuricolor* Pic, *nitraënsis* Obenb., *pici* Schaeff.

Larve dans les branches des divers Chênes ; très nuisible.

undatus F. — Midi ; Loire-Atl., Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Sarthe, Manche, Mayenne, Calvados, Eure, région parisienne, Oise, Meuse, Vosges, Lorraine, Alsace. Corse, rare.

v. *cæruleotinctus* Obenb.

Vit dans les *Quercus pedunculata*, *pubescens*, *ilex*, *toza* et *suber*.

rubi L. — Midi, surtout Provence. Limites N : Morbihan, Maine-et-Loire, Mayenne, Ardennes, Allier, Rhône, Isère, Alsace. Corse. Cité de Seine-et-Oise.

Larve dans les racines des *Rubus* et des Rosiers cultivés.

elatus F., *sinuatus* Cr. — Midi, Centre. Loire-Atl., Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Eure, Seine-Maritime, Seine-et-Oise, Somme, Alsace.

v. *bicolor* Obenb.

Larve dans racines des *Poterium* et *Potentilla* ; aussi dans Fraisiers cultivés et *Agrimonia eupatoria*.

G. MELIBÆUS Deyr.
S. G. MELIBÆOIDES Théry

amethystinus Ol. — Midi. Vers le N : Maine-et-Loire, Manche, région parisienne, Aube, Yonne, Haute-Marne, Côte-d'Or, Vosges, Alsace.
v. *chlorophyllus* Obenb., *cærulescens*, *comoni* Mécq., *fagniezi* Schaeff.
Dans les tiges des Carduacées.

MELIBÆUS s. st.

gibbicollis Ill. — Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales.

Larve dans racines d'*Inula viscosa* et probablement *britannica*.

graminis Panz. — Provence, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Ardèche, Corse.

v. *cælestinus* Obenb.

Dans les racines d'*Artemisia campestris*, *glutinosa*, *absinthium*, *Helichrysum stœchas*, *Centaurea*.

santolinæ Ab. — Type : Carcassonne. Var, Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales.

Dans les racines des Santolines.

S. G. MELIXES Schaeff.

æratus Muls. et Rey. — Types : Provence et Languedoc. Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drôme, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales. Douteux en Corse.

v. *viridescens* Schaef.

Larve dans le bas des tiges et la racine du *Thymus vulgaris*.

G. NALANDA Théry

fulgidicollis Luc., *æneicollis* Vill. — Midi. Vers le N : Maine-et-Loire, Indre, Indre-et-Loire, région parisienne, Nièvre, Côte-d'Or, Jura, Haute-Saône. Corse : Folelli (SCHAEFER, 1959), Calenzana (TEMPÈRE, 1963).

v. *galloprovincialis* Pic.

Dans les divers Chênes et peut-être le Châtaignier.

AGRILINI C.G.

G. AGRILUS Curtis

guerini Lac. — Type : env. de Paris. Région parisienne. Eure, Oise, Aisne, Aube, Lorraine, Alsace, Vosges, Haute-Marne, Côte-d'Or, Yonne, Doubs, Allier, Ain. Corse (découvert par P. VEYRET, 1956) : confluent Vecchio-Tavignano, Tavera, Ucciani, Campo del Oro, Propriano, pont d'Abra, Monacia, Porto-Vecchio.

Dans les Saules, notamment *Salix caprea*.

ater L., *sexguttatus* Brahm. — Midi, Centre, Vers le N : Loire-Atl., Maine-et-Loire, région parisienne, Oise, Yonne, Allier, Saône-et-Loire, Alsace, Loire, Rhône, Ain, etc. Corse : Folelli, Ghisonaccia (SCHAEFER).

Vit dans les Peupliers et les Saules.

biguttatus F. — Toute la France, sauf peut-être le Finistère. En Corse selon J. OBENBERGER.

v. *cærulescens*, *ænescens* Schils., *cæruleoviolaceus* Thoms., *eumelas*, *cepelaki* Obenb.

Chêne blanc, Chêne vert, Chêne-liège, Hêtre.

laticornis Ill. — Presque toute la France et la Corse.

v. *schilskyi* Pic, *obscurcupreus* Roub., *diabolicus* Obenb.

Dans les divers Chênes et le Châtaignier.

obscuricollis Kiesw. — Cotype : Lyon. Majeure partie de la France. Au N : Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Eure, région parisienne, Seine-Maritime, Nord, Aisne, Marne, Haute-Marne, Lorraine, Alsace. Corse, rare.

v. *cœlestinus* Schaef.

Dans les divers Chênes et le Charme.

angustulus Ill. — Toute la France et la Corse.

v. *cyaniventris* Rey, *hungaricus*, *vladimiri* Obenb.

Dans les Chênes, le Hêtre, le Châtaignier, le Bouleau, le Charme, le Noisetier.

sulcicollis Lac. — Type : env. de Paris. Presque toute la France, mais moins répandu dans le Midi, manque dans la zone littorale méditerranéenne.

v. *viturati* Pic, *pragensis*, *prochazkai* Obenb., *chlorinellus* Schaef.

Dans les Chênes et le Hêtre.

graminis C.G., *disparicornis* Bedel. — Surtout Midi. Vers le N : Charente, région parisienne, Allier, Rhône, Ain, Côte-d'Or, Alsace. Corse (SCHAEFER).

Dans les Chênes et l'Aulne.

hastulifer Ratz. — Provence, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne. Pyrénées-Atl., Landes, Gironde, Lot-et-Garonne. Tarn-et-Garonne, Tarn, Drôme, Rhône, Indre-et-Loire, Alsace.

Vit dans *Quercus pubescens, pedunculata, toza, suber*.

derasofasciatus Lac. — Type : env. de Paris. Majeure partie de la France. Au N : Maine-et-Loire, Loiret, région parisienne, Eure, Seine-Maritime, Oise, Aisne, Aube, Côte-d'Or, Alsace, Lorraine. Corse.

v. *slovenicus* Obenb., *jacqueti* Schaef.

Larve dans sarments et rameaux de la Vigne sauvage et cultivée.

olivicolor Kiesw. — Presque partout, sauf sur le littoral méditerranéen. Vers le N : Loire-Atl., Maine-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, région parisienne, Seine-Maritime, Somme, Aisne, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Belfort, Alsace.

v. *chioneus, nitræ* Obenb.

Dans le Charme et le Noisetier.

grandiceps Kiesw. s. sp. **hemiphanes** Mars. — Type : Nîmes. Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drôme, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Corse. Rare.

v. ♂ *nigricollis* Théry.

Dans *Quercus pubescens, ilex* et *coccifera*.

curtulus Muls. et Rey, *planiceps* Ab. — Type : Beaujolais. Var, Vaucluse, Basses-Alpes, Hérault, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atl., Rhône, Ain, Allier, Côte-d'Or, Aube, Haute-Saône, région parisienne. Corse : Ile Rousse (SCHAEFER, 1961). Rare partout.

Vit dans les Chênes.

convexicollis Redt. — France méridionale et centrale. Atteint la région parisienne ; Oise, Somme, Aisne, Marne, Haute-Marne, Belfort, Alsace. Corse (SCHAEFER) : Venaco, Cazamozza, Folelli, vallée du Tavignano.

Dans *Fraxinus excelsior* et *oxyphylla*.

beauprei Théry s. sp. **mourguesi** Schaef., *BL*, 1954, 148 ; 1955, 30 ; *Bupr. Pyr. Or.*, 1963, 28 ; *AH*, 1968, 76. — Bouches-du-Rhône : Orgon ; Gard et Hérault, assez répandue ; Aude ; Pyrénées-Orientales : Argelès-plage (type), Valbonne, Raimbaud, St-Nazaire, St-Genis-des-Fontaines, Céret, col de Millières, Eus, Valcèbollère.

Comme *convexicollis* vit sur *Fraxinus oxyphylla*, plus rarement sur *F. excelsior*.

cyanescens Ratz., *cæruleus* Rossi. — Presque toute la France, mais rare dans la région méditerranéenne.

v. *amabilis* C.G., *sulcaticeps* Ab.

Dans les Chênes, surtout à feuilles caduques ; aussi dans Hêtre, Aulne, Bouleau et dans *Lonicera xylosteum, implexa*...

subauratus Gebler. — Centre et Est. Douteux dans le Midi. Vers le N : Sarthe, Orne, Seine-Maritime, Oise, Aisne, Marne, Meuse, Vosges, Lorraine, Alsace.

v. *auripennis* C.G., *theresæ* Pic, *gallicus, saxonius* Obenb., *fridolini* Barov.

Dans les Saules et le Tremble.

betuleti Ratz. — Centre et Est. Midi, très rare : Alpes-Maritimes, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atl., Tarn. Au N : Indre-et-Loire, région parisienne, Oise, Marne, Nord, Alsace.

v. *cyaneotratus, fugneri* Obenb.

Semble propre au Bouleau.

pseudocyanus Kiesw. s. sp. **delphinensis** Ab. — Type : Voiron. Peu répandue. Isère, Nièvre, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Alsace. A vérifier du Cantal.

Dans les Saules.

pratensis Ratz., *roberti* Chevr. — Majeure partie de la France, plus rare dans le Midi. Corse. Au N : Loire-Atl., Maine-et-Loire, Sarthe, Calvados, Eure, Seine-Maritime, Somme, Nord, Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Lorraine, Alsace.

v. *paracyaneus*, *æneicolor*, *confusinellus* Schaef.

Dans les Peupliers et probablement les Saules.

acutangulus Théry, *aurichalceus* Ab., non Redt. — Type d'*aurichalceus* Ab. : Le Plantay. Ain, assez répandu, Rhône, Saône-et-Loire, Isère, Côte-d'Or, Haute-Marne, Loiret, Alsace. Des colonies dans les Pyrénées-Orientales : bords de la Massane près d'Argelès, Le Boulou, St-Genis-des-Fontaines (SCHAEFER, 1954-1957).

v. *boleslavensis* Obenb., *audrasi* Schaef.

Dans les Saules.

massanensis Schaef., 1955, 34 : *BL*, 1959, 229. — Pyrénées-Orientales : bords de la Massane près d'Argelès, type (SCHAEFER, 1954), Le Boulou, Eus, Bouleternère ; Hérault : La Braunhe (SCHAEFER, 1958), Canet.

v. *pradensis* Schaef.

Vit certainement dans *Salix incana*.

lineola Kiesw. — Isère : Moirans ; Var : Le Luc, Fréjus ; Basses-Alpes : massif du Cheval-Blanc ; Vaucluse : Lamotte, Avignon ; Gard : St-Gilles ; Hérault : St-Guilhem, St-Bauzille-de-Putois, St-Etienne-d'Is-sensac ; Corse (SCHAEFER) : Ghisonaccia, Propriano, Porto-Vecchio, Monacia, Aleria.

v. *semioblitus*, *nociviformis* Obenb., *bystricensis* Roub.

Vit sur les Saules, en particulier *Salix alba*.

viridis L. — Toute la France et la Corse.

v. *fagi*, *nocivus* Ratz., *purpureicolor* Pic, *mixtulul*, *belial* Obenb., *rhodanensis* Schaef., ♀ *ignota* Schaef.

La forme typique dans les *Salix*, *Betula alba*, *Alnus glutinosa*, *Fagus sylvatica* ; à confirmer du Chêne. La v. *fagi* dans *Fagus sylvatica*, *Betula alba*, *Carpinus betulus*, *Salix*, *Populus*, *Rosa*. La v. *nocivus* dans *Fagus sylvatica*, *Alnus glutinosa*, *Myrica gale*.

suvorovi Obenb. s. sp. **populneus** Schaef., 1946 ; *AH*, 1961, 88. — Eure (SIMON) ; Alsace (SCHULER, 1960) ; Marne (CARUEL) ; Ain ; Rhône (type) ; Hautes-Alpes (SIMON ; etc.) ; Alpes-Maritimes ; Var ; Bouches-du-Rhône ; Vaucluse ; Gard ; Hérault ; Lozère ; Pyrénées-Atl. Incertaine en Corse.

v. *pseudofagi* Obenb., *cyanophila*, *simoni* Schaef.

Dans *Populus tremula*, *alba*, *nigra*. A consulter : Giovanni M. ARRU, *Boll. zool. agr. Bach.*, II, V, 4, 1961-62, 159-287.

ribesii Schaef., 1946 (*viridis* v.) ; *AH*, 1968, 77. — Espèce autonome. Côte-d'Or (type) ; Saône-et-Loire ; Oise ; Val de Marne (L. AUBER, 1960) ; Sarthe, à confirmer ; Yonne ; Allier ; Nièvre ; Aveyron ; Rivière-sur-Tarn (Dr VERDIER, 1969) ; Hérault ; Lattes (SCHAEFER, 1965).

Dans les tiges des *Ribes nigrum* et *rubrum*.

aurichalceus Redt. — Midi, Corse. Limites N : Maine-et-Loire, Sarthe, Orne, région parisienne, Oise, Aisne, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Alsace.

v. *rubicola* Ab., *kraisai*, *indigacellus* Obenb., *obtusifera* Schaeef.

Dans les tiges des *Rubus fruticosus*, *cæsius*, *idæus*, *Rosa canina alpina* et les *Rosa* cultivées.

integerrimus Ratz. — Midi, Corse. Vers le N : Puy-de-Dôme, Loire, Allier, Rhône, Ain, Jura, Doubs, Côte-d'Or, Yonne, Aube, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Alsace. Paraît absent dans l'O.

v. *bosnicus* Obenb.

Dans *Daphne mezereum*, *laureola*, *gnidium*.

auricollis Kiesw. — Un des types : sud de la France. Très rare. Alsace : Rouffach (SCHERDLIN) : Cher : Vierzon, un ♂ (RAPILLY, 1958) : Hautes-Pyrénées : Ferrère, vallée de la Barousse, un ex. (G. TEMPÈRE, 1952) ; Dordogne : forêt de Brantôme (DAYREM, coll. LEPESME, teste DESCARPENTRIES) ; Var : Six-Fours, un ♂ (FAVARD, 1967).

v. *distinctipilis* Obenb. — Type : Montpellier. Gironde : Pessac, un ♂ (Ch. BRION).

Hôte non observé en France. [Attaque le Tilleul en Europe centrale. Sur le Micocoulier à Rome, d'après F. TASSI, 1962.]

sinuatus Ol. — Type : Provence. Majeure partie de la France. Au N : Loire-Atl., Maine-et-Loire, Sarthe, Manche, Calvados, Eure, Seine-Maritime, Somme, Aisne, Nord, Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Lorraine, Alsace. Corse : Novella (G. TEMPÈRE, 1963).

Dans les *Pirus*, *Mespilus*, *Crataegus*, *Sorbus*, *Malus* et peut-être *Cydonia*.

viridicærulans Mars. s. sp. **rubi** Schaeef., 1937. — Midi et Corse. Puy-de-Dôme, Isère, Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Yonne, Nièvre.

v. *pseudoroscidus* Schaeef.

Dans les tiges des *Rubus fruticosus* et *cæsius*.

roscidus Kiesw. — Midi et Corse. Limites N : Loire-Atl., Maine-et-Loire, Loir-et-Cher, Nièvre, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Jura, Alsace.

v. *varensis* Pic, *barbieri*, *griseocupreus* Schaeef.

Larve dans les Rosacées arborescentes. Signalé du Gui par GALIBERT.

La v. *griseocupreus*, décrite de Corse, est une forme biologique propre aux Saules. [Aussi en Italie.]

elegans Muls. et Rey, *cisti* Bris. — Types : Marseille, Hyères. Départements méditerranéens, atteint la Drôme et les Basses et Hautes-Alpes. Corse.

s. sp. **teucarii** Schaeef. — Alpes-Maritimes.

Dans les tiges et au collet des Cistes, dans les racines des Hélianthèmes, dans *Erica arborea* et *scoparia*. La s. sp. *teucarii* dans *Teucrium polium*.

solieri C.G. — Type : Marseille. Région méditerranéenne et Corse, ne dépasse pas le Vaucluse.

Vit dans les Ronces et les Rosiers cultivés.

hyperici Cr. — Midi. Vers le N : Loire-Atl., Maine-et-Loire, Orne, Oise, Marne, Meurthe-et-Moselle, Lorraine, Alsace.

Larve dans la racine des *Hypericum perforatum* et *tetrapterum*.

albogularis Gory s. sp. **artemisiae** Bris. — Types : Nîmes, Prades, Vernet-les-Bains, Arles, St-Raphaël. France méditerranéenne ; Ardèche. A confirmer du Rhône, de l'Ain et de la Saône-et-Loire.

v. *ardua*, *gauthieri* Schaeff.

Larve dans *Artemisia campestris* et *glutinosa*.

antiquus Muls. et Rey. — Types : Nîmes, Beaujolais. Tous les départements méditerranéens, Vaucluse, Drôme, Basses-Alpes, Lot-et-Garonne.

v. *hemicolor* Schaeff.

Sur *Genista scorpius* et *hispanicus*, *Calycotome spinosa*.

s. sp. **oxygonus** Ab. — Type : Savines. Alpes-Maritimes, Basses et Hautes-Alpes, Var, Vaucluse, Ardèche, Pyrénées-Orientales, Lot-et-Garonne, Gironde.

Sur *Genista cinerea*, *tinctoria*, *Sarothamnus scoparius*.

cinctus Ol. — Type : Brive-la-Gaillarde. Majeure partie de la France. Vers le N : Morbihan, Maine-et-Loire, Sarthe, Eure, Seine-Maritime, Aisne, Marne, Vosges, Alsace. Rare dans les départements méditerranéens : Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales.

v. *virescens* Théry, *lugdunensis* Schaeff.

Larve dans *Sarothamnus scoparius* ; vraisemblablement aussi dans *Genista cinerea* et *purgans*.

CYLINDROMORPHINI Portevin

G. PARACYLINDROMORPHUS Théry

subuliformis Mann. — Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Rhône : Chaponost et Soucieu (SCHAEFER), Ardèche : St-Cierge-la-Serre (D^r VIALLIER).

Évolue dans *Glyceria convoluta* et *Festuca ovina* (SCHAEFER, *BL*, 1953, 162 ; *M*, XLVII, 1953, 66, pl. IV, fig. 1-6).

G. CYLINDROMORPHUS Kiesw.

gallicus Muls. et Rey. — Types : env. de Lyon (La Pape, Limonest, Bugey). Région lyonnaise seulement. Rhône : Limonest, Montagny, Chaponost, Chassagny, Soucieu, bords du Rhône au N de Lyon ; Ain : La Pape, Villebois, Miribel, Beynost ; Isère : Torjanas (Dr VIALLIER, 1971).

Larve dans *Festuca ovina* (SCHAEFER, *L'Entom.*, 1946, 259).

filum Gyll. — N'a été trouvé avec certitude qu'en Alsace : Brumath (P. SCHERDLIN).

Vit sans doute dans une graminée.

paralleus Fairm. — Type : Hyères. Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault (H. SICARD ; SCHAEFER, 1957), Pyrénées-Orientales (SCHAEFER, 1951). Rare.

Évolue probablement dans *Dactylis glomerata*.

APHANISTICINI J. du V.

G. APHANISTICUS Latr.

elongatus Villa. — Midi et Corse. Dispersé vers le N : Maine-et-Loire, Seine-et-Oise, Oise, Ardennes, Alsace.

v. *canaliculatus* Schauf., *audrasi* Schaeff.

s. sp. **filum** Schaeff. — Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault.

Forme typique sur *Carex muricata* et *divulsa* ; s. sp. *filum* sur *Schænus nigricans* et *Carex* sp. Evolue évidemment dans ces plantes et non dans les Joncs.

emarginatus Ol. — Type : env. de Paris. Toute la France et la Corse.

v. *coriaceus* Rey, *divisa* Schaef.

Larve dans *Juncus obtusiflorus* et *articulatus*.

distinctus Perris. — Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Tarn, Gironde. Rare.

Sur *Scirpus holoschænus*.

augustatus Lucas, *cupricolor* Ab. — Corse : Aleria, Porto-Vecchio. Sur les Joncs.

pusillus Ol. — Type : env. de Paris. Toute la France. Assez rare. Se prend sur les Joncs et les Carex.

pygmæus Lucas. — Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Corse. A vérifier du Tarn-et-Garonne. Rare.

Cité sur *Juncus acutus*, mais vit plutôt sur une graminée.

TRACHYDINI C.G.

G. HABROLOMA Thoms.

nana Payk. — Grande partie de la France. Au N : Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Eure, Seine-Maritime, région parisienne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Alsace.

Larve mineuse des feuilles du *Geranium sanguineum*.

triangularis Lac. — Type : St-Germain. Midi et Corse. Limites N : Vienne, Indre-et-Loire, Eure-et-Loir, région parisienne, Allier, Saône-et-Loire, Ain, Rhône, Isère.

Sur *Erodium cicutarium* et *ciconium*, *Poterium muricatum* et peut-être *Calamintha nepeta*.

G. TRACHYS F.

minutus L. — Toute la France et la Corse.

v. *supravioleacea* Thoms., *pæcilochroa*, *bohémica*, *heyrovskyi*, *infernalis* Obenb.

Larve mineuse des feuilles de Saule, Noisetier, Orme, *Sorbus aria* et vraisemblablement d'autres arbres.

trogloxytes Gyll. — Presque toute la France à l'exception de la basse région méditerranéenne. Périphérie : Alpes-Maritimes, Drôme, Pyrénées-Orientales, Gironde, Loir-et-Cher, Manche, Calvados, Eure, Seine-Maritime, Somme, Nord, Ardennes, Meuse, Lorraine, Alsace.

v. *foveolata*, *cribrata* Rey, *klimschi*, *carinthiaca* Obenb.

s. sp. **subglabra** Rey. — Type : Hyères. Basse région méditerranéenne : Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales.

v. *compressa* Ab., *reji* Schaef.

Larve mineuse des feuilles des *Scabiosa columbaria*, *succisa*, *suaevolens* et *Knautia arvensis*. La s. sp. *subglabra* sur *Scabiosa maritima* et *Cephalaria leucantha*.

puncticollis Ab. v. *obscorella* Obenb. ; Schaef., AH, 1956, 45. — Var : La Garde (VEYRET, 1953 ; BARBIER ; HERVÉ ; SCHAEFER). Toulon (BARBIER) ; Basses-Alpes : La Palud (P. JOFFRE, 1960).

Hôte à découvrir (*Scabiosa maritima* ?).

fragariæ Bris. — Types : St-Germain-en-Laye. Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hérault (SCHAEFER, 1959), Haute-Garonne, Landes, Lot-et-Garonne, Rhône, Ain, Haute-Loire, Loire-Atl., Loir-et-Cher, région parisienne, Yonne, Marne, Côte-d'Or, Alsace.

La larve mine *Fragaria collina* et *vesca*, *Potentilla recta* et *reptans*.

fabricii Schaef., *pygmæa* F. — Midi et Corse ; zone atlantique : Centre : Lyonnais. Au N : Finistère, Ille-et-Vilaine, Calvados, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Somme, Aisne, Yonne, Côte-d'Or, Jura, Meurthe-et-Moselle, Alsace.

v. *corusca* Ponza, *aureolata*, *troglydytiformis* Obenb., *dureti* Schaef.

Larve dans les feuilles des Malvacées : *Malva*, *Althæa*, *Lavatera*.

goberti Gozis. — Types : Toulouse, Carcassonne. Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne.

v. *chlorizans*, *satanelia* Obenb.

Larve dans *Marrubium vulgare*, *Phlomis lychnitis* et *herbavanti*.

scrobiculatus Kiesw., *menthæ* Bedel. — A peu près toute la France.

Larve dans *Mentha rotundifolia*, *pulegium*, *aquatica*, *Calamintha nepeta* et peut-être *Convolvulus arvensis*, *Poterium*.

lichtensteini Buyss. — Type : Montpellier. Alpes-Maritimes. Var. Bouches-du-Rhône, Hérault, Rhône, Isère, Aisne, Côte-d'Or.

Larve mineuse des feuilles du *Poterium muricatum*.

quercicola Mars. — Type : Albertville. Provence, Corse, Languedoc, Pyrénées-Orientales, région aquitanique, Hautes-Alpes, Savoie, Isère, Rhône, Ain, Saône-et-Loire, Loir-et-Cher, Cher, région parisienne, Somme, Marne, Haute-Marne, Côte-d'Or.

v. *glabricola* Schaef.

Sur *Stachys recta* et *maritima*. Peut-être sur *Salvia pratensis*.

PRÉSENCES A CONFIRMER :

Acmæodera virgulata Ill. et *coarctata* Luc., *Sphenoptera rauca* F.

Présenté à la Section d'Entomologie en sa séance du 19 janvier 1972.

LES DORTOIRS URBAINS ET PERIURBAINS D'OISEAUX, A LYON

par Daniel ARIAGNO¹.

Les dortoirs urbains d'oiseaux autres que les Moineaux domestiques *Passer domesticus* sont connus depuis longtemps dans différentes villes d'Europe. A Lyon cependant, ce n'est que depuis 1967 (CORA, 1969) que des rassemblements importants de différentes espèces d'oiseaux ont été remarqués. Diverses notes isolées et des observations plus suivies faites au cours de l'hiver 1970-71 ont permis de réaliser la présente étude. Nous entendrons par *dortoirs urbains* ceux compris dans les périmètres administratifs des neuf arrondissements de la ville de Lyon et de la ville

1. Centre Ornithologique Rhône-Alpes, Sciences de la Nature, Université de Lyon, 43, boulevard du 11-Novembre-1918, 69 - Villeurbanne.