

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

Année 1863.

—
(NOUVELLE SÉRIE.)

—
TOME DIXIÈME

PARIS

CHEZ F. SAVY, LIBRAIRE

rue Hautefeuille.

—
1863. — Février 1863.

DESCRIPTION

D'UNE

ESPÈCE NOUVELLE D'HÉMIPTÈRE

PAR

E. MULSANT ET CL. REY.

Pentatoma Baerensprungi.

Corps ovale ; à peine convexe.

Tête d'un vert flavescent, avec les côtés d'un vert rosat ; ponctuée , subarrondie à sa partie antérieure. *Epistome* enclos par les joues.

Bec prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches intermédiaires ; d'un vert flave, avec les soies noirâtres.

Yeux situés sur les côtés de la tête ; bruns ; contigus au bord antérieur du prothorax.

Antennes un peu plus longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; à 2^e et 3^e articles cylindriques : le 4^e fusiforme, un peu moins long : le 5^e plus épais et moins long que le 4^e : les trois premiers d'un testacé livide : le 4^e nébuleux : le 5^e obscur ou noirâtre.

Prothorax d'un vert un peu pâle , avec les côtés parés d'une bordure assez étroite d'un livide ou testacé rougeâtre ou d'un livide rosat, à limites indécises.

Ecusson prolongé jusqu'aux trois cinquièmes des élytres, graduellement rétréci jusqu'à la moitié de la longueur des étuis, subparal-

lèle ensuite et arrondi à son extrémité ; d'un vert un peu pâle, paré d'une tache d'un blanc verdâtre à l'extrémité et d'une tache d'un flave pâle en carré plus long que large, sur le milieu de sa base.

Hémélytres vertes ou d'un vert un peu pâle, avec l'exocorie d'un testacé rosat, graduellement verdâtre, prolongée jusqu'à la moitié environ de l'abdomen. Bords de ce dernier visibles à partir du tiers de sa longueur, d'un vert blanchâtre, avec cinq points noirs.

Repli des hémélytres rosat ; à peine visible en dessous jusqu'au premier point noir. Extrémité de la membrane paraissant d'un livide flave ou d'un flave testacé.

Dessous du corps d'un vert flave ou d'un flave verdâtre.

Cuisses d'un vert flave, ou d'un flave verdâtre. *Tibias* rosats.

Tarses noirs ou obscurs.

Ventre d'un vert flave ou d'un flave testacé, avec le bord étroitement flave.

Cette espèce se trouve en Allemagne. Nous l'avons décrite sur un exemplaire existant dans la collection de M. le docteur Baerensprung, possesseur d'une magnifique collection d'Hémiptères, et auteur d'un catalogue des *Hémiptères hétéroptères d'Europe*. Nous l'avons dédiée à ce savant.

Obs. L'exemplaire d'après lequel a été faite cette description, offre, à la base du prothorax, quatre festons nébuleux, probablement accidentels.

Obs. Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la *Pentatoma roseipennis*, mais elle a le corps proportionnellement plus allongé et plus étroit ; les bords du prothorax d'un livide rosat ; les côtés de la tête d'un vert rosat.