

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

Année 1866.

—
(NOUVELLE SÉRIE.)
—

TOME TREIZIÈME

PARIS

F. SAVY, LIBRAIRE

rue Hautefeuille, 24.

—

30 Juin 1866.


DESCRIPTION

D'UNE

ESPÈCE NOUVELLE DE COLÉOPTÈRES

Par E. MULSANT et CL. REY

Présentée à la Société Linnéenne le 9 janvier 1835.



Sphenoptera Pelletii; MULSANT ET REY.

Allongé ; peu convexe ; d'un rouge cuivreux en dessus. Epistome échancré en demi-lune en devant et chargé d'une ligne élevée de chaque côté de cette échancrure. Prothorax plus grossièrement ponctué que la tête, tronqué au devant de l'écusson et sinué de chaque côté de celui-ci, à la base. Elytres près de trois fois aussi longues que l'écusson, rétrécies depuis les épaules jusqu'à l'extrémité ; tridentées à leur bord postérieur (la dent médiane plus prononcée) ; un peu relevées en carène sur la majeure partie postérieure de la suture, à neuf stries assez faibles et ponctuées : les 6^e à 8^e naissant seulement après le calus huméral. Intervalles presque imperceptiblement pointillés et marqués de points plus gros, constituant ordinairement une rangée.

Long. 0,0135 à 0^m,0147 (6 l. à 6 l. 1/2). — Larg. 0^m,0045 (2 l.).

Corps allongé ; peu convexe. Tête près d'une fois plus large que longue ; ponctuée et très-finement pointillée entre les intervalles de ces points ; d'un vert doré passant au vert rouge cuivreux sur sa partie postérieure. Epistome échancré en demi-lune dans le milieu de son bord antérieur, chargé de chaque côté de cette échancrure d'une ligne élevée dirigée vers le milieu du bord interne des yeux. Antennes filiformes ; d'un vert doré ; déprimées ; dentées au côté interne ; à 2^e arti-

cle court : le 3^e le plus long; yeux noirs. *Prothorax* tronqué en devant, avec les angles antérieurs avancés jusqu'au milieu du côté externe des yeux; élargi en ligne un peu courbe sur les côtés; étroitement rebordé à ceux-ci; tronqué au devant de l'écusson et sinueux de chaque côté de celui-ci, à la base; sans rebord à celle-ci; d'un cinquième plus large à cette dernière que long sur la ligne médiane; d'un rouge de cuivre; plus grossièrement ponctué que la tête. *Ecusson* une fois plus large que long; arrondi sur les côtés, rétréci ensuite en pointe, subsinueux près de celle-ci; lisse; d'un rouge cuivreux. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax à sa base; près de trois fois aussi longues que lui; rétrécies depuis les épaules jusqu'à l'extrémité; trois fois aussi larges à la base qu'à celle-ci; tridentées à leur bord postérieur: la dent médiane la plus prononcée; étroitement rebordées sur les côtés; très-médiocrement convexes; un peu relevées en carène sur la majeure partie postérieure de la suture; d'un rouge cuivreux; marquées chacune de neuf stries assez faibles et ponctuées, et d'une strie juxta-suturale rudimentaire: les 6^e à 8^e stries naissant seulement après le calus huméral. *Intervalles* presque imperceptiblement pointillés et marqués de gros points, peu rapprochés, constituant ordinairement une rangée; planiuscules: les 3^e et 5^e postérieurement relevés en forme de côte. *Dessous du corps* d'un rouge cuivreux; ponctué. *Sternums* canaliculés et garnis d'un duvet blanchâtre. Partie médiane du premier arceau du ventre avancée en forme de triangle allongé et très-étroit jusqu'au niveau du bord antérieur des hanches postérieures. *Pieds* d'un rouge cuivreux; ponctués: les antérieurs irisés de vert.

Patrie: la Crimée.

Dédiée à M. Pellet qui a enrichi le Catalogue des Coléoptères de plusieurs espèces nouvelles.
