

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDEE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937
des SOCIETES BOTANIKUES DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES
et de son GROUPE REGIONAL DE ROANNE

Siège social et Secrétariat général : 33, rue Bossuet, 69006 Lyon

TRESORERIE :

TARIF 1988	Membre actif :		Membre scolaire	
	Non abonné au bulletin	Abonné au bulletin	Non abonné au bulletin	Abonné au bulletin
Cotisations	120 F	60 F	60 F	35 F
Abonnement au bulletin	—	80 F	—	40 F
Total	120 F	140 F	60 F	75 F

Changement d'adresse, inscription ou réintégration en sus : **12 F**

Abonnement France : **140 F**

Abonnement Etranger : **180 F**

N.B. — Les virements à notre C.C.P. **LYON 101-98 H** ou les chèques bancaires, doivent être rédigés au nom de la SOCIETE LINNEENNE DE LYON.

PARTIE SCIENTIFIQUE

COLEOPTERES DE L'ARDECHE. PREMIER SUPPLEMENT A L'INVENTAIRE DE J. BALAZUC (1984).

par H.-P. ABERLENC.

Coleoptera of Ardèche. A first supplement to J. Balazuc's inventory (1984).

Résumé. — Corrections et additions à l'inventaire des Coléoptères du département de l'Ardèche (*Supp. Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 1984, 53, 334 pp.). Le recensement passe de 2422 à 2645 espèces.

Mots-clés : Ardèche, inventaire faunistique, répartition géographique, Coléoptères.

Abstract. — Corrections and additions to the Ardèche Coleoptera inventory (*Supp. Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 1984, 52, 334 pp.). The census grows from 2422 to 2645 species.

Keywords : Ardèche, faunistic inventory, geographic distribution, Coleoptera.

J. BALAZUC nous a amicalement confié la mission de tenir à jour son remarquable ouvrage « Coléoptères de l'Ardèche », paru en 1984 en supplément au *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon*. Il avait, le tout premier, conscience des inévitables lacunes de son travail qui constitue cependant un outil de premier ordre. La Société entomologique de France a d'ailleurs attribué à J. BALAZUC le *Prix Gadeau de Kerville* 1984 pour ce livre qui est déjà un « classique ».

Chose prévisible et hautement souhaitable (comme nos collègues R. ALLEMAND et P. RICHOUX l'ont souligné dans leur Avant-propos), la diffusion de l'ouvrage a suscité de nouvelles observations. Il semble que l'Ardèche soit « à la mode », si l'on en juge par le nombre d'études récentes concernant cette région, publiées par des naturalistes de diverses disciplines, et par le nombre croissant d'entomologistes qui viennent y récolter.

J. BALAZUC et nous-même tenons à remercier vivement les nombreux collègues qui nous ont envoyé leurs listes de captures et ceux qui ont fait d'utiles remarques. Nous remercions chaudement R. ARPAD pour le travail de bénédictin qu'il a accompli avec le sourire en vérifiant nos notes, et Mme M.-T. CASSAR qui a assumé la tâche ingrate et délicate de la dactylographie.

Dans les « Coléoptères de l'Ardèche », 2 422 espèces étaient recensées (voir l'Introduction p. 21 et les *Addenda* p. 331). Avec 4 suppressions, 17 confirmations et 212 nouveautés, le bilan actuel s'élève à 2 645 espèces : c'est certainement encore très au-dessous de la réalité. Soulignons que J. MOULIN, à lui seul, a récolté une grande partie des espèces citées dans le présent travail. Que nos collègues n'hésitent pas à nous faire part de leurs découvertes : espèces nouvelles pour le département, espèces déjà citées des départements voisins dont la présence en Ardèche est confirmée, localités nouvelles de Coléoptères déjà cités, *mais seulement pour des cas remarquables* (faune souterraine, espèces endémiques ou rares, etc...).

Les entomologistes qui ont récolté et (ou) identifié le matériel sont désignés par leurs initiales placées entre parenthèses s'ils sont cités plusieurs fois. Nous laissons à chacun la responsabilité de ses déterminations et de ses commentaires :

H.-P. ABERLENC (H.P.A.), R. ALLEMAND (R.A.), J. BALAZUC (J.B.), F. BAMEUL (F.B.), P. BONNEAU (P.B.), J.-M. CHAMPANHET (J.M.C.), J. DARNAUD (J.D.), S. DOGUET (S.D.), P. DROUIN (P.D.), C. DUFAY (C.D.), J.-F. ELDER (J.F.E.), H. FONGOND (H.F.), A. FOUCART (A.F.), J. LAMBELET (J.L.), J. C. LECOQ (J.C.L.), P. LECLERC (P.L.), G. LISKENNE (G.L.), A. MATOCO (A.M.), J.-M. MALDÈS (J.M.M.), J. MOULIN (J.M.), P. QUENEY (P.Q.), P. RÉVEILLET (P.R.), A. ROUDIER (A.R.), L. SCHAEFER (L.S.), J.-F. VAYSSIÈRES (J.F.V.), J. VIALIER (J.V.), R. VINCENT (R.V.).

Les noms d'entomologistes, écrits entièrement et suivis d'une date, renvoient à la bibliographie.

Des crochets encadrent les citations relatives aux départements voisins de l'Ardèche.

Les espèces que J. BALAZUC avait citées entre crochets des départements voisins et dont la présence en Ardèche a été confirmée depuis sont marquées d'un double astérisque (**).

Les espèces nouvelles pour l'inventaire sont signalées par un unique astérisque (*).

De nombreux Coléoptères ayant une vaste répartition géographique, nous pourrions indéfiniment allonger la liste des *localités nouvelles d'espèces déjà citées d'Ardèche* sans donner d'informations réellement intéressantes. Nous nous limiterons donc dans ces cas aux endémiques (telles que, par exemple, les espèces cavernicoles ou endogées) ou à des biotes rares ou remarquables à divers points de vue.

INTRODUCTION

Page 32 :

Au lieu de « s'abaisser », lire « s'abaïsser » (à « + C. B.A. »).

CARABIDAE

Page 33 :

(*) *Calosoma inquisitor* (L., 1758). — Au Reméjadou, entre Lablachère et Saint-Alban-sous-Sampzon, fin avril 1986 (J.D.).

Page 41 :

Chaetocarabus intricatus (L.). — Abondants débris dans le guano de la Chauve-souris *Myotis myotis*, dans une carrière près d'Annonay, avec ceux d'autres Carabes : *auratus*, *monilis*, *problematicus*, *auronitens* (J.M.).

Page 43 :

Chysocarabus auronitens (F.). — A. ROUDIER nous précise que sa capture de l'ab. *dauphini* Auzat à « Pierre-sur-Haute » a eu lieu en réalité à faible altitude (700 m), à 12 km au nord-ouest, dans la hêtraie de la Faye, près du village de la Terrasse, commune d'Olmet (Puy-de-Dôme). D'autre part, en bon philologue, A.R. s'élève contre l'incorrection du nom de « Pierre-sur-Haute », qui doit s'écrire : Pierre-Surhaute.

NEBRIIDAE

Page 44 :

Leistus montanus Stephens. — Mézenc, dans les « clapiers » du sud-est, 1^{er} juin 1984 (P. BRUNEAU DE MIRÉ).

Leistus fulvibarbis Dejean. — Peyraud (J.M.).

(*) *Leistus ferrugineus* (L., 1758). — N.-D.-des-Neiges (J.M.).

Page 45 :

Nebria rubripes Serville. — Cette espèce n'existe pas au Mézenc (a été confondue par les anciens auteurs avec *N. lafresnayei*).

Pages 46 et 331 :

Nebria lafresnayei Serville subsp. *foudrasi* Dejean. — Rien ne permet de diviser les *N. lafresnayei* du Massif central en formes distinctes : toutes se rattachent à la subsp. *foudrasi*. (ABERLENC *et al.*, 1985. Pour la biologie, voir également : BRUNEAU DE MIRÉ, 1985).

CICINDELIDAE

Page 49 :

Cicindela campestris L. — Au lieu de « ...dans ces dernières années à Châteaubourg... », lire : « dans ces dernières années. Châteaubourg... ».

TRECHIDAE

Page 53 :

Speotrechus mayeti (Abeille). — Saint-Laurent-sous-Coiron, vallée de l'Eyrolle : Aven de Combe-Rajeau (J.M.C.). Vogüé : grotte de la Tranchée du chemin de fer (P.D.). Alba (P.R.). Rochecolombe : grotte des Baux (J.M.C.). Chauzon : Grotte-diacalase dans la vallée de la Ligne (P.R.). Saint-Remèze : Aven de la Vigne-Close (J.M.C.).

Page 55 :

La grotte de Puechmus, hébergeant *Speotrechus mayeti* (Abeille) subsp.

caussicola Jeannel est bien dans l'Aveyron, commune de Sainte-Eulalie-de-Cernon.

Page 56 :

Anillus cebennicus Balazuc et de Miré. — Labeaume : pierres enfoncées à proximité d'un écoulement d'eaux usées, avril 1985. Naves : ravin de Baume Bastide près de la résurgence de Champclos, 23 avril 1984 ; sous des pierres enfoncées, 3 novembre 1985 (P.L., J.B. et P.R.). [Méjannes le Clap (Gard) : ravin de Combe étroite, 27 septembre 1984]. Sa répartition actuellement connue est calquée sur celle de *Diaprysius serullazi* Peyerimhoff : comme lui, il fait défaut dans le quadrant nord-est délimité par la rivière d'Ardèche, sauf à Baume-Grenas (ceci étant explicable, voir page 99 la note **).

Pages 59 et 60 :

La figure 8 page 59 représente en réalité un *Bembidion quadripustulatum* (Serville) et non un *Ocydromus (Nepha) schmidti* (Wollaston), subsp. *jeanneli* (Dewailly). C'est à la suite d'une inexplicable confusion que cette espèce a été citée d'Auriolles : elle doit être (jusqu'à nouvel ordre) enlevée de l'inventaire des Coléoptères ardéchois.

Page 62 :

(*) *Phyla tethys* Netolitzky, 1926. — Andance (J.M.).

(*) *Metallina pygmaeum* (F., 1792). — Flanc sud-est du Mézenc, 25 juin 1984 (J.B. leg., H.F. det.).

PTEROSTICHIDAE

Page 67 :

(*) *Steropus (Feronidius) melas* (Creutzer, 1799). — Région du mont Gerbier-de-Joncs (J.L.).

HARPALIDAE

Page 75 :

(*) *Anisodactylus signatus* (Panzer, 1797). — Peyraud (J.M.).

Page 79 :

(*) (Après *H. decipiens*) : *Harpalus impressipennis* Dejean, 1829. — Vernoux (HEINZ, 1983) ; (J. MESSUTAT leg.). Espèce nouvelle pour la faune de France, décrite des Sierras espagnoles ; aussi en Italie centrale et méridionale.

Egadroma marginatum (Dejean). — Saint-Just, au bord du vieux Rhône, août 1986 (P.Q.).

Page 80 :

(*) *Acupalpus dubius* Schilsky, 1888. — Saint-Désirat ; Col du Fayet (J.M.).

PANAGAEIDAE

Page 81 :

(**) *Panagaeus crux-major* (L.). — Peyraud (J.M.).

LEBIIDAE

Page 86 :

Apristus subaeneus Chaudoir. — Les exemplaires de France doivent être rapportés à *A. europaeus* Mateu (MATEU, 1980), répandu en Europe occiden-

tale et méridionale. En France : Provence, Bas Languedoc, sud du Massif central, Pyrénées ; le type provient de Nyons (Drôme et non « Vaucluse »). *A. subaeneus*, des Balkans et du Moyen-Orient, n'existe pas dans notre pays (BALAZUC et FONGOND, 1987).

Lagorce, vallée de l'Ibie, 24 juillet 1987 : nombreux exemplaires sur des rochers calcaires fissurés exposés au soleil, à quelques mètres de l'eau, l'espèce ne semblant pas toutefois être ici ripicole (H.P.A.).

BRACHINIDAE

Page 87 :

Aptinus (A.) pyrenaeus Dejean. — [La Garde-Guérin (Lozère), dans des éboulis, août 1986 (P.Q.)]. Laveyrune, près de Labastide (J.L.).

DYTISCIDAE

Page 88 :

(*) *Hyphydrus ovatus* (Linné, 1761) (remplace *ferrugineus* L., 1767). — Lagorce : petit canal d'irrigation (J.B.).

Page 89 :

« *Hydroglyphus* Motschulsky, 1853 remplace *Guignotus* Houlbert, 1934.

« Les subg. d'*Hydroporus* ne semblent pas valables sur le plan phylogénique et sont de plus en plus supprimés dans les travaux modernes. Par contre, l'ancien subg. *Suphrodytes* Des Gozis a été élevé au rang de genre et doit se placer près de *Potamonectes* et de *Stictotarsus* » (F.B.).

Page 90 :

L'excursus pérenne impénétrable à l'homme, située immédiatement en aval du Vallon de Tiourre, à la sortie de laquelle a été trouvé un unique individu de *Siettitia avenionensis* Guignot, n'est pas à proprement parler à « une trentaine de mètres au-dessous de la surface du plateau » : c'est un simple redan qui est ainsi désigné. Le plateau sous lequel se trouve le réseau d'alimentation (inaccessible et sans doute très vaste) domine l'Ardèche de quelque 250 m en cet endroit.

Ce qu'on sait des mœurs des *Siettitia* permet de supposer que l'espèce occupe là, non point des bassins souterrains d'eau libre, mais une nappe suspendue. Il n'y a quelque espoir de la retrouver qu'en plaçant une nasse à l'orifice lors du déclenchement d'une crue brutale.

Page 91 :

« *Deronectes fairmairei* (Leprieur, 1876) est une espèce propre, et non plus une variété de *D. bombycinus* » (F.B.).

Page 92 :

« *Oreodytes sanmarkii* (Sahlberg, 1826) remplace *O. rivalis* (Gyllenhal, 1827) » (F.B.).

(*) « *Agabus (Dichonectes) nitidus* (F., 1801) est bien une espèce propre et non une variété d'*A. biguttatus*. Il est vrai que le statut de *nitidus* change d'un livre à un autre » (F.B.). Saint-Alban-sous-Sampzon : le Bourbouillet.

Page 93 :

« *Rhantus* (s. str.) *suturalis* (Mac Leay, 1825) remplace *R. pulverosus* (Stephens, 1828) » (F.B.).

Page 94 :

Dytiscus marginalis L. — Il ne semblait se trouver qu'en altitude, mais

a été pris aux Granges-les-Valence, dans une piscine, en juillet 1986 (Dr A. RANCHET).

CATOPIDAE

Page 97 :

Bathysciola linderi (Abeille). — Saint-Laurent-sous-Coiron : vallée de l'Eyrolle : Aven de Combe-Rajeau (J.M.C.) ; Aven des Blaches (J.M.C.). Uzer : Baume Giraud (P.D., 1984). Chauzon : Grotte-diaclase dans la vallée de la Ligne (P.R.). Naves : Grotte des Trois Frères. Vallon de Naves, près de la résurgence de Champclos, sous des pierres enfoncées, 3 novembre 1985 (J.B. et P.R.). Saint-Remèze : Event de Midroï (*Biosp.* n° 183) (P.L.). Labastide-de-Virac, Grotte du T.C.F. au virage de la route.

Page 100 :

Diaprysius serullazi Peyerimhoff. — Lanas : Aven du Serren Bouchard. C'est la station la plus septentrionale connue (J.M.C.). Chauzon : Grotte-diaclase dans la vallée de la Ligne (P.R.). Uzer : Baume Giraud (P.D.). Brahic : Grotte des Huguenots (P.L.).

Page 101 :

D. caudatus Abeille. — Saint-Remèze : Aven de la Vigne-Close (J.M.C.).

Page 103 :

D. fagei Jeannel. — Beaulieu : Grotte du Runladou. Station remarquable, car située dans le bassin du Chassezac (affluent de l'Ardèche), les stations précédemment connues étant dans le bassin de la Claysse (affluent de la Cèze) ; toutefois une communication est fort probable entre réseaux souterrains (CHAMPANHET, 1987).

[*D. gezei* Jeannel. — Aven des Neuf Gorges au Garn (Gard) : autre découverte remarquable, car c'est la première station connue hors de l'Aven d'Orgnac. Autre point digne de mention : *D. gezei* cohabite avec *D. serullazi* aux Neuf Gorges comme à Orgnac ! (J.M.C.)].

LEPTINIDAE

Page 108 :

Leptinus testaceus Müller. — Brahic : Grotte des Huguenots. Tanargue, dans la hêtraie, 25 juin 1984 (H.P.A.).

STAPHYLINIDAE

Page 110 :

Ajouter le genre *Acrulia* Thomson, 1861 (après le genre *Anthobium*).

(*) *A. inflata* (Gyllenhal, 1808). — Tanargue : Polypore de Hêtre, 20 juin 1985 (J.B. leg., J.C.L. det.).

Page 111 :

(**) *Philorhinum sordidum* (Stephens). — Col du Fayet (J.M.).

Ajouter le genre *Phloeonomus* Heer, 1838 (après le genre *Omalium*).

(*) *P. minimus* (Er., 1837). — Col du Fayet (J.M.).

Ajouter le genre *Xylodromus* Heer, 1838-1842 (après le genre *Phloeonomus*).

(*) *X. concinnus* (Marsham, 1802). — Berrias : Château de Jalès, fumier de Lapins, 23 août 1985 (J.B.).

Page 112 :

Boreaphilus velox Heer. — Salavas : Bois des Bruyères, à la cascade de Font-Garnide, par lavage de terre, mai 1984 (J.B.).

Page 113 :

(*) *Trogophloeus nitidus* Baudi, 1848. — Andance (J.M.).

(*) *T. (Taenosoma) elongatulus* Erichson, 1839. — Salavas : Bois des Bruyères à la cascade de Font-Garnide, par lavage de terre, le 21 avril 1984 (J.B. *leg.*, J.C.L. *det.* ; avec *Erichsonius signaticornis* Mulsant et Rey, 1863 ; voir page 121).

Page 114 :

(*) *Stenus canaliculatus* Gyllenhal, 1827. — Peyraud ; Col du Fayet (J.M.).

(*) *S. stigmula* Erichson, 1839. — Peyraud (J.M.).

Page 115 :

S. longitarsis Thomson. — Forêt de Bonnefoy, 2 juillet 1985 (G.L.).

Page 116 :

Astenus longipennis Palm n'existe pas ! Il s'agit sans doute d'*A. longelytratus* Palm, 1936 (erreur de J. JARRIGE signalée par COIFFAIT, 1985).

Page 117 :

(*) *Stilicus festivus* (Mulsant et Rey, 1853). — Vallon : bords de l'Ardèche, 22 juin 1984 (J.B. *leg.*, J.C.L. *det.*).

(*) *S. orbiculatus* (Paykull, 1789). — Peyraud (J.M.).

Scopaeus longicollis Fauvel. — Coiron : Saint-Jean-le-Centenier, cailloutis basaltiques ruisselants, 10 mai 1985 (J.B. *leg.*, J.C.L. *det.*).

Page 119 :

(**) *Lathrobium terminatum* Gravenhorst. — Andance (J.M.).

Page 120 :

(*) *Platydome angusticolle* (Boisduval et Lacordaire, 1835). — Saint-Alban-sous-Sampzon : bords du Chassezac (G.L.).

Page 121 :

(*) *Othius laeviusculus* Stephens, 1832. — Col du Fayet (J.M.).

Page 122 :

(*) *Gabrius pennatus* Sharp, 1910. — Col du Fayet (J.M.).

Page 123 :

(**) *Philonthus fuscipennis* Mannherheim 1830 (remplace *P. cognatus* (Stephens, 1832)). — Privas, 1986 (G.L.).

Page 124 :

(*) *Neobisnius procerulus* (Gravenhorst, 1806). — Andance (J.M.).

Page 127 :

Quedius (Microsaurus) mesomelinus (Marsham). — Rochecolombe : Grotte des Baux (J.M.C.).

Page 129 :

(*) *Quedius (Raphirus) schatzmayri* Gridelli, 1922. — Peyraud (J.M.).

(*) *Q. (R.) aridulus* Jansson, 1939. — Andance (J.M.).

Page 132 :

(*) *Gymnusa variegata* Kiesenwetter, 1845. — Massif de Bauzon : tourbière du plateau de Cham Longe, un exemplaire, 3 septembre 1966 (J.B., *in*

coll. J. JARRIGE). Espèce relicte, à la limite sud de son aire de répartition actuelle.

Myllaena brevicornis (Matth., 1838). — Au lieu de « Chambons », lire « Chambonas ».

Myllaena elongata Matth.. — Salavas : Bois des Bruyères, source (J.B.).

Page 133 :

(*) *Gyrophæna boleti* (L., 1758). — Tanargue, en nombre dans le Champignon ligneux *Coriolus versicolor*, 3 mai 1984, (J.B. leg., J.C.L. det.).

Page 135 :

Gnypeta ripicola (Kiesenwetter). — Saint-Alban-sous-Sampzon : bords du Chassezac, 12 avril 1982 (G.L.).

Page 137 :

(*) *Atheta (Traumoecia) picipes* (Thomson, 1856). — Tanargue, Polypore de Hêtre, 20 juin 1985. (J.B. leg., J.C.L. det.).

(*) *A. (Microdota) excelsa* Bernhauer, 1911. — Montselgues : le Petit Paris, crottes de Moutons, 11 mai 1980. (J.B. leg. J.C.L. det.). Cette très petite espèce, dont la répartition est à préciser, n'est signalée que de Boulogne-sur-Mer dans le catalogue de SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1935) : « en général confondue avec *mortuorum* Thomson » (p. 125). Mais selon JARRIGE (1968), *mortuorum* est en fait *A. (M.) therondi* Jarrige, *nov. nom.* (Vaucluse, Gard, Espagne, Afrique du Nord).

A. (Microdota) spatuloides Benick, 1939. Référence de la description : *Norsk Ent. Tidskr.*, V (3), p. 104. (J.C.L.).

Page 138 :

A. (Ceritaxa) septentrioitalica Scheerpeltz, 1960. Référence de la description : *Ent. Arb. Mus. Frey*, 11, p. 623 (J.C.L.).

Page 139 :

A. (Dimetrota) knabli Benick (*nec* Bernhauer), 1938. Référence de la description : *Ent. Blätt.*, 34, p. 185 (J.C.L.).

SCAPHIDIIDAE

Page 145 :

Scaphidium quadrimaculatum Olivier — Casteljau, sous un tronc de *Quercus* putréfié, 7 juin 1987 (H.P.A.).

PSELAPHIDAE

Ajouter le genre *Faronus* Aubé, 1844 (avant le genre *Euplectus* ci-dessous).

(*) *F. lafertei* Aubé, 1844. — Andance (J.M.).

Ajouter le genre *Euplectus* Leach, 1817 (avant le genre *Trimium*).

(*) *E. duponti* Aubé, 1833. — Labeaume, par lavage de terre, 11 avril 1985 (J.B. leg., P. DE MIRÉ det.). Espèce très souvent confondue avec d'autres *Euplectus* : Europe occidentale (*nec* Autriche) : Suisse, Espagne (C. BESUCHET).

Page 146 :

Ajouter le genre *Paramaurops* Jeannel, 1948 *sensu* Besuchet, 1986.

(*) *P. abeillei* (Saulcy, 1875). — Orgnac, 27 décembre 1945 (J. THÉODORIDES leg.). Première capture sur la rive droite du Rhône. Exemplaire proche de la subsp. *chobauti* Jeannel, connue de la Sainte-Baume et du Lubéron. On ne

peut pas préciser pour l'instant sur un seul individu s'il s'agit de la même sous-espèce (OROUSSET, 1987).

Page 148 :

(*) *Reichenbachia antennata* Aubé, 1833. — Peyraud (J.M.).

HISTERIDAE

Page 150 :

Ajouter le genre *Plegaderus* Erichson, 1834 (après le genre *Gnathoncus*).

(*) *P. vulneratus* (Panzer, 1792). — Col du Fayet (J.M.).

HYDROPHILIDAE

Page 155 :

Genre *Helophorus* : le subg. *Helophorus* s. str. remplace le subg. *Megalophorus* Kuwert puisque *aquaticus* est l'espèce nominale du genre.

Le subg. *Rhopaleophorus* remplace le subg. *Atractelophorus* sans valeur phylogénique.

H. (Rhopaleophorus) flavipes Fabricius, 1792 remplace *H. (s. str.) viridicollis* Stephens, 1829 (F.B.).

(*) *Hydrochus grandicollis* Kiesenwetter, 1870. — « Espèce propre et non variété de *H. nitidicollis* » (F.B.). « Ardèche » (REY).

Page 156 :

« Les subg. de *Sphaeridium* sont sans valeur.

Megasternum Mulsant, 1844 remplace *Megasternon*.

Megasternum obscurum (Marsham, 1802) remplace *M. boletophagum auct., nec* Marsham, 1802 » (F.B.).

Page 157 :

« *Anacaena* Thomson : une révision récente de ce genre (BERGE HENEGOUWEN, *Ent. Scand.*, 1986, 17 : 393-407) a introduit des changements dans la nomenclature et il se pourrait que le matériel fût à revoir.

Laccobius (Dimorpholaccobius) neapolitanus Rottenberg, 1874 remplace *L. scutellaris* Motschulsky, 1855, nom préoccupé.

Hydrophilus Müller, 1764 remplace *Hydrous* Leach, 1775. Le nom *Hydrous* doit disparaître de la nomenclature » (F.B.).

[OCHODAEIDAE

Page 162 :

Ajouter le genre *Ochodaeus* Serville, 1825.

O. chrysomeloides (Schrank, 1781). — Au bord de la Cèze non loin de Barjac (Gard), un individu venu à la lumière vers 21 h, en juillet 1984. Première capture en France depuis 35 ans d'une espèce rarissime (BONNEAU, 1985 ; J. BARAUD *det.*).

APHODIIDAE

Pages 163 à 165 :

A la suite de la parution de l'ouvrage de DELLACASA (1983) (cf. BARAUD, 1984 et PAULIAN, 1984), la nomenclature des *Aphodius* cités doit être modifiée comme suit :

arenarius (Olivier, 1789) remplace *putridus* (Fourcroy, 1785) ;

abdominalis Bonelli, 1812 remplace *mixtus* Villa, 1833 ;
paykulli Bedel, 1908 remplace *tessulatus* (Paykull, 1798) ;
sticticus (Panzer, 1798) remplace *equestris* (Panzer, 1798) ;
foetens (F., 1787) remplace *aestivalis* Stephens, 1839 ;
foetidus (Herbst, 1783) remplace *scybalarius* (F., 1781) ;
ictericus (Laicharting, 1781) remplace *nitidulus* (F., 1792).

DELLACASA place les espèces suivantes dans de nouveaux subg. :

A. coenosus (Panzer, 1798) dans (*Enorodalus*) ;
A. immundus (Creutzer, 1799) dans (*Acanthobodilus*) ;
A. sturmi Harold, 1870 dans (*Subrinus*).

(*) *Aphodius* (*Oromus*) *alpinus* (Scopoli, 1763). — Bois de la Grézouze (Forêt de Bauzon), dans des « pétouliés » de Lapins, 9 juin 1985 (J.B.). Présence normale en Ardèche d'une espèce alticole estivale.

(*) *A. (Agrilinus) constans* Duftschmid, 1805. — Saint-Alban-sous-Sampzon: le Bourbouillet, 1985 (G.L.).

MELOLONTHIDAE

Page 173 :

Triodonta bucculenta Baraud. — Lagorce, rives de l'Ibie, 6 mai 1976, lampe à vapeur de mercure (C.D.).

CETONIIDAE

Page 178 :

Gnorimus octopunctatus (F.). — Les Vans : au Folcheran et au-dessus de Seyras ; sur Châtaignier (J.D.).

Gnorimus nobilis (L.). — Lacham-Raphaël, 10 juillet 1983. Lac d'Issarlès, 26 juillet 1984 (J.M.C.). Col de la Croix de Bauzon (J.D.).

Page 179 :

Cetonischema aeruginosa (Drury). — Bois de Païolive, 14 juillet 1984 (J.M.C.). Casteljau (J.D.). Lavilledieu, 15 juillet 1985 (J.F.E.).

Eupotosia mirifica (Mulsant). — MIKŠIČ (1984) a rejeté l'argumentation de MORETTO et BARAUD (1982) et a maintenu le nom de *Protaetia* (*Eupotosia*) *koenigi* (Reitter, 1894) subsp. *balcanica* Mikšič, 1957. La discussion peut se poursuivre indéfiniment : la même question ne se pose-t-elle pas pour d'innombrables taxons dont les types sont perdus ? (Notons, comme l'a justement souligné ROUDIER, 1985, que l'article de MORETTO et BARAUD est paru dans la *Nouv. Rev. Ent.* et non dans la *Rev. Fr. Ent.*).

L'espèce a été observée dans le Gard (R.A.), dans l'Hérault (MACAIRE, 1985 et J.M.M.) et en Espagne près de Salamanque (BARAUD et MORETTO, 1986). On devrait la retrouver en Grèce et en Turquie. Sa répartition n'est pas continue : elle vit dans des biotopes peu étendus et très éloignés les uns des autres.

Il est très facile de l'élever en faisant pondre des adultes capturés dans la nature : 2 mâles et 4 femelles pris en juillet 1984 ont donné près de 80 descendants adultes en juillet 1985. Puisse l'élevage être préféré à un piégeage pratiqué désormais chaque année à grande échelle par de nombreux entomologistes. Pour une Cétoine, d'innombrables Coléoptères, Lépidoptères, Hyménoptères, Diptères, etc. sont exterminés. La survie même de certaines populations de « *koenigi* » est menacée.

Page 181 :

Potosia fieberi (Kraatz). — Bois de Païolive, 13 juin 1981 (J.M.C.). Casteljau et entre Lablachère et Saint-Alban-sous-Sampzon. Les Vans : Le Folcheran et au-dessus de Seyras, en allant vers Peyre, sur Châtaignier (J.D.).

MELOIDAE

Page 186 :

Meloe autumnalis (Olivier) *nec autumnalis*. — Salavas : Bois des Bruyères, 3 octobre 1986 (H.P.A.).

TENEBRIONIDAE

Page 189 :

Ajouter le genre *Lyphia* Mulsant et Rey, 1859 (avant le genre *Tribolium*).
(*) *L. tetraphylla* (Fairmaire, 1856). — Banne et Casteljau, juillet 1984 (R.A. et L. DELAUNAY). Espèce citée de Corse et du Vaucluse dans le Catalogue de SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1935).

Ajouter le genre *Alphitobius* Stephens, 1832 (après le genre *Tribolium*).
(*) *A. piceus* (Olivier, 1792). — Tournon : route de Lamastre, octobre 1981 (Mme A. FORIEL).

(*) *Tenebrio opacus* Duftschmid, 1812. — Cité par erreur de « Labeaume : poulailler abandonné » sous le nom de *T. obscurus*.

ANTHICIDAE

Le travail de BONADONA, 1987 nous amène à faire les rectifications suivantes :

Page 193 :

Le subg. *Hirticomus* Pic, 1894 est élevé au rang de genre (à placer après *Anthicus*, page 194).

H. quadriguttatus (Rossi, 1792 *nec* 1784).

Le subg. *Omonadus* Mulsant et Rey, 1866 est élevé au rang de genre (à placer après le genre *Hirticomus*, page 194).

O. bifasciatus (Rossi, 1792 *nec* 1794).

Page 194 :

Anthicus quadrioculatus La Ferté *nec* « Laf. », 1848.

Ajouter le genre *Microhoria* Chevrolat, 1877 (après le genre *Anthicus*).

(*) *M. fasciata* (Chevrolat, 1838). — Saint-Sornin ; Serrières (J.M.).

(*) *Endomia unifasciatus* (Bonnelli, 1812). — Andance (J.M.).

HYLOPHILIDAE

Page 195 :

(*) *Hylophilus nigrinus* Germar, 1831. — Col du Fayet ; Peyraud ; Charnas (J.M.).

CLERIDAE

Page 200 :

Trichodes leucopsideus (Olivier). — Païolive, sur Composées, le 18 juin 1985 (J.M.M. et A.M.). Entre Lablachère et Saint-Alban-sous-Sampzon, début juillet (J.D.).

MELYRIDAE

Page 201 :

Ajouter le genre *Hypebaeus* Kiesenwetter, 1863 (avant le genre *Charopus*).
(*) *H. flavicollis* Erichson, 1840. — Saint-Désirat (J.M.).

Page 204 :

(**) *Haplocnemus nigricornis* (F.). — Col du Fayet (J.M.).

EUCNEMIDAE

Page 206 :

(*) *Dirhagus emyi* (Rouget, 1855). — Grospierres : au bord du Chassezac, 15 juin 1985 (A.M.).

ELATERIDAE

Page 208 :

Cardiophorus rufipes (Goeze). — Entre Prunet et le col de la Croix de Millet, nombreux exemplaires dans des bourses de la Chenille processionnaire du Pin (*Thaumetopoea pityocampa* Schiff.), 28 avril 1984 (H.P.A. et J.B.).

Page 214 :

(*) *Agriotes lineatus* (L., 1767). — Saint-Désirat (J.M.).

BUPRESTIDAE

Page 216 :

Sphenoptera antiqua (Illiger). — Lagorce, 7 mai 1977 (C.D.).

Page 217 :

[*Eurythyrea quercus* (Herbst). — Près de Barjac (Gard), au bord de la Cèze (BONNEAU, 1985)].

Page 219 :

Anthaxia hypomelaena (Illiger). — Bois de Païolive, sur *Eryngium* sp. (J.F.V.).

Page 221 :

(*) *Agrilus guerini* Boisduval et Lacordaire, 1835. — Vallée de l'Ibie près de Villeneuve-de-Berg, sur *Salix alba*, 7 et 9 juillet 1984. Grospierres : Vallon de N.-D.-des-Songes, femelle pondant sur une branche morte de *Salix alba*, 5 juillet 1984 (LISKENNE, 1986). Même localité, le 18 juin 1985 (excursion de la Société entomologique de France). Sainte-Marguerite-Lafigère (J.L.).

(*) *A. angustulus* (Illiger, 1803). — Saint-Paul-le-Jeune, près de la Cocalière, mai 1980 (J.F.V.).

(*) *A. derasofasciatus* Lacordaire, 1835. — Saint-Paul-le-Jeune, près de la Cocalière, mai 1980 (J.F.V.).

(*) *A. aurichalceus* Redtenbacher, 1849 ab. *rubicola* Abeille, 1897. — Aubenas, sur *Quercus*, juillet 1986 (G.L.).

(**) *A. cyanescens* (Ratz.). — Saint-Paul-le-Jeune : La Cocalière, mai 1980 (J.F.V.).

(**) *A. roscidus* Kiesenwetter. — Saint-Sornin (J.M.) (cette localité, située près de Serrières dans l'extrême nord du département, lieu de nombreuses captures dues à J.M., ne doit pas être confondue avec Saint-Sernin, près d'Aubenas).

Page 223 :

(*) *Trachys aeneus* Mannherheim, 1837. (remplace *scrobiculatus* Dejean, 1833 nec Kiesenwetter, 1857). — Saint-Désirat, sur Menthe, septembre 1984 (J.M.).

(*) *T. troglodytes* Gyllenhal, 1817. — Peyraud (J.M.).

T. scrobiculatus Kiesenwetter. — Saint-Désirat (J.M.).

Habroloma triangulare (Lacordaire). — Saint-Désirat (J.M.).

ANOBIIDAE

Page 224 :

Ajouter le genre *Dryophilus* Chevrolat, 1832 (après le genre *Hedobia*).

(*) *D. anobioides* Chevrolat, 1832. — Saint-Désirat ; Col du Fayet (J.M.).

Lasioderma redtenbacheri Bach. — Lablachère, dans tiges sèches d'*Euphorbia characias*. (J.B.).

DERODONTIDAE

Page 226 :

Ajouter le genre *Laricobius* Rosenh., 1846 (avant la famille des *Byrrhidae*).

(*) *L. erichsoni* Rosenh., 1846. — Col du Fayet (J.M.) ; inféodé aux Conifères [existe au Mont Pilat].

BYRRHIDAE

Page 227 :

(**) *Simplocaria semistriata* (F.). — Andance (J.M.).

PAULUS, (*Ent. Blätt.*, 1971, 66 : 163-174), a modifié la nomenclature des *Byrrhus* :

Seminolus redevient un sous-genre de *Byrrhus*.

Byrrhus (*Pseudobyrrhus*) *ornatus* Panzer, 1794 remplace *B. (P.) glabratus* Heer, 1841.

DRYOPIDAE

Page 228 :

Dryops lutulentus (Erichson). — Labeaume, à la lampe U.V., 29 juin 1986 (J.B.).

(*) *Dryops nitidulus* Heer, 1841. — Peyraud (J.M.).

GEORYSSIDAE

Page 230 :

« Il semble de plus en plus que cette famille fasse partie des *Hydrophiloidea*. La larve est proche de celle des *Helophorus* » (F.B.) ; famille à placer après les HYDROPHILIDAE, p. 157.

MYCETOPHAGIDAE

Ajouter le genre *Berginus* Erichson, 1846 (après le genre *Typhaea*).

(*) *B. tamarisci* Wollaston, 1854. — Saint-Désirat (J.M.).

COLYDIIDAE

Ajouter le genre *Aglenus* Erichson, 1845.

(*) *A. brunneus* (Gyllenhal, 1813). — Château de Jalès à Berrias, larves et adultes dans du fumier de Lapins, 23 août 1985 (J.B. *leg.*, R.V. *det.*). Larve figurée par VINCENT, 1987.

PHALACRIDAE

Page 233 :

- (*) *Olibrus pygmaeus* (Sturm., 1807). — Saint-Désirat (J.M.).
- (*) *O. corticalis* Panzer, 1792. — Saint-Désirat (J.M.).

NITIDULIDAE

Page 235 :

- (*) *Meligethes brevis* Sturm., 1845. — Saint-Désirat (J.M.).
- (*) *Epuraea melanocephala* (Marsham, 1802). — Saint-Sornin ; Serrières (J.M.).

LATHRIDIIDAE

Page 239 :

- Latridius*, pour raison d'homonymie, remplace *Lathridius*.
- (*) *Latridius productus* Rosenh., 1856. — Col du Fayet (J.M.).
- L'Enicmus minutus* (L., 1767) doit être placé dans le genre *Latridius*.
- Cartodere separanda* Reitter, 1887. — R. VINCENT confirme cette détermination. L'espèce n'est pas uniquement méditerranéenne et se trouve en fait dans toute la France.

Page 240 :

- (*) *Corticaria longicornis* (Herbst, 1793). — Andance (J.M.).

COCCINELLIDAE

Page 241 :

- Ajouter le genre *Coccidula* Gyllenhal, 1827 (après le genre *Subcoccinella*).
- (*) *C. rufa* (Herbst, 1783). — Saint-Désirat (J.M.).
- (*) *Pullus haemorrhoidalis* (Herbst, 1797). — Saint-Désirat (J.M.).

ENDOMYCHIDAE

Page 244 :

- Ajouter le genre *Mycetina* Mulsant, 1846 (Après le genre *Lycoperdina*).
- (*) *M. cruciata* (Schaller, 1783). — Col du Fayet (J.M.).

CHRYSOMELIDAE

Pages 245 à 262 :

MM. DOGUET et BOURDONNÉ nous ont transmis une mise à jour complète des Chrysomélides de la faune de France, ce dont nous les remercions. Les modifications à apporter à l'inventaire de BALAZUC sont si nombreuses (changements de genres, de sous-genres, de noms d'espèces, de noms d'auteurs, de dates de description, ...) que citer point par point les rectifications nécessaires serait très long, mortellement ennuyeux et pratiquement inutile. Il nous semble préférable de donner tout d'abord une liste actualisée des espèces déjà citées dans « Coléoptères de l'Ardèche » (même au prix de quelques répétitions) comprenant également les espèces nouvelles pour le département.

a) Liste des espèces :

Gen. *Donacia* F., 1775.

D. (D.) simplex F., 1775.

Gen. *Plateumaris* Thomson, 1866.

P. (Euplateumaris) sericea (L., 1761).

P. (E.) discolor (Panzer, 1795).

P. (P.) braccata (Scopoli, 1772).

P. (P.) consimilis (Schrank, 1781).

P. (P.) affinis (Kunze, 1818).

Gen. *Lema* F., 1798.

L. tristis (Herbst, 1786).

L. lichenis Voet, 1806.

L. melanopus (L., 1758).

L. hoffmannseggi Lacordaire, 1845.

Gen. *Oulema* Des Gozis, 1886.

O. cyanella (L., 1758).

Gen. *Crioceris* Geoffroy, 1762 *apud* Mueller, 1764.

C. asparagi (L., 1758).

C. paracanthesis (L., 1767).

C. duodecimpunctata (L., 1758).

Gen. *Lilioceris* Reitter, 1912.

L. merdigera (L., 1758).

L. lili (Scopoli, 1763).

Gen. *Clytra* Laicharting, 1781.

C. (C.) quadripunctata (L., 1758).

C. (C.) laeviuscula Ratzeburg, 1837.

[*C. (Clytraria) atraphaxidis* (Pallas, 1773)].

Gen. *Lachnaia* Chevrolat, 1837.

L. tristigma Lacordaire, 1846.

L. cylindrica Lacordaire, 1848.

L. sexpunctata (Scopoli, 1763).

L. pubescens (Dufour, 1820).

Gen. *Labidostomis* Germar, 1817.

L. lusitanica (Germar, 1823) var. *meridionalis* Lacordaire.

L. humeralis (Schneider, 1792).

(*) *L. lucida* Germar, 1823.

L. pallidipennis Gebler, 1830.

L. longimana (L., 1761).

Gen. *Smaragdina* Chevrolat, 1837.

S. concolor (F., 1793).

(*) *S. aurita* (L., 1766).

Gen. *Chilotomina* Reitter, 1912.

C. nigritarsis (Lacordaire, 1848).

Gen. *Coptocephala* Chevrolat, 1837.

C. unifasciata (Scopoli, 1763).

C. quadrimaculata (L., 1767).

C. tetradyma (Kuester, 1844).

Gen. *Tituboea* Lacordaire, 1848.

T. biguttata (Olivier, 1791).

Gen. *Cryptocephalus* Geoffroy, 1762 *apud* Mueller, 1764.

C. (*Protophysus*) *schaefferi* Schrank, 1789.

C. (C.) *loreyi* Solier, 1836.

C. (C.) *quadripunctatus* Olivier, 1808.

C. (C.) *coryli* (L., 1758).

C. (C.) *primarius* Harold, 1872.

C. (C.) *pexicollis* Suffrian, 1847.

C. (C.) *bimaculatus* F., 1781.

C. (C.) *rugicollis* Olivier, 1791.

C. (C.) *aureolus* Suffrian, 1847.

C. (C.) *sericeus* (L., 1758).

C. (C.) *glocicollis* Suffrian, 1847.

C. (C.) *hypochoeridis* (L., 1758).

C. (C.) *violaceus* Laicharting, 1781.

C. (C.) *tibialis* Brisout, 1866.

C. (C.) *tetraspilus* Suffrian, 1851.

C. (C.) *marginellus* Olivier, 1791.

(*) C. (C.) *nitidus* (L., 1758).

(*) C. (C.) *sexmaculatus* Olivier, 1791.

C. (C.) *imperialis* Laicharting, 1781.

C. (C.) *trimaculatus* Rossi, 1790.

C. (C.) *bipunctatus* (L., 1758).

C. (C.) *biguttatus* (Scopoli, 1763).

(*) C. (C.) *octomaculatus* Rossi, 1790.

C. (C.) *sulfureus* Olivier, 1808.

C. (C.) *parvulus* Mueller, 1776.

C. (C.) *pelleti* Marseul, 1875.

C. (C.) *concinus* Suffrian, 1847.

C. (C.) *marginatus* F., 1781.

C. (C.) *octacosmus* Bedel, 1891.

C. (C.) *decemmaculatus* (L., 1758).

C. (C.) *moraei* (L., 1758).

C. (C.) *crassus* Olivier, 1791.

C. (C.) *sempustulatus* Villers, 1789.

C. (C.) *flavipes* F., 1781.

C. (C.) *vittatus* F., 1775.

C. (*Disopus*) *pini* (L., 1758).

C. (*Burlinius*) *bilineatus* (L., 1767).

C. (B.) *elegantulus* Gravenhorst, 1807.

C. (B.) *chrysopus* Gmelin, 1788.

C. (B.) *ocellatus* Drapiez, 1819.

C. (B.) *labiatus* (L., 1761).

(**) C. (B.) *pygmaeus* F., 1792.

(*) C. (B.) *fulvus* Goeze, 1777.

C. (B.) *ochroleucus* Stephens, 1834.

C. (B.) *pusillus* F., 1777.

C. (B.) *rufipes* Goeze, 1777.

Gen. *Pachybrachis* Chevrolat, 1837.

[*P. (P.) pradensis* Marseul, 1875].

P. (P.) pallidulus Suffrian, 1851 subsp. *suturalis* Weise, 1882.

- P. (P.) tessellatus* (Olivier, 1791).
[*P. (P.) picus* Weise, 1882].
P. (P.) sinuatus Mulsant et Rey, 1859.
P. (P.) hippophaes Suffrian, 1848.
P. (P.) fimbriolatus Suffrian, 1848.
P. (Chloropachys) azureus Suffrian, 1848.
Gen. *Stylosomus* Suffrian, 1848.
(* *S. rugithorax* Abeille, 1877.
Gen. *Chrysochus* Chevrolat, 1837.
C. asclepiadeus (Pallas, 1776).
Gen. *Bromius* Chevrolat, 1837.
B. obscurus (L., 1758).
Gen. *Timarcha* Latreille, 1829.
T. (T.) tenebricosa (F., 1775).
T. (T.) goettingensis (L., 1758).
T. (T.) goettingensis subsp. *bruleriei* Bellier, 1870.
T. (T.) goettingensis subsp. *sinuaticollis* Fairmaire, 1861.
Gen. *Leptinotarsa* Stal, 1858.
L. decemlineata (Say, 1824).
Gen. *Chrysolina* Motschulsky, 1860.
C. (Dlochrysa) fastuosa (Scopoli, 1763).
C. (Chrysomorpha) cerealis (L., 1767).
C. (Menthastriella) herbacea (Duftschmid, 1825).
C. (Maenadochrysa) femoralis (Olivier, 1790).
C. (Taeniochrysea) americana (L., 1758).
C. (C.) staphylea (L., 1758).
C. (Stichoptera) sanguinolenta (L., 1758).
C. (S.) latecincta (Demaison, 1896).
C. (S.) kuesteri (Helliesen, 1911).
C. (S.) gypsophilae (Kuester, 1845).
C. (Craspeda) limbata (F., 1775).
C. (Chalcoidea) marginata (L., 1758).
C. (C.) carnifex subsp. *coerulescens* (Suffrian, 1851).
C. (C.) fuliginosa (Olivier, 1807).
C. (Minckia) oricalcia (Muller, 1776).
C. (Hypericia) varians (Schaller, 1783).
C. (H.) hyperici (Forster, 1771).
C. (H.) brunsvicensis (Gravenhorst, 1807).
C. (H.) geminata Paykull, 1799.
C. (H.) cuprina (Duftschmid, 1825).
C. (Ovosoma) haemoptera (L., 1758).
Gen. *Oreina* Chevrolat, 1837.
O. (Allorina) colluceus (Daniel, 1904).
O. (Chrysochloa) cacaliae (Schrank, 1785).
O. (C.) cacaliae subsp. *tussilaginis* (Suffrian, 1851).
O. (C.) speciosissima (Scopoli, 1763).
O. (O.) viridis (Duftschmid, 1825).
O. (O.) gloriosa (F., 1781).

- Gen. *Colaspidema* Laporte, 1833.
C. atrum (Olivier, 1790).
- Gen. *Gastrophysa* Chevrolat, 1837.
G. polygona (L., 1758).
- Gen. *Phaedon* Latreille, 1829.
P. (P.) laevigatus (Duftschmid, 1825).
P. (P.) cochleariae (F., 1792).
P. (Paraphaedon) tumidulus (Germar, 1824).
- Gen. *Hydrothassa* Thomson, 1866.
H. glabra (Herbst, 1783) var. *aucta* (F., 1787).
H. hannoverana (F., 1775) subsp. *germanica* Weise, 1884.
- Gen. *Prasocuris* Latreille, 1802.
P. phellandrii (L., 1758).
- Gen. *Plagiodera* Chevrolat, 1837.
P. versicolor (Laicharting, 1781).
- Gen. *Chrysomela* L., 1758.
C. (C.) populi L., 1758.
C. (C.) tremulae F., 1787.
C. (Macrolina) vigintipunctata (Scopoli, 1763).
- Gen. *Linnaeidea* Motschulsky, 1860.
L. aenea (L., 1758).
- Gen. *Phratora* Chevrolat, 1837.
P. (P.) tibialis (Suffrian, 1851).
P. (P.) laticollis (Suffrian, 1851).
P. (P.) vitellinae (L., 1758).
- Gen. *Gonioctena* Chevrolat, 1837.
G. (G.) viminalis (L., 1758).
G. (Goniomena) quinquepunctata (F., 1787).
G. (G.) pallida (L., 1758).
G. (Spartophila) variabilis (Olivier, 1790).
G. (S.) olivacea (Foerster, 1771).
- Gen. *Cyrtonus* Latreille, 1829.
C. dufouri Dufour, 1847.
- Gen. *Galerucella* Crotch, 1873.
G. (Neogalerucella) lineola (F., 1781).
- Gen. *Xanthogaleruca* Laboissière, 1934.
X. luteola (Mueller, 1766).
- Gen. *Pyrrhalta* Joannis, 1866.
(* *P. viburni* (Paykull, 1799).
- Gen. *Lochmaea* Weise, 1883.
L. capreae (L., 1758).
L. suturalis (Thomson, 1866).
(* *L. crataegi* (Foerster, 1771).
- Gen. *Arima* Chapuis, 1875.
A. marginata (F., 1781).

Gen. *Galeruca* Geoffroy, 1762 *apud* Mueller, 1764.

G. (G.) tanacetii (L., 1758).

G. (G.) pomonae (Scopoli, 1763).

G. (G.) interrupta Illiger, 1802 (ou Olivier, 1808).

Gen. *Sermylassa* Reitter, 1912.

S. halensis (L., 1767).

Gen. *Agelastica* Chevrolat, 1837.

A. alni (L., 1758).

Gen. *Exosoma* Jacoby, 1903.

E. lusitanica (L., 1767).

Gen. *Calomicrus* Stephens, 1831.

C. circumfusus (Marsham, 1802).

Gen. *Monolepta* Chevrolat, 1837.

M. erythrocephala (Olivier, 1801).

Gen. *Luperus* Geoffroy, 1762 *apud* Mueller, 1764.

L. longicornis (F., 1781).

(*) *L. luperus* (Sulzer, 1776).

L. flavipes (L., 1767).

L. pyreneus (Germar, 1824).

Gen. *Phyllotreta* Chevrolat, 1837.

P. nemorum (L., 1758).

(*) *P. parallelata* Boieldieu, 1859.

P. undulata Kutschera, 1860.

[*P. vittata* (F., 1801)].

(*) *P. exclamationis* (Thunberg, 1784).

P. atra (F., 1775).

P. cruciferae (Goeze, 1777).

(*) *P. diademata* Foudras, 1860.

(**) *P. nigripes* (F., 1775).

Gen. *Aphthona* Chevrolat, 1837.

A. cyparissiae (Koch, 1803).

A. illigeri Bedel, 1898.

(*) *A. pygmaea* Kutschera, 1861.

A. cyanella (Redtenbacher, 1849).

A. venustula Kutschera, 1861.

A. euphorbiae (Schrank, 1781).

Gen. *Longitarsus* Berthold, 1827.

(*) *L. pellucidus* (Foudras, 1860).

L. ochroleucus (Marsham, 1802).

(*) *L. succineus* (Foudras, 1860).

L. tabidus (F., 1775).

(*) *L. foudrasi* Weise, 1893.

L. nigrofasciatus (Goeze, 1777).

[*L. ferrugineus* (Foudras, 1860)].

(*) *L. melanocephalus* (De Geer, 1775).

(*) *L. curtus* (Allard, 1860).

L. exoletus (L., 1758).

(*) *L. pratensis* (Panzer, 1794).

L. ballotae (Marsham, 1802).

[*L. atricillus* (L., 1761)].

(*) *L. quadriguttatus* (Pontoppidan, 1765).

[*L. holsaticus* (L., 1758)].

(*) *L. luridus* (Scopoli, 1763).

(*) *L. ventricosus* (Foudras, 1860).

L. niger (Koch, 1803).

L. obliteratedus (Rosenhauer, 1847).

Gen. *Altica* Geoffroy, 1762 *apud* Mueller, 1764.

A. lythri Aubé, 1843.

A. ampelophaga Guérin-Méneville, 1858.

A. brevicollis Foudras, 1860.

A. oleracea (L., 1758).

A. carduorum Guérin-Méneville, 1858.

Gen. *Hermaeophaga* Foudras, 1860.

(*) *H. cicatrix* (Illiger, 1807).

Gen. *Arrhenocoela* Foudras, 1860.

A. lineata (Rossi, 1790).

Gen. *Asiolestia* Jacobson, 1925.

A. transversa (Marsham, 1802).

A. ferruginea (Scopoli, 1763).

[*A. femorata* (Gyllenhal, 1813)].

Gen. *Crepidodera* Chevrolat, 1837.

C. aurea (Geoffroy *apud* Fourcroy, 1785).

C. aureola (Foudras, 1860).

C. aurata (Marsham, 1802).

C. plutus (Latreille, 1804).

Gen. *Minota* Kutschera, 1859.

M. obesa (Waltl, 1839) subsp. *impuncticollis* Allard, 1860.

Gen. *Epitrix* Foudras, 1860.

E. pubescens (Koch, 1803).

Gen. *Podagrica* Chevrolat, 1837.

P. fuscicornis (L., 1766).

P. fuscipes (F., 1775).

Gen. *Mantura* Stephens, 1831.

(*) *M. chrysanthemii* (Koch, 1803).

M. rustica (L., 1766).

Gen. *Chaetocnema* Stephens, 1831.

C. (Tlanoma) semicoerulea (Koch, 1803).

C. (T.) concinna (Marsham, 1802).

C. (T.) tibialis (Illiger, 1807).

(*) *C. (T.) depressa* Boieldieu, 1859.

C. (C.) aridula (Gyllenhal, 1827).

[*C. (C.) confusa* (Boheman, 1851)].

(*) *C. (C.) mannerheimii* (Gyllenhal, 1827).

[*C. (C.) arida* Foudras, 1860].

[*C. (C.) subcoerulea* (Kutschera, 1862)].

Gen. *Sphaeroderma* Stephens, 1831.

S. testaceum (F., 1775).

Gen. *Mniophila* Stephens, 1831.

M. muscorum (Koch, 1803).

Gen. *Dibolia* Latreille, 1829 ou Berthold, 1827.

D. depressiuscula Letzner, 1846.

(*) *D. timida* (Illiger, 1807).

[*D. cryptocephala* (Koch, 1803)].

Gen. *Psylliodes* Latreille, 1825 ou Berthold, 1827.

P. affinis (Paykull, 1799).

(*) *P. laevifrons* Kutschera, 1864.

(*) *P. toelgi* Heikertinger, 1914.

Gen. *Hispa* Linné, 1767.

H. atra L., 1767.

Gen. *Di cladispa* Gestro, 1897.

D. testacea (L., 1767).

Gen. *Hypocassida* Weise, 1893.

(*) *H. subferruginea* (Schrank, 1776).

H. meridionalis (Suffrian, 1844).

Gen. *Cassida* L., 1758.

C. (Odontionycha) viridis L., 1758.

(*) *C. (O.) hemisphaerica* Herbst, 1799.

C. (C.) seladonia Gyllenhal, 1827.

C. (C.) rubiginosa Mueller, 1776.

[*C. (C.) stigmatica* Suffrian, 1844].

C. (C.) prasina Illiger, 1798.

C. (Mionycha) azurea F., 1801.

(*) *C. (M.) margaritacea* Schaller, 1783.

C. (M.) subreticulata Suffrian, 1844.

C. (Cassidulella) vittata Villers, 1789.

b) Commentaires sur les espèces nouvelles pour l'Ardèche :

(*) *Labidostomis lucida* (Germar, 1823). — Forêt de Bonnefoy, 14 juillet 1984 (J.B.). Saint-Désirat (J.M.).

(*) *Smaragdina aurita* (L., 1766). — Salavas, 17 juin 1985 sur *Salix* et sur *Quercus* (S.D.).

(*) *Cryptocephalus nitidus* (L., 1758). — Mazan-l'Abbaye (J.L.).

(*) *C. sexmaculatus* Olivier, 1791. — Bois de Païolive, 17 juin 1985 (P. CHEYMOL).

(*) *C. octomaculatus* Rossi, 1790. — « Les Ollières, 1 exemplaire à la lampe à vapeur de mercure, 4 septembre 1984 » (C.D.).

(*) *C. fulvus* Goeze, 1777. — Col du Fayet (J.M.).

(*) *Stylosomus ilicicola* Suffrian, 1848 ; *rugithorax* Abeille, 1877. — Lagorce, vallée de l'Ibie, sur *Salix* et *Populus*, 19 juin 1985. « Quel que soit le statut de ce taxon (variété pour beaucoup d'auteurs, sous-espèce, voire espèce pour d'autres) il s'agit d'une nouveauté très intéressante pour l'Ardèche. La forme typique est méditerranéenne, la « variété » est plutôt alpine mais a été citée de l'Allier et du Gard » (S.D.).

- (*) *Pyrrhalta viburni* (Paykull, 1799). — Peyraud (J.M.).
- (*) *Lochmaea crataegi* (Foerster, 1771). — Vallon-Pont-d'Arc, 6 mai 1976 (C.D.).
- (*) *Luperus luperus* (Sulzer, 1776). — Tanargue : Col de Meyrand, 20 juin 1985. Maison forestière de Chap del Bosc, 20 juin 1985 (S.D.).
- (*) *Phyllotreta parallela* Boieldieu, 1859. — Le Teil, 25 mai 1909, V. PLANET (Coll. S.D.).
- (*) *P. exclamatoris* (Thunberg, 1784). — Saint-Désirat (J.M.).
- (*) *P. diademata* Foudras, 1860. — Col du Fayet (J.M.).
- (*) *Aphthona pygmaea* Kutschera, 1861. — Lagorce, Vallée de l'Ibie, sur *Euphorbia characias*, 19 juin 1985 (S.D.).
- (*) *Longitarsus pellucidus* (Foudras, 1860). — Saint-Paul-le-Jeune : près de la Goule de Sauvas, sur *Calystegia sepium*, 18 juin 1985.
- (*) *L. succineus* (Foudras, 1860). — Salavas, 17 juin 1985.
- (*) *L. foudrasi* Weise, 1893. — Grospierres : Notre-Dame-des-Songes, 18 juin 1985, sur *Scrofularia canina*. Espèce assez rare (S.D.).
- (*) *L. melanocephalus* (De Geer, 1775). — Maison forestière de Chap del Bosc, 20 juin 1985 (S.D.).
- (*) *L. curtus* (Allard, 1860). — Maison forestière de Chap del Bosc, 20 juin 1985. Espèce assez rare (S.D.).
- (*) *L. pratensis* (Panzer, 1794). — Tanargue : Col de Meyrand, 20 juin 1985 (S.D.).
- (*) *L. quadriguttatus* (Pontoppidan, 1765). — Bois de Païolive, 18 juin 1985, sur *Cynoglossum*. Espèce assez rare (S.D.).
- (*) *L. luridus* (Scopoli, 1763). — Salavas, 17 juin 1985 (S.D.).
- (*) *L. ventricosus* (Foudras, 1860). — Tanargue : Col de Meyrand, 20 juin 1985, sur *Senecio nemorensis fuchsii*.
- « Cette espèce est bien connue du Massif central mais, jusqu'ici, on ne disposait d'aucune observation sur la plante-hôte. La plante et l'Insecte étaient abondants dans les sous-bois au Tanargue et les feuilles étaient très activement attaquées. J'ai d'ailleurs conservé vivants quelques exemplaires pendant 2 mois, sans obtenir de larves, mais j'ai pu constater que les adultes s'alimentent très régulièrement sur ce Sénéçon » (S.D.).
- (*) *Hermaeophaga cicatrix* (Illiger, 1807). — Vallon-Pont-d'Arc, 22 avril 1957, J. BARAUD leg. (Coll. S.D.).
- (*) *Mantura chrysanthemii* (Koch, 1803). — Maison forestière de Chap del Bosc, 20 juin 1985. « Seulement connu, en France, du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse » (S.D.).
- (*) *Chaetocnema depressa* (Boieldieu, 1859). — Bois de Païolive, 18 juin 1985 (S.D.).
- (*) *C. mannerheimi* (Gyllenhal, 1827). — Peyraud (J.M.).
- (*) *Dibolia timida* (Illiger, 1807). — Saint-Désirat (J.M.).
- (*) *Psylliodes laevifrons* Kutschera, 1864. — Maison forestière de Chap del Bosc, 20 juin 1985. « Seulement connu, en France, du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse » (S.D.).
- (*) *P. toelgi* Heikertinger, 1914. — Saint-Paul-le-Jeune : Goule de Sauvas, sur *Biscutella laevigata*, 18 juin 1985. « Espèce peu commune et très sporadique en France : Pyrénées-Orientales, Gard, Var, Hautes-Alpes » (S.D.).
- (*) *Hypocassida subferruginea* (Schränk, 1776). — Saint-Paul-le-Jeune : Goule de Sauvas, sur *Calystegia sepium*, 20 juin 1985 (S.D.).

(*) *Cassida hemisphaerica* Herbst, 1799. — Saint-Désirat (J.M.).

(*) *Cassida margaritacea* (Schaller, 1783) var. *melanocephala* Suffrian, 1844. — Saint-Désirat (J.M.).

c) Corrections complémentaires à la liste de 1984 :

Page 245 :

Lema lichenis Voet, 1806 remplace *Oulema gallaeciana* (Heyden, 1870).

Page 248 :

Coptocephala quadrimaculata (L., 1767) remplace *C. scopolina* (L., 1767).

C. tetradyrna Chevrolat, 1837 remplace *C. rubicunda* (Laicharting, 1781).

Page 250 :

Cryptocephalus pelleti Marseul, 1875 remplace *C. caerulescens* Sahlberg, 1839.

Page 251 :

(**) *C. (Burlinius) pygmaeus* F.. — Col du Fayet ; Saint-Désirat (J.M.).

Page 254 :

« L'indication faite par JOFFRE d'*Oreina viridis* Duftschmid sur *Achillea* (Asteraceae) paraît des plus douteuses » (ROUDIER, 1985).

Chrysolina (Menthastriella) herbacea (Duftschmid, 1825) remplace *Oreina menthastri* (Suffrian, 1825).

Page 255 :

Hydrothassa aucta (F., 1787) est une variété de *H. glabra* (Herbst, 1783).

Page 256 :

Chrysomela (Macrolina) vigintipunctata (Scopoli, 1763) (citée comme *Melasoma*). : rayer « Nasbinals (R. VINCENT) ».

Linnaeidea aenea (L., 1758) remplace *Melasoma haemorrhoidale* (L., 1758).

Page 259 :

« *Aphthona euphorbiae* (Schrank, 1781) signalée sous le nom d'*A. virescens* Foudras, 1860 est une espèce bien distincte d'*A. cyanella* (Redtenbacher, 1849) » (S.D.).

(**) *Phyllotreta nigripes* (F.). — Saint-Désirat (J.M.).

Longitarsus niger (Koch). — Maison forestière de Chap del Bosc, 20 juin 1985 (S.D.).

Page 260 :

L. exoletus (L.). — Maison forestière de Chap del Bosc, 20 juin 1985, sur *Echium* (S.D.).

[*L. ferrugineus* (Foudras, 1860) remplace *L. waterhousei* Kutschera, 1864].

Page 262 :

[*Cassida subreticulata* Suffrian, 1844 remplace *C. splendidula* Suffrian, 1844].

BRUCHIDAE

Page 263 :

Ajouter le genre *Urodon* Schönherr, 1826 (à placer après le genre *Bruchidius*).

(*) *U. suturalis* (F. 1792). — Serrières (J.M.).

ANTHRIBIDAE

Page 264 :

(*) *Anthribus nebulosus* Förster, 1771. — Serrières (J.M.).

CERAMBYCIDAE

(On pourra consulter MOULIN et VIALLIER, 1984).

Aegosoma scabricorne (Scopoli). — Neyrac-les-Bains, en loge dans un tronc décomposé de Merisier, 29 juillet 1985 (J.F.E.).

Page 265 :

(**) *Rhagium sycophanta* (Schrank, 1781). — Païolive, mai 1986 (A.F.).

Page 266 :

Ajouter le genre *Alosterna* Mulsant, 1863. (à placer après le genre *Grammoptera*).

(*) *A. tabacicolor* (De Geer, 1775). — Lagorce, 8 mai 1977 (S.D.).

Page 267 :

(*) *Anoplodera rufipes* (Schaller, 1783). — Lagorce : La Fontaine du Cade, sur Aubépines, le 22 mai 1987 (A.F. leg., L.S. det.).

Page 268 :

Anastrangalia dubia (Scopoli). — Lac d'Issarlès, juillet 1984 (J.M.C.).

Leptura quadrifasciata (L., 1758). — Lac d'Issarlès, juillet 1984 (J.M.C.).

Page 269 :

Pedostrangalia revestita (L.), variété *rubra* Geoffroy. — Lagorce : La Fontaine du Cade, sur *Quercus pubescens*, une femelle le 23 mai 1987 (A.F. leg., L.S. det.).

Page 270 :

Necydalis ulmi Chevrolat. — Bois de Païolive, 14 juillet 1984 (J.M.C.).
Saint-Alban-sous-Sampzon, juillet 1980 (J.D.).

Page 271 :

(**) *Hesperophanes (Trichoferus) griseus* (F.). — Labeaume, 14 août 1987 (J.B. leg., L.S. det.).

(**) *Glaphyra umbellatarum* (Schreb.). — Charnas (MOULIN et VIALLIER, 1984), Peyraud (J.M.).

Callimellum angulatum (Schrank). — Lagorce, rives de l'Ibie, 7 mai 1976, sur Aubépines en fleurs (C.D.).

(*) *C. abdominale* (Olivier, 1795). — Vallon-Pont-d'Arc, rives de l'Ibie, 9 mai 1987 (H.P.A.). Lagorce, mai 1976 et 1977 sur Aubépines en fleurs et Vallon-Pont-d'Arc, rives de l'Ibie, mai 1976 (C.D.). Abondant, bien que réputé « rare » en France. Saint-Remèze, une femelle, 20 juin 1987 (A.F.).

(*) *Obrium cantharinum* (L., 1767). — Saint-Gineys-en-Coiron, juillet 1986 (R.A.).

Page 272 :

Il faut écrire : *Purpuricenus budensis* (Götz, 1783) et non (Goeze, 1777) (ROUDIER, 1985).

(*) *P. globulicollis* Mulsant, 1839. — Orgnac : Bois de Ronze, juillet 1984 (Voir CHAMPANHET, 1985 et RICHOUX *et al.*, 1986).

Page 273 :

(*) *Ropalopus femoratus* (L., 1758). — Peyraud (J.M.).

Page 274 :

R. spinicornis Abeille. — Bois de Païolive, 30 juin 1984 (J.M.C.).

Ajouter le genre *Phymatodellus* Reitter, 1912 (après le genre *Phymatoderus*).

(*) *P. rufipes* (F., 1776). — Charnas (J.M.).

Page 275 :

Plagionotus detritus (L.). — Bois de Païolive, 14 juin 1981 (J.M.C.).

Page 276 :

Chlorophorus figuratus (Scopoli). — Charnas (J.M.), Lussas, 15 juin 1982. Lac d'Issarlès, juillet 1984 (J.M.C.).

C. ruficornis (Olivier). — Bidon, sur fleurs de *Daucus* dans une prairie, 13 août 1984 (J. HAMON).

Anaglyptus gibbosus (F.). — Orgnac, 18 juillet 1984 (J.M.C.).

Page 277 :

Aphelocnemis nebulosa (F.). — Rayet « Payzac... (G. LISKENNE) ».

Page 279 :

Parmena balteus (L.). — Vallon-Pont-d'Arc, 25 août 1985. (H.P.A.).

Lamia textor (L.). — Flanc sud-est du Mézenc (1400 m), sur de minuscules *Salix caprea*, 1^{er} juin 1984 (J.B.).

Page 281 :

Anaerea similis (Laicharting). — Vagnas, sur petits Saules, au bord du Rieusset, juin 1985 (excursion de la Société entomologique de France).

Page 282 :

(*) *Opsilia uncinata* (Redtenbacher, 1842). — Basse vallée de la Cance ; Col du Fayet. Très rare en France (J.M.).

Phytoecia pustulata (Schrank). — Lagorce, la Fontaine du Cade, 20 juin 1987 (A.F.).

CURCULIONIDAE

Page 283 :

(*) *Otiorhynchus (Arammichnus) ligustici* (L., 1758). — Col du Fayet (J.M.).

Page 284 :

A. ROUDIER, *in litt.* : « Le nom d'*ebeninus* appliqué aux *Otiorhynchus morio* du Massif central repose sur une pure légende.

O. morio F. a été décrit de « Germania ». *O. ebeninus* Gyllenhal a été décrit sur des mâles seulement, d'« Austria ». Les stries plus marquées des « *ebeninus* » sont une caractéristique du mâle de tous les *morio*. *O. ebeninus* Gyllenhal est donc seulement le mâle d'*O. morio morio* et doit être mis en simple synonymie. HUSTACHE, suivi par HOFFMANN, a appliqué ce nom d'*ebeninus* sans se reporter aux descriptions originales ».

Page 286 :

(*) *Phyllobius (P.) urticae* (De Geer, 1775). — Peyraud (J.M.).

Page 287 :

(*) *Polydrusus (Metallites) marginatus* Stephens, 1831. — Serrières (J.M.).

Page 288 :

(*) *Barypeithes montanus* Chevrolat, 1863. — Mont Mézenc (J.M.).

Page 289 :

Le « *Sitona humeralis* Stephens » de Saint-Alban-sous-Sampzon est en réalité un *Sitona discoideus* Gyllenhal (A.R. det.), comme BALAZUC le supposait.

Le « *Sitona lineellus* » (Bonsdorff, 1785) avait été mal déterminé : c'est en réalité un petit *S. tibialis* (Herbst, 1795) (A.R.).

(*) *Sitona sulcifrons* (Thunberg, 1798). — Col du Fayet (J.M.).

(*) *S. puncticollis* Stephens, 1831. — Saint-Désirat (J.M.).

(*) *S. flavescens* (Marsham, 1802). — Andance (J.M.).

(*) *S. hispidulus* (F., 1776). — Saint-Désirat ; Col du Fayet (J.M.).

Page 290 :

Ajouter le genre *Tanymecus* Schönherr, 1826 (après le genre *Cycloderes*).

(*) *T. palliatus* (F., 1787). — Bourg-Saint-Andéol, 1971, sur *Cirsium* (J.M.).

Page 291 :

(*) *Pachycerus scabrosus* Brullé, 1832. — Col du Fayet (J.M.).

Page 292 :

(*) *Lixus vilis* (Rossi, 1790). — Col du Fayet (J.M.).

Page 293 :

(*) *Hypera nigrirostris* (F., 1775). — Col du Fayet (J.M.).

(*) *H. viciae* (Gyllenhal, 1813). — Les Vans (J.M.).

Page 294 :

(**) *Liparus germanus* (L.). — Lac Ferrand, 2 juillet 1985 (G.L.).

Page 295 :

(*) *Pissodes pini* (L., 1758). — N.-D.-des-Neiges, abondant en 1974 (J.M.).
Forêt des Chambons (G.L.).

(*) *Magdalis cerasi* (L., 1758). — Col du Fayet (J.M.).

(*) *M. barbicornis* (Latreille, 1804). — Col du Fayet (J.M.).

(*) *M. flavicornis* Gyllenhal, 1836. — Col du Fayet (J.M.).

(*) *M. ruficornis* (L., 1758). — Col du Fayet (J.M.).

Page 296 :

(*) *Rhinoncus (R.) pericarpus* (L., 1758). — Saint-Désirat ; Saint-Félicien (J.M.).

Ajouter le genre *Auleutes* Dietz, 1896 (après le genre *Amalus*).

(*) *A. epilobii* (Paykull, 1800). — Lalouvesc (J.M.).

(*) *Zacladus exiguus* (Olivier, 1807). — Serrières (J.M.).

Page 297 :

(*) *Coeliodes ilicis* (Bedel, 1885). — Saint-Désirat (J.M.).

(*) *Ceutorhynchidius horridus* (Panzer, 1801). — Col du Fayet, 1981, abondant (J.M.).

(*) *Neosirocalus floralis* (Paykull, 1792). — La Tour d'Oriol, dans les gorges de l'Ay (J.M.).

(*) *Ceutorhynchus pollinarius* (Förster, 1771). — Saint-Désirat (J.M.).

(*) *C. maculaalba* (Herbst, 1795). — Saint-Désirat (J.M.).

(*) *C. marginatus* (Paykull, 1792). — Saint-Désirat (J.M.).

(*) *C. griseus* (Brisout, 1869). — Saint-Désirat (J.M.).

(*) *C. napi* Gyllenhal, 1837. — Col du Fayet (J.M.).

(*) *C. atomus* Boheman, 1845. — Saint-Félicien (J.M.).

(*) *C. picitarsis* Gyllenhal, 1837. — Saint-Désirat ; Saint-Sornin (J.M.).

Page 298 :

Ajouter le genre *Orobitis* (avant le genre *Sitophilus*).

(*) *O. cyaneus* (L., 1758). — Col du Fayet (J.M.).

(*) *Sphenophorus striatopunctatus* (Goeze, 1777). — Col du Fayet (J.M.).

(*) *Curculio venosus* (Gravenhorst, 1807). — Serrières (J.M.).

Page 299 :

(**) *Brachonyx pineti* (Paykull). — Col du Fayet (J.M.).

(**) *Sibinia sodalis* Germar. — Col du Fayet (J.M.).

(*) *Anthonomus (Toplithus) pedicularis* (L., 1758). — La Tour d'Oriol, dans les gorges de l'Ay (J.M.).

(*) *Sibinia potentillae* Germar, 1824. — Saint-Désirat ; Col du Fayet (J.M.).

Page 300 :

(*) *Tychius schneideri* (Herbst, 1795). — Peyraud, 1984 (J.M.) sur *Anthyllis vulneraria* L.

(*) *T. funicularis* Brisout, 1862. — Saint-Paul-le-Jeune (J.M.).

(*) *T. flavicollis* Stephens, 1831. — Peyraud (J.M.).

(*) *T. medicaginis* Brisout, 1863. — Peyraud (J.M.).

(*) *T. haematopus* Gyllenhal, 1836 (remplace *micaceus* Rey, 1855, in HOFFMANN). — Serrières ; Saint-Paul-le-Jeune (J.M.).

(*) *T. tomentosus* (Herbst, 1795). — Peyraud (J.M.).

(*) *T. pusillus* Germar, 1842. — Saint-Désirat (J.M.).

(*) *T. tibialis* Boheman, 1843. — Col du Fayet ; Peyraud (J.M.).

(*) *Microtrogus cuprifer* (Panzer, 1799). — Serrières ; Peyraud : très commun sur *Trifolium arvense* (J.M.).

(*) *Cionus tuberculosus* (Scopoli, 1763). — Vallée inférieure de la Cance (J.M.).

(*) *Nanophyes flavidus* Aubé, 1850. — Saint-Désirat (J.M.).

Page 301 :

(*) *Mecinus janthinus* (Germar, 1817). — Peyraud (J.M.).

(*) *Gymnaetron (G.) pascuorum* (Gyllenhal, 1813). — Col du Fayet, commun ; Serrières ; Peyraud (J.M.).

(*) *G. (G.) variabile* Rosenh., 1856. — Col du Fayet, 1981 : abondant sur *Plantago* poussant parmi les Genêts (J.M.).

(*) *G. (G.) rostellum* (Herbst, 1795). — Col du Fayet (J.M.).

(*) *G. (Rhinusa) netum* (Germar, 1821). — Col du Fayet : commun sur *Linaria* (J.M.).

(*) *Miarus graminis* (Gyllenhal, 1813). — Charnas (J.M.).

(*) *M. campanulae* (L., 1767). — Saint-Désirat (J.M.).

M. distinctus (Boheman, 1845). — La « subsp. » *salsosae* (*salsolae* = lapsus de DESBROCHERS) est synonyme de *distinctus* (ROUDIER, 1985).

Orchestes Illiger, 1798 remplace *Rhynchaenus* Clairville et Schellenberg.

Page 302 :

(*) *Orchestes (nec Rhynchaenus) quercus* (L., 1758). — Charnas (J.M.).

(*) *O. irroratus* Kiesenwetter, 1851. — Entre Vallon et Saint-Remèze ; Bourg-Saint-Andéol (J.M.).

(*) *O. sparsus* (Fahr., 1843). — Col du Fayet (J.M.).

(*) *O. erythropus* (Germar, 1821). — Bourg-Saint-Andéol (J.M.). Labeaume, sur Chêne, 30 août 1986 (A.M.).

- (*) *O. Ionicerae* (Herbst, 1795). — Serrières ; Laveyrune (J.M.).
- (*) *Rhamphus pulicarius* (Herbst, 1795). — Serrières (J.M.).
- (*) *Smicronyx reichi* (Gyllenhal, 1836). — Col du Fayet (J.M.).
- (*) *Pachytychius haematocephalus* (Gyllenhal, 1835). — Saint-Sornin (J.M.).

Page 303 :

- (*) *Dorytomus schoenherri* Faust, 1882. — Charnas (J.M.).
- (*) *D. tortrix* (L., 1761). — Serrières (J.M.).

Pages 303 et suivantes :

(*) *Apion (Oxystoma) ochropus* Germar, 1818. — Eteize, près du col du Fayet (J.M.).

(*) *A. (O.) craccae* (L., 1767). — Serrières ; basse vallée de la Cance (J.M.).

(*) *A. (Helianthemapion) aciculare* Germar, 1817. — Peyraud ; col du Fayet (J.M.).

(**) *A. (Perapion) sedi* Germar. — Saint-Sornin (J.M.).

(*) *A. (Diplapion) detritum* Mulsant et Rey, 1859. — Serrières, 1984 ; Saint-Désirat (J.M.).

(*) *A. (Ceratapion) scalptum* Mulsant et Rey, 1859. — Col du Fayet (J.M.).

(*) *A. (Taeniapion) semivittatum* Gyllenhal, 1833. — Saint-Désirat (J.M.).

(*) *A. (Erythrapion) cruentatum* Walton, 1844. — Col du Fayet (J.M.).

(*) *A. (E.) rubens* Walton, 1844. — Basse vallée de la Cance (J.M.).

(*) *A. (Catapion) pubescens* Kirby, 1811. — Col du Fayet (J.M.).

(*) *A. (C.) curtulum* Desbrochers, 1870. — Col du Fayet (J.M.).

(*) *A. (Thymapion) atomarium* Kirby, 1808. — Peyraud (J.M.).

(*) *A. (Protapion) schoenherri* Boheman, 1839. — Eteize, abondant (J.M.).

(*) *A. (P.) laevicolle* Kirby, 1811. — Eteize ; col du Fayet ; la Tour d'Oriol (J.M.).

(*) *A. (Apion) aethiops* Herbst, 1797. — Col du Fayet (J.M.).

(*) *A. (Eutrichapion) columbinum* Germar, 1817. — Saint-Paul-le-Jeune (J.M.).

(*) *A. (E.) platalea* Germar, 1817. — [Barjac] ; Saint-Désirat (J.M.).

(*) *A. (E.) afer* Gyllenhal, 1833. — Saint-Désirat (J.M.).

(*) *A. (E.) ononis* Kirby, 1808. — Col du Fayet (J.M.).

(*) *A. (E.) tenue* Kirby, 1808. — Serrières ; Peyraud ; la Tour d'Oriol ; Saint-Paul-le-Jeune (J.M.).

(*) *A. (Trichapion) simile* Kirby, 1811. — Saint-Sornin (J.M.).

A. (Rhopalapion) longirostre Olivier. — Nos connaissances sur un des Charançons les plus spectaculaires de notre faune ont été rassemblées par PERRIN, 1984 et par BALAZUC, 1986. L'espèce, depuis lors, a été signalée dans de nombreuses localités en France.

Page 307 :

(*) *Rhynchites (R.) caeruleus* (De Geer, 1775). — Basse vallée de la Cance (J.M.).

Page 308 :

(*) *Lasiorrhynchites cavifrons* (Gyllenhal, 1833). — Charnas ; Serrières (J.M.).

Ajouter le genre *Pselaphorrhynchites* Schilsky, 1903 (après le genre *Lasiorrhynchites*).

(*) *P. nanus* (Paykull, 1792). — Laveyrune (J.M.).

Ajouter le genre *Rhinomacer* F., 1787 (après le genre *Nemonyx*).

(*) *R. attelaboides* F., 1787. — N.-D.-des-Neiges (J.M.).

IPIDAE

(*) *Leperesinus orni* (Fuchs, 1906). — Col du Fayet (J.M.).

Page 309 :

Ajouter le genre *Hylurgops* Le Conte, 1876 (après le genre *Phloeosinus*).

(*) *H. glabratus* (Zetterstedt, 1828). — Col du Fayet ; abondant à N.-D.-des-Neiges (J.M.).

(*) *H. palliatus* (Gyllenhal, 1813). — Serrières ; Les Vans (J.M.).

(*) *Hylastes attenuatus* Erichson, 1836. — Col du Fayet ; N.-D.-des-Neiges ; [le Mas de l'Aïre] (J.M.).

(*) *Blastophagus piniperda* (L., 1758). — Col du Fayet ; N.-D.-des-Neiges (J.M.).

Ajouter le genre *Polygraphus* Erichson, 1836 (après le genre *Hylurgus*).

(*) *P. grandiclava* Thomson, 1886. — Charnas (J.M.).

Ajouter le genre *Carphoborus* Eichhoff, 1864 (après le genre *Polygraphus* ci-dessus).

(*) *C. minimus* (F., 1801). — Col du Fayet : abondant sur branchettes de Pins à terre (J.M.).

Ajouter le genre *Crypturgus* Erichson, 1836 (après le genre *Estenoborus*).

(*) *C. pusillus* (Gyllenhal, 1813). — N.-D.-des-Neiges (J.M.).

Page 310 :

Ajouter le genre *Cryphalus* Erichson, 1836 (après le genre *Xyloterus*).

(*) *C. piceae* Ratzeburg, 1837. — N.-D.-des-Neiges (J.M.).

Ajouter le genre *Anisandrus* Ferrari, 1867 (après le genre *Cryphalus* ci-dessus).

(*) *A. dispar* (F., 1792). — Saint-Désirat ; la Tour d'Oriol (J.M.).

Ajouter le genre *Xylocleptes* Ferrari, 1867 (après le genre *Dryocoetes*).

(*) *X. bispinus* (Duftschmid, 1825). — Serrières ; basse vallée de la Cance, surtout sur les Clématites (J.M.).

Ajouter le genre *Pityophthorus* Eichhoff, 1864 (après le genre *Xyleborus*).

(*) *P. buyssoni* Reitter, 1901. — Col du Fayet ; N.-D.-des-Neiges (J.M.).

Ajouter le genre *Gnathotrichus* Eichhoff, 1866 (après le genre *Pityophthorus* ci-dessus).

(*) *G. materarius* (Fitch., 1858). — N.-D.-des-Neiges (J.M.).

(*) *Pityogenes* (P.) *chalcographus* (L., 1761). — N.-D.-des-Neiges (J.M.).

(*) *P. (Pityoceragenes) quadridens* (Hartig, 1834). — N.-D.-des-Neiges (J.M.).

Page 328 :

Lire *Threticus* et non « *Thretieus* ».

C.I.R.A.D., Laboratoire de Faunistique,
B.P. 5035, 34032 Montpellier Cedex (France).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ABERLENC H. P., BALAZUC J., BRUNEAU DE MIRÉ P. et RÉVEILLET P., 1985. — Les *Nebria lafresnayei* Serville (Col. Carab. Nebriidae) des Cévennes. *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 54 (7) : 165-169, 2 fig.

BALAZUC J., 1984. — Coléoptères de l'Ardèche. Supplément du *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 53, 336 pp., 47 fig., 1 carte.

- BALAZUC J., 1986. — Texte et dessin de la vignette de couverture de *L'Entomologiste*, 42 : *Apion (Rhopalapion) longirostre* (Olivier, 1807), femelle × 12.
- BALAZUC J., FONGOND H., 1987. — A propos d'*Apristus subaeneus* Chaudoir, 1846 et d'*A. europaeus* Mateu, 1980 (Coleoptera Caraboidea Lebiidae Dromiini). *L'Entomologiste*, 43 (3) : 155-160, 2 fig.
- BARAUD J., 1984. — Informations nouvelles sur les *Aphodius* Illiger (Col. Scarabaeoidea). *L'Entomologiste*, 40 (4) : 159-162.
- BARAUD J., MORETTO P., 1986. — Remarques au sujet des *Eupotosia* Mikšić de la faune de France (Col. Cetoniidae). *L'Entomologiste*, 42 (3) : 143-144.
- BONADONA P., 1987. — Les *Athididae* (Coleoptera) de la faune de France (cinquième partie). *L'Entomologiste*, 43 (2) : 65-82.
- BONNEAU P., 1985. — Quelques bonnes captures à Païolive (Ardèche). *L'Entomologiste*, 41 (2) : 88.
- BRUNEAU DE MIRÉ P., 1985. — Un remarquable milieu-refuge : les clapiers. *L'Entomologiste*, 41 (2) : 85-87.
- CHAMPANHET J.-M., 1985. — *Purpuricenens globulicollis* Mulsant dans l'Ardèche (Col. Cerambycidae). *L'Entomologiste*, 41 (4) : 172.
- CHAMPANHET J.-M., 1987. — Propos sur *Diaprysius fagei* (Jeannel) de l'Ardèche (Coleoptera Bathysciinae). *L'Entomologiste*, 43 (4) : 199-200.
- COIFFAIT H., 1985. — Analyse d'ouvrage : BALAZUC (J.) — Coléoptères de l'Ardèche. *Nouv. Revue Ent. (N.S.)*, 2 (1) : 37-38.
- DELLACASA G., 1983. — Sistematica e nomenclatura degli Aphodiini italiani (Coleoptera Scarabaeidae Aphodiinae). *Monografie, I, Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino*, 467 pp., 1003 fig.
- HEINZ W., 1983. — *Harpalus impressipennis* Dejean, ein bisher übersehenes Element der Französischen Fauna (Col. Carabidae). *Nouv. Rev. Ent.*, 13 (3) : 279-280.
- JARRIGE J., 1968. — Sur quelques *Atheta* de la Faune de France (Coleoptera, Aleocharidae). *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 37 (6) : 247-249.
- LISKENNE G., 1986. — Nouvelles localisations d'un *Silphidae* dans les Alpes, et d'*Agrilus guerini* Lacordaire (Col. Buprestidae) en Ardèche. *L'Entomologiste*, 42 (2) : 77-80, 1 fig., 1 carte.
- MACAIRE P., 1985. — *Eupotosia mirifica* (Mulsant) dans l'Hérault (Col. Cetoniidae). *L'Entomologiste*, 41 (3) : 122.
- MATEU J., 1980. — Datos y comentarios sobre el género *Apristus* Chaudoir. *Publ. Inst. Zool. « Dr. Augusto Nobre »*, Porto, 159 : 5-22, fig. A à F.
- MIKŠIĆ R., 1984. — Remarques sur l'article de Ph. MORETTO et J. BARAUD « Les *Eupotosia* Mikšić de France : nouveaux statuts (Col. Scarabaeoidea Cetoniidae) ». *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 53 (9) : 311-313.
- MORETTO P. et BARAUD J., 1982. — Les *Eupotosia* Mikšić de France : nouveaux statuts (Col. Scarabaeoidea Cetoniidae). *Nouv. Revue Entom.*, 12 (2) : 145-149.
- MOULIN J. et VIALLIER J., 1984. — Coléoptères de la région de Roussillon (Isère — France). III. Cerambycidae. *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 53 (8) : 276-277 ; 53 (9) : 309-311.
- OROUSSET J., 1987. — Le genre *Paramaurops* Jeannel en Ardèche (Col. Pselaphidae). *Nouv. Revue Ent. (N.S.)*, 4 (3) : 252.
- PAULIAN R., 1984. — Parmi les livres (analyse de l'ouvrage de G. DELLACASA sur les Aphodiini). *L'Entomologiste*, 40 (1) : 37.
- PERRIN H., 1984. — Présence en France d'*Apion (Rhopalapion) longirostre* (Olivier) (Coleoptera Curculionidae Apioninae) et répartition dans la région paléarctique. *L'Entomologiste*, 40 (6) : 269-274, 1 carte.
- RICHOUX P., ALLEMAND R., PUIPIER R. et DELAUNAY L., 1986. — Biogéographie des *Purpuricenens* (Col. Cerambycidae) dans le sud de la France. *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 55 (9) : 305-318, 3 fig. dont 1 carte.
- ROUDIER A., 1985. — Revue analytique : BALAZUC J. — Coléoptères de l'Ardèche. *Cahiers des Naturalistes, Bull. N.P., n.s.* 41 (2) : 29-31.
- SAINTE-CLAIRE DEVILLE J., 1935-1938. — Catalogue raisonné des Coléoptères de France. *L'Abeille*, 36 : 1-469.
- VINCENT R., 1987. — Larve d'*Aglenus brunneus* (Gyllenhal) (Col. Colydiidae). *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 56 (3) : 104, 1 fig.