

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDEE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937
 des SOCIETES BOTANIQUES DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
 REUNIES
 et de son GROUPE REGIONAL DE ROANNE

Siège social et Secrétariat général : 33, rue Bossuet, 69006 Lyon

TRESORERIE :

TARIF 1988 et 1989	Membre actif :		Membre scolaire	
	Non abonné au bulletin	Abonné au bulletin	Non abonné au bulletin	Abonné au bulletin
Cotisations	120 F	60 F	60 F	35 F
Abonnement au bulletin	—	80 F	—	40 F
Total	120 F	140 F	60 F	75 F

Changement d'adresse, inscription ou réintégration en sus : 12 F

Abonnement France : 140 F

Abonnement Etranger : 180 F

N.B. — Les virements à notre C.C.P. LYON 101-98 H ou les chèques bancaires, doivent être rédigés au nom de la SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON.

Pour toute demande de renseignements, prière de s'adresser au Secrétaire général et de joindre un timbre pour la réponse.

- WOODRUFF R. E., 1976. — The tortoise beetles of Florida. IV. *Metriona bicolor* (Fab.). *Ent. Circ.*, 164 : 2 pp.
- YU, 1981. — The caudal fork of the Cassidinae, their taxonomic significance. *Sinozoologica*, 1 : 47-50.
- ZAITZEV Yu M. et MEDVEDEV L. N., 1983. — Larvae of Cassidinae of the tribe Aspidomorphi from Vietnam. in *Fauna and Ecology of Vietnam*, Nauka, Moscow, 130-145.
- ZIKAN J. F., 1942. — Sobre a conservação des Cassideneos. *Rodriguesa*, 6 (15) : 83-85.
- ZOLESSY J. DE, 1968. — Estudio genética de las variaciones cromáticas y estudio anatomica de *Chelymorpha variabilis* Boh. *Rev. Soc. Ur. Ent.*, 7 : 20-44.
- ZWOLFER H. et EICHORN O., 1966. — The host ranges of *Cassida* spp. attacking Cynareae (Compositae) in Europe. *Z. angew. Ent.*, 58 : 384-397.
- ZWOLFER H., 1969. — Experimental feeding ranges of species of Chrysomelidae (Col.) associated with Cynareae (Compositae) in Europe. *Techn. Bull. Commonw. Inst. biol. Control*, 17 : 115-130.

PRESENCE D'APION LONGIROSTRE EN SAONE-ET-LOIRE (Coleoptera Curculionidae)

par J. COULON.

Apion (*Rhopalapion*) *longirostre* Ol. a été découvert en France, dans le département de l'Ardèche, par J.-M. EHRET et J. BALAZUC en 1982, puis retrouvé dans diverses localités (Ardèche, Hérault, Alpes-de-Haute-Provence) par plusieurs entomologistes. Les informations le concernant ont été regroupées par PERRIN (1984, *L'Entomologiste*, 40 (6), 269-274).

Répendue de l'Italie à la Turquie et au sud de l'URSS, cette espèce est également connue au Canada et dans tout l'est des USA. Son expansion en Italie (MEREGALLI et OSELLA, 1977, *Ann. Accad. Agri. Torino*, 15-32) laissait prévoir l'invasion actuellement observée en France.

Nous pensons intéressant de signaler la présence le 26 juin 1988 de 6 exemplaires femelles de cette espèce sur des roses trémières (*Althaea rosea*) à Sagy, commune de Cruzille, canton de Lugny à 20 kilomètres au nord de Mâcon (Saône-et-Loire).

Ceci représente une progression de plus de 200 kilomètres vers le nord par rapport aux stations citées dans notre pays. La répartition de l'espèce est d'ailleurs probablement continue le long des vallées du Rhône et de la Saône puisque elle a été observée en abondance, toujours sur roses trémières, par nous-même le 8 juillet à La Mulatière, ainsi qu'en diverses autres localités de l'agglomération lyonnaise par P. RICHOUX. Il sera intéressant de vérifier si cette espèce progresse plus au nord et se maintient dans ces localités dans les années à venir.

100 chemin des Fonds, 69110 Sainte Foy lès Lyon.