

**ANNALES**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE**  
DE LYON

---

*Année 1867.*

—

(NOUVELLE SÉRIE.)

—

TOME QUINZIÈME

---

PARIS  
F. SAVY, LIBRAIRE  
rue Hautefeuille, 24.

—

15 Janvier 1868.

# DESCRIPTION

DE

## DEUX NOUVELLES ESPÈCES DE COLÉOPTÈRES

Par E. MULSANT et A. GODART.

Présentée à la Société linnéenne le 12 août 1867.

---

### ***Coptocephala peregrina.***

*Testacée, subpubescente. Tête lisse avec deux impressions longitudinales entre les antennes et une petite strie sur la partie médiane. Yeux noirs. Prothorax transversal, creusé au milieu d'un sillon longitudinal, tronqué carrément à la base. Écusson en triangle allongé, pubescent. Élytres faiblement striées, ornées d'une bande noire en forme de chevron, à cheval sur la suture.*

Var. *Élytres sans taches.*

Longueur 0<sup>m</sup>,0078 à 0<sup>m</sup>,0090 (3 à 4 l.) — Larg. 0030 (4 l. 1/2)

♂ Les trois premiers articles des tarsi antérieurs fortement dilatés.

♀ Les trois premiers articles des tarsi antérieurs simples.

*Corps* peu allongé, déprimé, testacé avec la tête et le prothorax rougeâtres.

*Tête* assez grande, près d'un tiers plus étroite que le prothorax, marquée entre les antennes de deux impressions obliques et d'une petite ligne qui les sépare.

*Yeux* noirs, arrondis, très-saillants.

*Antennes* de la longueur de la tête et du prothorax réunis; pubescentes, avec le 1<sup>er</sup> article oblong, épais; le 2<sup>e</sup> plus court, obconique; le 3<sup>e</sup> allongé; les 4<sup>e</sup> à 10<sup>e</sup> subégaux, obconiques; le dernier allongé, acuminé au bout.

*Prothorax* transversal, d'un tiers moins long que large, finement rebordé à la base, plus largement sur les côtés qui sont relevés en gouttière; échancré légèrement en avant, faiblement arrondi sur les côtés avec les angles antérieurs saillants, infléchis et les postérieurs obtus; coupé carrément à la base, creusé au milieu d'un sillon longitudinal raccourci antérieurement; marqué de chaque côté de la base de deux impressions oblongues; assez brillant et lisse.

*Écusson* en triangle allongé, pubescent.

*Élytres* planes, en carré allongé, plus larges que le prothorax à la base, deux fois et demie environ plus longues que lui; munies latéralement d'un rebord qui s'efface un peu avant l'extrémité, qui est tronquée obliquement; à neuf stries imperceptibles; parées d'une bande noirâtre commune ayant la forme d'un chevron dont le sommet est sur la suture, située vers les deux tiers de leur longueur; intervalles presque plans, excepté les 2<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> qui sont visiblement relevés, marqués de très-petits points servant d'insertion à des poils très-courts, d'un fauve rougeâtre qui font paraître les élytres mates; quatre ou cinq gros points, très-distancés sur le huitième intervalle.

*Dessous du corps* lisse, d'un rouge testacé brillant. *Cuisses* sensiblement renflées. *Tibias* hispides sur leur arête: le pénultième article des tarsi en cœur.

Cette espèce a été trouvée à Marseille, courant sur le port; elle aura été importée avec les arachides provenant de l'Égypte.

### **Aubéonymus notatus.**

*Ovale-oblong, convexe, noir, couvert de squammules gris-noirâtres. Rostre déprimé, arqué, fortement ponctué. Antennes assez longues et grêles. Tête et prothorax fortement ponctué. Élytres ponctuées-striées, marquées d'une tache transversale commune, d'un gris roussâtre, entourée d'un cercle noir. Pattes robustes: jambes armées d'un fort crochet à leur extrémité.*

Longueur 0<sup>m</sup>,008 (3 1/2 l.) — Largeur 0<sup>m</sup>,005 (4 3/4 l.).

*Corps* ovale, oblong, convexe, noir.

*Tête* large, courte, convexe, rugueusement ponctuée. *Rostre* de la longueur de la tête et du prothorax réunis, arqué, déprimé, marqué de trois carènes longitudinales, fortement ponctué; deux lignes de points beaucoup plus gros de chaque côté de la carène médiane.

*Yeux* latéraux, ovulaire, déprimés, noirs.

*Antennes* pubescentes, d'un roux ferrugineux; scape atteignant le bord antérieur du prothorax; funicule un peu plus long que le scape, à 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> article allongés, obconiques: le 1<sup>er</sup> plus épais et un peu plus long que le 2<sup>e</sup>: les 3<sup>e</sup> à 5<sup>e</sup> courts, ovalaires: 6<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> plus longs, subarrondis: massue ovale oblongue, subacuminée.

*Prothorax* un peu plus long que large, tronquée au sommet et prolongé en arrière à la base, faiblement arrondi sur les côtés, lobé derrière les yeux; d'un noir de poix; rugueusement ponctué et paré de squamules grisâtres.

*Écusson* petit, triangulaire, couvert d'un duvet grisâtre.

*Élytres* oblongues, deux fois plus longues que le prothorax, plus larges que ce dernier à la base; *Épaules* proéminentes; faiblement arrondies sur les côtés et assez brusquement rétréci en arrière; garnies de squammules piliformes, grisâtres; parées de petites taches, composées de squammules ovalaires, d'un gris noirâtre, disposées longitudinalement sur les intervalles et d'une tache commune, transversale, d'un gris roussâtre, entourée d'un cercle noir, située vers les deux tiers de la longueur et s'étendant de chaque côté depuis la suture jusqu'au troisième intervalle, marquées de stries profondes assez fortement ponctuées; intervalles larges, convexes.

*Dessous du corps* subdéprimé, noirâtre, rugueusement ponctué.

*Pattes* robustes, garnies d'une pubescence épaisse; d'un brun ferrugineux. *Cuisses* courtes, fortement renflées après leur milieu, ponctuées sur toute leur surface. *Tibias* chagrinés et rugueusement ponctués; armés d'un fort crochet à leur extrémité. *Tarses* courts, garnis en dessous d'une brosse de poils grisâtres.

*Patrie*: Les environs de Magenta (Italie).