

BULLETIN MENSUEL  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE  
DE LYON**

SOCIÉTÉ DE SCIENCES NATURELLES, RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE



33 rue Bossuet, F 69006 LYON

SOMMAIRE

SECO M. et B. — Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française. 5 <sup>e</sup> note (Coleoptera) .....	244
CHEVIN H., CHEVIN S., DE FLAUGERGUES F. et MOUSSA A. — Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de l'Isère .....	254
NAVIAUX R.L. — Révision du genre <i>Collyris</i> (sensu lato) (Coleoptera Cicindelidae) (11 <sup>e</sup> partie) .....	259

CONTENTS

SECO M. & B. — Contribution to the knowledge of French Histeridae. 5th note (Coleoptera) .....	244
CHEVIN H., CHEVIN S., DE FLAUGERGUES F. & MOUSSA A. — Inventory of the Symphyta (Hymenoptera) of the department of Isère (France) .....	254
NAVIAUX R.L. — <i>Collyris</i> : Revision of the genera and description of new species (Coleoptera Cicindelidae) (11th part) .....	259

## Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française. 5<sup>e</sup> note (Coleoptera)

*Michel et Bernard Secq*

Tête Noire, F 24230 Montcaret.

Résumé. — Liste d'observations concernant 61 espèces de Coléoptères Histeridae en France continentale et en Corse.

### Contribution to the knowledge of French Histeridae. 5th note (Coleoptera)

Summary. — List of observations of 61 species of Histeridae in mainland France and Corsica.

La littérature entomologique offre déjà un nombre non négligeable de citations d'Histeridae, on peut en particulier retenir plusieurs publications qui ont notablement marqué l'histoire des Histérides de notre pays. En premier lieu FAIRMAIRE et LABOULBÈNE (1854) (tableaux rédigés par MARSEUL), ces auteurs incluent dans leurs tableaux des séries de localités françaises. Ensuite, FAUVEL (in GOZIS, 1886 ; 1889) établit un véritable catalogue comprenant de nombreuses localités, plus récemment AUZAT (1916-1937) dont le travail ne fut pas terminé, dressa une liste très significative de localités pour environ la moitié des espèces de la famille. A présent, il est nécessaire d'accentuer les investigations afin d'introduire un peu de vigueur dans ce groupe et d'accroître notre connaissance sur la répartition des espèces françaises. Pour poursuivre cette tâche, nous présentons ci-dessous quelques localités de captures, ces références assureront d'ici quelques temps la réalisation d'un catalogue des Histérides de France continentale et de Corse.

*Teretrius* (s. str.) *fabricii* Mazur, 1972. (= *picipes* Fabricius, 1792). — Haute-Vienne : Saint-Barbant (L. Mesmin > Coll. J. Théron > M.N.H.N. Paris), 1 ex.

*Pleuroleptus rothi* (Rosenhauser, 1856). — Corse : Porto-Vecchio (P. Sorlet), 5 ex., 15-VI-1978 ; Restonica (P. Sorlet), 1 ex., 21-VI-1978.

Cette espèce fut mentionné une seule fois de Corse par LUIGIONI (1929).

*Plegaderus* (s. str.) *saucius* Erichson, 1834. — Corse : Vizzavona (P. Sorlet), 2 ex., 22-VI-1978.

Accepté pour publication le 17 novembre 1994.

*Plegaderus (s. str.) vulneratus* (Panzer, 1792). — Isère : Grande Charreuse (V. Planet > Coll. N. Degallier), 2 ex., 29-IX-1908, sapin, lumière.

*Plegaderus (s. str.) caesus* (Herbst, 1792). — Saône-et-Loire : Le Breuil (R. Vincent), 2 ex., 7-VI-1977, cavité.

*Plegaderus (s. str.) dissectus* Erichson, 1839. — Seine-et-Marne : Fontainebleau (M. de Boissy > Coll. N. Degallier), 2 ex., 8-05 / 1 ex., 6-05. — Oise : Forêt de Compiègne (De Buffévent > Coll. N. Degallier), 4 ex. ; Forêt de Chantilly (J.-C. Bocquillon), 1 ex., 20-VI-1993.

*Plegaderus (s. str.) sanatus gobanzi* J. Müller, 1902. — Corse : Porto-Vecchio (Coll. N. Degallier), 1 ex.

*Eubrachiium pusillum* (Rossi, 1792). — Var : Les Arcs (M. de Boissy > Coll. N. Degallier) ; Collobrières (P. Sorlet) ; Cogolin (Sainte-Claire Deville > Coll. N. Degallier). — Pyrénées-Atlantiques : Ahusquy (H. Coiffait > M.N.H.N. Paris), 1 ex., 18-IX-1946.

*Chaetabraeus (s. str.) glogulus* (Creutzer, 1799). — Saône-et-Loire : Salornay (P. Sorlet), 3 ex., 4-IV-1992, inondation de la Guye.

*Abraeus perpusillus* (Marsham, 1802). (= *globosus* Hoffmann, 1803). — Corse : Vizzavona (J. Orousset). — Saône-et-Loire : Forêt de Chapaize (P. Sorlet) ; Salornay (P. Sorlet) ; Bonnay (P. Sorlet) ; Massilly (P. Sorlet) ; Cortevaix (P. Sorlet). — Dordogne : Carsac-de-Gurçon (M. et B. Secq). — Indre-et-Loire : Chambray (C. Cocquempot) ; Montbazou (C. Cocquempot). — Oise : Forêt de Chantilly (J.-C. Bocquillon). — Lot : Lunegarde (F. Burle) ; Montdoumerc (F. Burle) ; Bédouer (F. Burle).

*Abraeus roubali* Olexa, 1958. — Lot : Saint-Michel-de-Bannières (D. Delpy), 1 ex., 22-IX-1992, Vallée de la Tourmente, pré inondé. — Allier : Brouêt-Vernet (H. du Buysson > Coll. J. Théron > M.N.H.N. Paris), 1 ex.

Ces deux localités confortent la présence de cette espèce en France (Secq, 1990).

*Abraeus parvulus* Aubé, 1842. — Oise : Forêt de Compiègne (De Buffévent > Coll. Sainte-Claire Deville > M.N.H.N. Paris), 4 ex.

*Halacritus punctum punctum* (Aubé, 1842). — Pyrénées-Atlantiques : Hendaye (Coll. H. Coiffait > M.N.H.N. Paris), 1 ex., 16-VII-1945. — Charente-Maritime : Ile d'Oléron, La Cotinière (M. et B. Secq), 37 ex., 30-V-1993, sous des algues en bord de mer, aussi sous les pierres plates et les planches en bois sur le sable ; Ile d'Oléron, La Morelière (M. et B. Secq), 6 ex., 5-VI-1993, sous les algues et sous les planches en bois en bord de mer.

On rencontre parfois cette espèce sur le sable à l'ombre des rochers ; lorsque le rayonnement solaire devient trop brûlant, les imagos s'enfoncent dans le sable.

*Aeletes (s. str.) atomarius* (Aubé, 1842). — Lot-et-Garonne : Sos (Coll. Sainte-Claire Deville > M.N.H.N. Paris), 8 ex. — Dordogne : Carsac-de-Gurçon (M. et B. Secq), 2 ex., 25-IV-1993 / 20 ex., 1-V-1993 / 6 ex., 9-V-1993 / 2 ex., 21-V-1994, sous écorce d'un vieux tronc de chêne mort sur pied. L'organe sexuel fut vérifié sur près de 40 spécimens d'*A. atomarius* ; nous avons constaté seulement des valves femelles. — Seine-et-Marne : Fontainebleau (Méquignon > Coll. Sainte-Claire Deville > M.N.H.N. Paris), 1 ex., V-1902. — Oise : Forêt de Compiègne (De Buffévent > Coll. Sainte-Claire Deville > M.N.H.N. Paris), 2 ex.

*Acritus nigricornis* (Hoffmann, 1803). — Aude : Gincla (M. et B. Secq), 1 ex., 8-V-1992, tamisage de fumier de vache. — Lot : Montdoumerc (F. Burle), 1 ex., 10-V-1994, fumier. — Dordogne : Saint-Avit-Sénieur (M. et B. Secq), 1 ex., 5-XII-1992, inondation de la Couze.

*Acritus minutus* (Herbst, 1792). — Pyrénées-Atlantiques : Ahusquy (H. Coiffait > M.N.H.N. Paris), 2 ex., 11-VII-1946.

*Acritus homoeopathicus* Wollaston, 1857. — Lot : Cabrerets, Forêt de Montclar (F. Burle), 1 ex., 7-II-1992, souche de pin calciné. — Dordogne : Saint-Avit-Sénieur (M. et B. Secq), 1 ex., 5-XII-1992, inondation de la Couze ; Montpeyroux (M. et B. Secq), 1 ex., 3-X-1993, inondation de la Lidoire. — Indre-et-Loire : Monts, La Cave (C. Cocquempot), 6 ex., 13-II-1988, détritrus d'inondation.

*Myrmetes paykulli* Kanaar, 1979. (= *piceus* Paykull, 1811). — Puy-de-Dôme : Pionsat (Coll. Sainte-Claire Deville > M.N.H.N. Paris), 1 ex.

*Chalcionellus amoenus* (Erichson, 1834). — Aude : Carcassonne (ex. Marseul / Gavoy > Coll. Sainte-Claire Deville > M.N.H.N. Paris), 2 ex.

*Chalcionellus decemstriatus decemstriatus* (Rossi, 1792). — Bouches-du-Rhône : Saliers (C. Cocquempot), 2 ex., 6-VII-1989.

*Hypocacculus (Nessus) rubripes* (Erichson, 1834). — Landes : Ondres-Plage (M. et B. Secq). — Charente-Maritime : Ile de Ré, Plage de l'Embarcadère (C. Cocquempot) ; Ile de Ré, Plage de la Couarde (C. Cocquempot).

*Hypocaccus rugifrons* (Paykull, 1798). — Landes : Ondres-Plage (M. et B. Secq).

*Hypocaccus rugiceps* (Duftschmidt, 1805). — Rhône : Lyon (Coll. J. Clermont > Coll. H. Coiffait > M.N.H.N. Paris), 4 ex. — Hautes-Pyrénées : Lourdes (J. Théron > M.N.H.N. Paris), 1 ex., 20-VII-1945. — Puy-de-Dôme : Mont-Dore (Coll. Sainte-Claire Deville > M.N.H.N. Paris), 1 ex. — Allier : Moulins (H. du Buysson > Coll. J. Théron > M.N.H.N. Paris), 1 ex., VIII-1891, sables de l'Allier — Pas-de-Calais : Paris-Plage (C. Dach > Coll. Sainte-Claire Deville, M.N.H.N. Paris), 1 ex., 7-02.

*Baeckmanniolus dimidiatus dimidiatus* (Illiger, 1807). — Aude : Port-la-Nouvelle (C. Cocquempot). — Landes : Ondres-Plage (M. et B. Secq).

*Baeckmanniolus dimidiatus maritimus* (Stephens, 1830). — Charente-Maritime : Ile de Ré, Plage de l'Embarcadère (C. Cocquempot).

*Xenonychus tridens* (Jacquelin-Duval, 1852). — Hérault : Palavas (H. Perrot > Coll. H. Coiffait > M.N.H.N. Paris), 1 ex.

*Dendrophilus (s. str.) punctatus punctatus* (Herbst, 1792). — Vienne : Rouillé, Le Grand Breuil (P. Cantot). — Ariège : Lesparrou, Engauly (R. Vincent). — Pyrénées-Orientales : La Massane (R. Dajoz > Coll. Y. Gomy). — Bouches-du-Rhône : Marseille, Petit Bosquet (Coll. N. Degallier). — Ain : Le Plantay (R. Vincent). — Saône-et-Loire : Igé (R. Vincent). — Allier : Broût-Vernet (H. du Buysson). — Marne : Forêt de la Traconne (R. Vincent). — Seine-et-Marne : Fontainebleau (M. de Boissy > Coll. N. Degallier, P. Bordat > Coll. N. Degallier) ; Fontainebleau, Bas Bréau (P. Cantot). — Yvelines : Forêt de Saint-Germain (R. Vincent). — Oise : Noyon (B. de Brunier > Coll. N. Degallier). — Seine-Maritime : Rosay (C. et Y. Gomy).

*Kissister minimus* (Aubé, 1850). — Var : Saint-Cyr (M. de Boissy > Coll. N. Degallier), 1 ex. — Alpes-Maritimes : Nice, Trinité (Coll. N. Degallier), 1 ex., 18-III-1931. — Lot : Montfaucon (F. Burle), 1 ex., 12-XII-1993, Vallée du Céou, pré inondé ; Sousceyrac, Asfaux-Haut (M. et B. Secq), 1 ex., 15-V-1994, tamisage de mousse. — Saône-et-Loire : Salornay (P. Sorlet), 4 ex., 4-IV-1992, inondation de la Guye ; Cortevaix (P. Sorlet), 2 ex., 21-XI-1992, inondation de la Guye. — Indre-et-Loire : Monts, La Cave (C. Cocquempot), 1 ex., 13-II-1988, détritrus d'inondation. — Nord : Bray-Dunes (M. Lodewyckx), 1 ex., 12/14-IX-1992, trou dans le sable.

*Carcinops* (s. str.) *pumilio* (Erichson, 1834). — Corse : Bonifacio (M. Tronquet > Coll. R. Vincent) ; Venaco (P. Cantot). — Var : Le Beausset (J. Meyer > Coll. N. Degallier) ; Saint-Zacharie (P. Bonneau > Coll. F. Duhaldeborde) ; Roquebrune-sur-Argens, Les Planes (P. Ponel > Coll. G. Moragues). — Alpes-Maritimes : Saint-Laurent-du-Var (A. Matocq > Coll. R. Vincent). — Alpes-de-Haute-Provence : Riez (C. et Y. Gomy). — Vaucluse : Lapalud, La Faine (J. Coffin) ; Mondragon (J. Coffin). — Bouches-du-Rhône : Roquevaire (G. Moragues > Coll. N. Degallier) ; Marseille, Petit Bosquet (G. Moragues > Coll. N. Degallier). — Gard : Générac (P. Leblanc) ; Pont-Saint-Esprit (J. Lambelet). — Ardèche : La Fontaine-du-Cade, Lagorce (A. Foucart) ; Grospierres (G. Liskenne > Coll. R. Vincent) ; Labeaume (A. Foucart) — Drôme : Forêt de Saou (J. Lambelet). — Aveyron : Millau (A. Fages). — Hérault : Laroque (P. Cantot) ; Le Caylar (M. et B. Secq) ; Lauroux, Cirque de Labeil (F. Burle). — Pyrénées-Atlantiques : Banca (M. et B. Secq). — Gironde : Soulac-sur-Mer (H. Thomas). — Charente-Maritime : Ile d'Oléron, Pointe de Chaucre (M. et B. Secq). — Ille-et-Vilaine : Saint-Aubin-du-Cormier (M. Secq). — Morbihan : Radenac (R. Vincent) ; Réguiny (R. Vincent) — Finistère : Tréboul (M. Lambert). — Eure-et-Loir : Marcilly (P. Cantot). — Essonne : Soissy-sur-Seine (M. Lambert). — Aube : Saint-Pouange (P. Leblanc). — Saône-et-Loire : Igé (R. Vincent).

*Paromalus* (s. str.) *flavicornis* (Herbst, 1792). — Corse : Manganello (J. Orousset) ; Vizzavona (J. Orousset, Coll. R. Vincent) ; Forêt de Vizzavona (G. Moragues). — Var : Sainte-Baume (Coll. N. Degallier). — Vaucluse : Orange, L'Aubépin (J. Coffin) ; Lapalud (J. Lambelet). — Hérault : Forêt du Crouzet (R. Dajoz > Coll. Y. Gomy). — Pyrénées-Orientales : La Massane (G. Tempère, R. Dajoz > Coll. Y. Gomy) ; Arles-sur-Tech (R. Dajoz > Coll. Y. Gomy) ; Collioure, Valbonne (G. Tempère). — Pyrénées-Atlantiques : Laruns (G. Tempère) ; Col d'Arette (Coll. C. Duverger) ; Forêt d'Iraty (G. Tempère, C. Jeanne > Coll. C. Duverger). — Landes : Belhade (G. Tempère). — Haute-Loire : Monistrol-sur-Loire (P. Moret) — Puy-de-Dôme : Olliergues (C. et Y. Gomy). — Loire : Vivans (D. Keith). — Saône-et-Loire : Mesvrin (R. Vincent) ; Massilly (P. Sorlet) ; Forêt de la Ferté (R. Vincent). — Haute-Vienne : Tersannes (P. Dauphin). — Vienne : Forêt de Saint-Sauvant, Carrefour-de-la-Belle-Touche (M. Phalip) ; Coulombiers, Forêt de l'Épine (M. Phalip) ; Forêt de Moulières (M. Phalip). — Indre-et-Loire : Ambillou (C. Cocquempot) ; Chambray (C. Cocquempot). — Morbihan : Saint-Congard (C. et Y. Gomy) ; Radenac (R. Vincent) ; Forêt de Lanouée (R. Vincent). — Manche : Moyon, La Butte (J.-F. Elder). — Eure : Cocherel (R. Vincent). — Yvelines : Lardy (R. Vincent). — Seine-et-Marne : Coubert (R. Vincent) ; Montereau (P. Cantot) ; Fontainebleau (F. Burle, P. Cantot, Coll. N. Degallier) ; Forêt de Fontainebleau, La Tillaie (R. Vincent) ; Fontainebleau, Bas

Bréau (P. Cantot) ; Fontainebleau, Le Chêne Brulé (P. Cantot). — Oise : Forêt de Compiègne (R. Vincent, F. Burle) ; Forêt de Chantilly (J.-C. Bocquillon) ; Viaduc-de-Coye (R. Vincent). — Nord : Roubaix (D. Menet) ; Forêt de Raismes (F. Burle) ; Château l'Abbaye (F. Burle) ; Forêt de Mormal (F. Burle) ; Forêt Saint-Amand (F. Burle).

*Paromalus (s. str.) parallelepipedus* (Herbst, 1792). — Corse : Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (P. Bonneau) ; Manganello (J. Orousset) ; Forêt d'Aitone (G. Tempère, Coll. N. Degallier). — Gard : Chamborigaud (J. Coffin). — Vaucluse : Mont-Ventoux (G. Moragues). — Ardèche : Lamastre (P. Bonneau > Coll. F. Duhaldeborde). — Aveyron : Millau (A. Fages). — Lot-et-Garonne : Sénestis (F. Tessier). — Landes : Belhade (G. Tempère). — Gironde : Arcachon (Coll. N. Degallier). — Charente-Maritime : Ile d'Oléron, Forêt de Saint-Trojan (M. Phalip). — Haute-Vienne : Tersannes (P. Dauphin). — Vienne : Forêt de Moulières (M. Phalip). — Morbihan : Malestroit (C. et Y. Gomy). — Yvelines : Limay (M. Grosclaude > Coll. M. Lambert) ; Forêt de Rambouillet (R. Vincent). — Loiret : Forêt d'Orléans (R. Vincent) ; Orléans (Coll. N. Degallier). — Seine-et-Marne : Larchant (Coll. N. Degallier) ; Foy-les-Nemours (C. Duverger) ; Fontainebleau (F. Burle, P. Cantot, G. Tavakilian > Coll. N. Degallier) ; Fontainebleau, Georges-du-Houx (J. Hamon) ; Fontainebleau, Le Chêne Brulé (P. Cantot) ; Forêt de Fontainebleau, La Tillaie (M. Tronquet > Coll. R. Vincent). — Essonne : Verrières-le-Buisson (Coll. N. Degallier). — Oise : Forêt de Chantilly (J.-C. Bocquillon) ; Forêt de Compiègne (R. Vincent). — Nord : Forêt de Raismes (F. Burle). — Marne : Camp militaire de Mourmelon (J.-M. Maldès > Coll. A. Foucart). — Aube : Radonvilliers (P. Leblanc) ; Forêt de la Perthe (C. Dheurle > Coll. P. Leblanc). — Bas-Rhin : Weitswiller (D. Keith). — Haute-Loire : Monistrol-sur-Loire (P. Moret).

*Epiurus (s. str.) comptus* (Illiger, 1807). — Var : Les Arcs (G. Moragues), 1 ex., 25-X-1987, bord de l'Asse, écorce de *Populus sp.* ; Cavalaire (M. de Boissy > Coll. N. Degallier), 5.

*Pseudepiurus italicus* (Paykull, 1811). — Lot : Floirac (D. Delpy), 1 ex., 18-V-1994, fente d'écorce d'un vieux peuplier mort garnie de petits champignons corticoles. « Nous mentionnons ici 3 espèces supplémentaires pour la faune lotoise (SECQ, 1992 a, b) ». — Haute-Savoie : Etrembières (Coll. Margry > Coll. J. Théron > M.N.H.N. Paris), 1 ex., 6-IV.

Cette espèce était jusqu'à maintenant connue de France par une capture des Pyrénées-Orientales (NORMAND, 1904).

*Tribalus (s. str.) minimus* (Rossi, 1790). — Var : Hyères (V. Planet > Coll. N. Degallier), 3 ex., 13-II-1924.

*Onthophilus striatus striatus* (Forster, 1771). — Aveyron : Viarouge (M. et B. Secq). — Aude : Gincla (M. et B. Secq). — Pyrénées-Orientales : Céret (F. Duhaldeborde). — Ariège : Arnavé (M. et B. Secq). — Pyrénées-Atlantiques : Gabas (G. Tempère). — Vienne : Rouillé, Le Grand Breuil (P. Cantot) ; Vivonne (P. Cantot) ; Lusignan (P. Cantot) ; Curzay-sur-Vonne (P. Cantot). — Deux-Sèvres : Le Pallu (P. Cantot) ; Forêt de l'Hermitain (P. Cantot). — Finistère : Tréboul (M. Grosclaude > Coll. M. Lambert). — Yvelines : Versailles-Matelots (Coll. A. Dubois > Coll. E. Cavro > Coll. G. Canou). — Essonne : Verrières (A. Michel > Coll. G. Tempère). — Seine-et-Marne : Forêt Pontault-Combault (C. Duverger). — Paris : Bois de Boulogne

(R. Vincent). — Val-d'Oise : Domont (F. Burle). — Nord : Forêt de Raismes (F. Burle). — Doubs : Montbéliard (J. Lambelet). — Saône-et-Loire : Igé (R. Vincent) ; Cortevaix (P. Sorlet).

*Onthophilus punctatus punctatus* (Müller, 1776). (= *sulcatus* Fabricius, 1792). — Isère : Vienne (L. Falcoz). — Orne : Corubert (H. Coiffait), 1 ex., 26-XII-1936, nid de taupe. — Val-de-Marne : Bonneuil (Jarrige > Coll. R. Vincent), 1 ex., VIII-1938. — Oise : Noyon (B. de Brunier), 1 ex., 19-III-1925, nid de taupe. — Nord : Bruille-Saint-Amand (F. Burle), 2 ex., 21-III/29.III-1985, nide de taupe ; Raismes (F. Burle), 3 ex., 9-XI/13-XI/3-XII-1984, sous une botte de paille.

*Onthophilus globulosus* (Olivier, 1789). (= *exaratus* Illiger, 1807). — Var : Toulon (L. Guérin). — Bouches-du-Rhône : Marseille (F. Ancey). — Gard : Nîmes (Boitel). — Hérault : Montpellier (H. Lavagne).

*Merohister ariasi* (Marseul, 1864). — Alpes-Maritimes : Vaugrenier (P. Bonadona > Coll. H. Coiffait > M.N.H.N. Paris), 1 ex., 16-VIII-1947 ; Vaugrenier (H. Coiffait > M.N.H.N. Paris), 1 ex., X-1947, chêne liège. — Var : Cogolin (P. Bonadona > Coll. H. Coiffait > M.N.H.N. Paris), 1 ex., 26-VII-1951.

*Hister quadrimaculatus* Linné, 1758. — Corse : Réserve de Scandola (C. Cocquempot) ; Lavezzu, Iles Lavezzi (C. Cocquempot). — Hérault : Palavas (C. Cocquempot) ; Pignan (C. Cocquempot) ; Fabrègues (C. Cocquempot). — Pyrénées-Atlantiques : Ainhoa (C. Cocquempot). — Landes : Ondres-Plage (M. et B. Secq). — Lozère : Mont-Aigoual, Col de Perjuret (J.-C. Bocquillon). — Vienne : Ceaux-en-Loudun (C. Cocquempot) ; Vicq-sur-Gartempe (C. Cocquempot). — Indre-et-Loire : Sorigny (C. Cocquempot) ; Cravant-les-Côteaux (C. Cocquempot) ; Loches (C. Cocquempot) ; Chambray (C. Cocquempot) ; Forêt de Chinon (C. Cocquempot) ; Monts, La Cave (C. Cocquempot) ; Chambray-lès-Tours (C. Cocquempot). — Maine-et-Loire : Nueil-sur-Layon (C. Cocquempot). — Finistère : Pointe du Raz (A. Fages).

*Hister unicolor unicolor* Linné, 1758. — Bouches-du-Rhône : Saintes-Maries-de-la-Mer (C. Girard > Coll. Y. Gomy). — Hautes-Alpes : Château Queyras, Sommet Bucher (C. Cocquempot). — Ain : Grand Colombier, nord de Fenestrez (F. Duhaldeborde). — Pyrénées-Orientales : Col de Puymorens (J. Lambelet). — Ariège : Quérigut (C. Girard > Coll. Y. Gomy). — Hautes-Pyrénées : Col de la Beyrède (C. Cocquempot). — Pyrénées-Atlantiques : Pic des Escaliers (C. Cocquempot). — Indre-et-Loire : Montbazou (C. Cocquempot) ; Paulmy (C. Cocquempot). — Maine-et-Loire : Doué-la-Fontaine (C. Cocquempot).

*Hister illigeri illigeri* Duftschmidt, 1805 (= *uncinatus* Illiger, 1807). — Corse : Lavezzu, Iles Lavezzi (C. Cocquempot). — Var : La Sainte-Baume (J. Lambelet). — Gard : Pont-des-Tourradons (F. Tessier). — Vienne : Vicq-sur-Gartempe (C. Cocquempot).

*Hister moerens* Erichson, 1834. — Loiret : Saint-Sauveur-des-Eaux (G. Tavakilian > Coll. N. Degallier).

Espèce déjà signalée de Fontainebleau (GRUARDET, 1932), la capture effectuée dans le département du Loiret conforte la présence d'*Hister moerens* dans la région parisienne, cependant il est nécessaire d'avoir des observations

plus récentes pour confirmer une fois pour toute sa présence dans cette région.

*Margarinotus (Ptomister) distinctus* (Erichson, 1834). — Yvelines : Chambourcy (Coll. E. de Saint-Albin > Coll. S. A. de Marseul > M.N.H.N. Paris), 1 ex., 28-IV-1935.

*Margarinotus (Ptomister) merdarius* (Hoffmann, 1803). — Côte-d'Or : Forêt de Citeaux (Coll. N. Degallier). — Indre-et-Loire : Chambray (C. Cocquempot). — Orne : Fay (Coll. N. Degallier).

*Margarinotus (Ptomister) brunneus* (Fabricius, 1775) (= *cadaverinus* Hoffmann, 1803). — Var : Tanneron (C. Cocquempot) ; Toulon (A. Moretto > Coll. N. Degallier) ; Six-Fours (G. Moragues > Coll. N. Degallier) ; Sanary (Coll. N. Degallier). — Bouches-du-Rhône : Saintes-Maries-de-la-Mer (Coll. N. Degallier). — Hérault : Lauroux, Cirque de Labeil (M. & B. Secq). — Haute-Marne : Bourmont (G. Minet > Coll. N. Degallier). — Oise : Monceaux, Cinqueux (Coll. N. Degallier). — Indre-et-Loire : Forêt de Loches (C. Cocquempot) ; Bois de Boizé (C. Cocquempot).

*Margarinotus (Ptomister) striola succicola* (Thomson, 1862). — Doubs : Valdahon (Coll. N. Degallier), 6 ex., VI-1983, cadavre.

*Margarinotus (Stenister) obscurus* (Kugelann, 1792) (= *stercorarius* Hoffmann, 1803). — Lot : Calviac (F. Burle), 1 ex., 30-IV-1992, motte en bordure de champ.

*Margarinotus (Paralister) purpurascens* (Herbst, 1791). — Bouches-du-Rhône : Marseille, Château Gombert (G. Moragues > Coll. N. Degallier). — Lot : Cabrerets (F. Burle). — Indre-et-Loire : Beaumont-en-Véron, Perou (C. Cocquempot) ; Saint-Quentin-sur-Indrois (C. Cocquempot) ; Monts, La Cave (C. Cocquempot). — Maine-et-Loire : Doué-la-Fontaine (C. Cocquempot).

*Margarinotus (Paralister) ventralis* (Marseul, 1854). — Hautes-Pyrénées : Col de la Beyrède (C. Cocquempot) ; Col du Tourmalet (C. Cocquempot). — Dordogne : Villefranche-de-Lonchat (M. et B. Secq). — Lot : Sousceyrac, Asfaux-Haut (M. et B. Secq). — Indre-et-Loire : Noyant-de-Touraine (C. Cocquempot). — Côte-d'Or : Messigny (Coll. N. Degallier) ; Saulieu (Coll. N. Degallier) ; Les Gouilles (G. Minet > Coll. N. Degallier).

*Margarinotus (Paralister) ignobilis* (Marseul, 1854). — Var : Saint-Pilon, Sainte-Baume (C. Cocquempot) ; Plan d'Aups (C. Cocquempot). — Lot-et-Garonne : Montagnac-sur-Auvignon (M. et B. Secq).

*Margarinotus (Paralister) punctiventer* (Marseul, 1854) (= *stigmatosus* Marseul, 1861). — Aveyron : La Glène (A. Fages).

*Atholus bimaculatus* (Linné, 1758). — Bouches-du-Rhône : Roquevaire (G. Moragues > Coll. N. Degallier).

*Atholus duodecimstriatus* (Schrank, 1781). — Bouches-du-Rhône : Saliers (C. Cocquempot). — Gard : Pont-des-Tourradons (F. Tessier). — Lot-et-Garonne : Marmande, Magdelaine (F. Tessier) ; Montagnac-sur-Auvignon (M. et B. Secq). — Dordogne : Veyrignac, Rocardanel (F. Burle). — Indre-et-Loire : Les Essards (C. Cocquempot) ; Sorigny (C. Cocquempot).

*Atholus praetermissus* (Peyron, 1856). — Gard : Pont-des-Tourradons, Camargue (C. Cocquempot).

*Atholus corvinus* (Germar, 1817). — Var : Montauroux (C. Cocquempot), 1 ex., 20-IV-1992. — Vienne : Vicq-sur-Gartempe (C. Cocquempot), 1 ex., 8-IV-1982.

*Platysoma (Eurylistes) minor* (Rossi, 1792) (= *frontale* Paykull, 1798). — Pyrénées-Orientales : La Massane (M. de Boissy > Coll. N. Degallier), 1 ex., 5-04. — Hautes-Pyrénées : Col d'Aspin (G. Tempère), 1 ex., 11-VII-1953, N° 5 910. — Pyrénées-Atlantiques : Eaux-Chaudes, Val-de-Bitet (G. Tempère), 4 ex., 21-VII-1973, N° 9 370 ; Vallée d'Aspe, Forges d'Abel (G. Tempère), 1 ex., 31-V-1936, Alt. 1 100-1 200 m, N° 2 626. — Isère : Entre-deux-Guiers (V. Planet > Coll. N. Degallier), 1 ex., 25-V-1929. — Ain : Forêt d'Evieu (P. Sorlet), 1 ex., 22-V-1976 ; Le Plantay (R. Vincent), 1 ex., 14-IV-1979. — Saône-et-Loire : Forêt de Chapaize (P. Sorlet), 1 ex., 23-IV-1987. — Oise : Forêt de Chantilly (J.-C. Bocquillon), 1 ex., 14-VII-1993. — Seine-et-Marne : Rosay, Forêt d'Eawy (C. et Y. Gomy), 1 ex., VIII-1963, sous écorce de hêtre.

*Platysoma (s. str.) compressum* (Herbst, 1783). — Ardèche : Pradons (A. Foucart). — Vaucluse : La Bonde (C. Fagniez > Coll. N. Degallier). — Hérault : Saint-Pons-de-Thomières, Brassac (L. Soldati) ; Forêt du Crouzet (R. Dajoz > Coll. Y. Gomy). — Aveyron : Tiergues (A. Fages). — Tarn : Lavaur (F. Burle). — Aude : Maillis (M. et B. Secq). — Pyrénées-Orientales : La Massane (R. Dajoz > Coll. Y. Gomy). — Pyrénées-Atlantiques : Col d'Orgambideska (Coll. M. Phalip) ; Larrau (G. Tempère). — Charente : La Péruse (Coll. E. Giraud > Coll. P. Dauphin). — Haute-Vienne : Tersannes (P. Dauphin). — Vienne : Forêt de l'Épine, Coulombiers (M. Phalip). — Deux-Sèvres : Forêt de l'Ermitain (M. Phalip) ; Avon (P. Cantot). — Indre-et-Loire : Ambillou (C. Cocquempot) ; Cléré-les-Pins (C. Cocquempot). — Morbihan : Paimpont (R. Vincent). — Manche : Moyon, La Butte (J.-F. Elder). — Seine-et-Marne : Forêt de Fontainebleau (F. Burle, P. Cantot) ; Fontainebleau, Le Chêne brûlé (P. Cantot). — Seine-Saint-Denis : Bondy (Coll. Gerde > Coll. N. Degallier). — Val-d'Oise : Forêt de Carnelle (Coll. J. Hamon). — Oise : Compiègne (P. Cantot) ; Forêt de Compiègne (F. Burle) ; Forêt de Compiègne, Mont-Saint-Marc (C. Dheurle > Coll. J. Leblanc). — Nord : Forêt de Raismes (F. Burle). — Marne : Forêt du Chêne de la Vierge, Le Cadran (C. Dheurle > Coll. P. Leblanc). — Aube : Forêt d'Aumont-Rumilly (P. Leblanc). — Loiret : Guilly (R. Vincent). — Bas-Rhin : Andlau (R. Vincent). — Côte-d'Or : Les Goules (G. Minet > Coll. N. Degallier). — Saône-et-Loire : Verzé, Bois de Vaux (R. Vincent) ; Cortevaix (P. Sorlet) ; Forêt de la Ferté (P. Sorlet) ; Sologny (P. Sorlet) ; Bois Sigy-le-Châtel (P. Sorlet) ; Blanot, Col de la Pistolet (R. Vincent) ; Pont-Seille (R. Vincent) ; Bois de Morenchin (R. Vincent). — Ain : Forêt d'Evieu (P. Sorlet). — Territoire-de-Belfort : Faverois (J. Lambelet). — Haute-Savoie : Germany (P. Bonneau > Coll. F. Duhaldeborde). — Puy-de-Dôme : Olliegues (C. et Y. Gomy). — Allier : Forêt de Tronçais (J. Lambelet, P. Cantot). — Cantal : Riom (P. Dauphin) ; Vallée de Falgoux (F. Burle) ; Menet (T. Nerat > Coll. R. Vincent) ; Trizac (R. Vincent) ; Trizac, Lieuchy (H. Vincent > Coll. R. Vincent) ; Massiac (P. Moret). — Corrèze : Orniac (M. et B. Secq). — Lot : Frayssinet (F. Burle) ; Sousceyrac, Asfoux-Haut (M. et B. Secq).

*Cylister elongatum elongatum* (Thunberg, 1787) (= *oblongum* Fabricius, 1792). — Corse : Forêt d'Aitone (P. Cantot) ; Vizzavona (P. Sorlet) ; Forêt de l'Ospedale (P. Bonneau) ; Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (P. Bonneau) ;

**Ajaccio** (Coll. N. Degallier). — Alpes-Maritimes : Puget-Théniers (P. Bonneau > Coll. F. Duhaldeborde). — Alpes-de-Haute-Provence : Peyroules (P. Berger) ; Montagne de Lure (P. Bonneau > Coll. F. Duhaldeborde). — Var : Cavalaire (M. de Boissy > Coll. N. Degallier) ; Col du Clavel, Montagne de Lachens (C. Cocquempot) ; Comps (G. Moragues) ; Sainte-Baume (P. Bonneau > Coll. F. Duhaldeborde). — Vaucluse : Mont-Ventoux, Forêt de Malaucène (D. Menet) ; Mont-Ventoux (Coll. N. Degallier, G. Moragues) ; Bédoin, Font d'Angiou (J. Coffin) ; la Bonde (C. Fagniez > Coll. N. Degallier). — Gard : Chamborigaud (J. Coffin). — Ardèche : Salavas (D. Keith) ; Lamastre (P. Bonneau > Coll. F. Duhaldeborde) ; Arizolles (J. Balazuc > Coll. P. Leblanc) ; Pinèdes de Seyras (A. Foucart). — Lozère : La Parade (P. Leblanc) ; Le Domal (P. Leblanc) ; Saint-Flour-de-Mercoire (J. Lambelet) ; Langogne (J. Lambelet). — Aveyron : Millau (A. Fages). — Aude : Montredon (O. Gillet). — Landes : Soustons (Coll. N. Degallier). — Charente-Maritime : Ile d'Oléron, Forêt de Saint-Trojan (M. Phalip, P. Cantot) ; Royan (E. Giraud > Coll. P. Dauhin). — Morbihan : Port-Louis (J.-P. Orvoën > Coll. N. Degallier) ; Merlevenez (J.-P. Orvoën > Coll. N. Degallier). — Sarthe : Roézé (P. Cantot). — Essonne : Lardy (F. Burle). — Loiret : Forêt d'Orléans, R. F. de la Verrière (R. Vincent). — Seine-et-Marne : Fontainebleau (Coll. J. Hamon). — Val-d'Oise : Menouville (Coll. J. Hamon). — Oise : Forêt d'Ermenonville (F. Burle) — Seine-Maritime : Rouen (Coll. E. Giraud > Coll. P. Dauphin). — Marne : Germaines, à l'est de la forêt de Châtillon (H. Vincent > Coll. R. Vincent) ; Camp militaire de Mourmelon (J.-M. Maldès > Coll. A. Foucart). — Aube : Forêt de la Perthe (C. Dheurle > Coll. P. Leblanc). — Côte-d'Or : Romanet (Coll. N. Degallier). — Bas-Rhin : Haguenau, Oberhoffen (D. Keith). — Savoie : Chambéry (D. Keith). — Puy-de-Dôme : Saint-Nectaire (R. Berard > Coll. E. Giraud > Coll. G. Tempère). — Cantal : Massiac (P. Moret).

*Cylister filiforme* (Erichson, 1834) (= *elongatum* Olivier, 1789). — Var : Six-Fours (G. Moragues > Coll. N. Degallier), 1 ex., 7-VIII-1977, sous écorce de pin.

*Cylister ferrugineus* (Thunberg, 1794) (= *angustatum* Hoffmann, 1803). — Côte-d'Or : Romanet (Coll. N. Degallier), 3 ex., 30-IV-1977.

*Hololepta* (s. str.) *plana* (Sulzer, 1776). — Pyrénées-Atlantiques : Siros (Coll. Duranton > Coll. N. Degallier), 1 ex., 11-III-1980, berges du Gave de Pau, sous écorce. — Lot-et-Garonne : Couthures-sur-Garonne (F. Tessier), 1 ex., XII-1992, débris de la Garonne. — Indre : Châteauroux (R. Demoflys > Coll. Y. Gomy Dét.), 9 ex., X-1938. — Indre-et-Loire : Montbazou (C. Cocquempot), 7 ex., 26-III-1983 ; Berthenay (C. Cocquempot), 1 ex., 26-II-1977. — Eure : Caër (A. Simon > Coll. R. Demoflys > Coll. Y. Gomy Dét.), 3 ex., IV-1958 ; Louviers (C. Girard > Coll. Y. Gomy Dét.), 1 ex., 16-V-1960, sous écorce de peuplier. — Yvelines : Forêt de Saint-Germain (Coll. R. Demoflys > Coll. Y. Gomy Dét.), 3 ex., 2-I-1925 / 4 ex., III-1935 ; Achères (Coll. J. Nègre > Coll. Y. Gomy Dét.), 15 ex., 2-V-1932, parc. — Essonne : Saclas (H. Fongond > Coll. Y. Gomy Dét.), 1 ex., 23-V-1953 ; Bouray (Coll. J. Nègre > Coll. Y. Gomy Dét.), 8 ex., 21-III-1943 ; Bièvres (Coll. J. Nègre > Coll. Y. Gomy Dét.), 3 ex., 2-IV-1930 ; Mennecy (Coll. C. Fagniez > Coll. J. Nègre > Coll. Y. Gomy Dét.), 3 ex., 16-IV-1922. — Loiret : Orléans (Coll. Agnus > Coll. Morel > Coll. Y. Gomy Dét.), 2 ex., 8-III-1924 ; Montargis (Coll. Taravellier > Coll. Y. Gomy Dét.), 9 ex. ; Guilly (R. Vincent), 3 ex., 13-VII-1979, souche ; Assay, vers

Châtillon-sur-Loire (P. Taupin), 2 ex., 15-V-1970, terreau dans une souche. — Seine-et-Marne : Tribardou, près d'Esblly (H. Vincent > Coll. R. Vincent), 1 ex., 23-IV-1983, crue de la Marne. — Val-de-Marne : Bonneuil (Coll. Morel > Coll. Y. Gomy Dét.), 1 ex. — Oise : Saint-Claude, Bury (R. Constantin > Coll. Y. Gomy Dét.), 5 ex., 12-IX-1959 / 10 ex., 31-I-1960, sous écorce de peupliers ; Forêt de Compiègne, Fresnoy-la-Rivière (J.-C. Bocquillon), 1 ex., 23-VIII-1993, sous écorce de peuplier. — Côte-d'Or : Saulieu (Coll. N. Degallier), 4 ex., 25-IV-1977. — Nièvre : La Charité-sur-Loire (C. et Y. Gomy, Dét.), 1 ex., 29-VII-1961, sous écorce de peuplier abattu. — Saône-et-Loire : Vieux-Château, Serrières (R. Vincent), 2 ex., 25-III-1976. — Isère : Le Bouchage (P. Sorlet), 6 ex., 28-III-1976 ; Morestel (P. Sorlet), 1 ex., 12-IV-1974 ; Saint-Victor-de-Morestel (P. Sorlet), 1 ex., 13-IV-1974.

*Hetaerius ferrugineus* (Olivier, 1789). — Saône-et-Loire : Saint-Ythaire (P. Sorlet), 2 ex., 9-II/5-III-1993, fourmilière. — Oise : Forêt de Chantilly (J.-C. Bocquillon), 2 ex., IV-1993, dans une fourmilière.

#### RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- AUZAT V., 1916-1937. — Histeridae gallo-rhénans. *Miscellanea Entomologica*, 1916 : III-IV ; 1917 : vol. XXIV (3-4) : 5-66 ; 1923 : 67-82 ; 1924 : 83-98 ; 1925 : 99-114 ; 1926 : 115-130 ; 1928 : 131-146 ; 1937 : 147-162.
- FAIRMAIRE L. et LABOULBÈNE A., 1954. — Faune entomologique française ou description des Insectes qui se trouvent en France, Coléoptères, Tome premier. Paris, I-XXXV + 665 pp.
- FAUVEL A., 1889. — Supplément aux Histerides gallo-rhénans. *Rev. Ent.*, Caen, 77-81.
- GOZIS M. DES, 1886. — Les Histerides gallo-rhénans, Tableaux traduits et abrégés de l'allemand de Joh. SCHMIDT avec catalogue supplémentaire par Albert FAUVEL. *Rev. Ent.*, 5 : 152-213.
- GRUARDET F., 1932. — Supplément au catalogue des Insectes Coléoptères de la forêt de Fontainebleau. *Travaux des Naturalistes de la Vallée du Loing*, 6 : 127-157.
- LUIGIONI P., 1929. — I Coleotterie d'Italia. *Memorie della Pont. Accademia delle Scienze. I Nuovi Lincei*, II, XIII : 1160 p. (Histeridae : 357-369).
- NORMAND H., 1904. — La chasse aux Coléoptères hypogés dans les Albères (suite et fin). *L'Echange*, 238 : 76-79.
- SECO M., 1989. — Sur la capture de quelques Histeridae de la faune française (Col.). *L'Entomologiste*, 45 (3) : 165-167.
- SECO M. et B., 1990. — Présence d'une quatrième espèce d'*Abraeus* Leach pour la faune française (Col. Histeridae). *L'Entomologiste*, 46 (1) : 17-21.
- SECO M. et B., 1992 a. — Contribution à la connaissance des Coléoptères du Lot et des causses du Quercy. II - Histeridae. *L'Entomologiste*, 48 (1) : 19-28.
- SECO M. et B., 1992 b. — Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française (Col.). (2<sup>e</sup> Note). *L'Entomologiste*, 48 (4) : 203-207.