

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

Année 1870-71.

—
(NOUVELLE SÉRIE)
—

TOME DIX-HUITIÈME

PARIS

F. SAVY, LIBRAIRE

Rue Hautefeuille, 24

31 Janvier 1872

DESCRIPTION

D'UNE

ESPÈCE NOUVELLE DE COCCINELLIDE

Par E. MULSANT et GODART

Lue à la Société linnéenne de Lyon, le 12 avril 1869

Hyperapis Teinturieri.

Ovalaire. Prothorax et élytres noirs : le premier, parfois sans tache, ou paré sur les côtés d'une étroite bordure d'un rouge testacé rétrécie d'avant en arrière (♀), ou paré d'une bordure jaune en devant et sur les côtés : l'antérieure, étroite : chacune des latérales liée à l'antérieure, ne dépassant pas la moitié interne de l'œil, plus étroite dans son centre qu'à ses extrémités. Élytres sans taches. Dessous du corps et pieds noirs extrémité des tibias et tarses d'un rouge flave.

Long. 0^m,0027 à 0^m,0030 (1 l. 1/4 à 1 l. 1/3. — Larg. 0^m,0022 (1 l.).

♂ Tête jaune. Prothorax paré en devant d'une étroite bordure jaune.

♀ Tête noire, Prothorax noir en devant.

Corps ovalaire ; médiocrement convexe ; moins finement ponctué sur les élytres que sur le prothorax ; d'un noir luisant, en dessus. Antennes d'un rouge jaune. Prothorax rayé au devant de la base d'une ligne légère ; un peu tronqué au devant de l'écusson ; entièrement noir ou paré sur les côtés d'une bordure d'un rouge testacé, ne dépassant pas en devant le tiers extérieur de l'œil, rétréci d'avant en arrière (♀), ou paré en devant et sur les côtés d'une bordure jaune : l'antérieure

étroite : chacune des latérales liée à la bordure antérieure, ne dépassant pas la moitié externe de l'œil, soit échancrée en arc tourné en dehors à son bord interne, soit dilatée en forme de dent à ses extrémités. *Écusson* en triangle subéquilatéral, noir. *Élytres* entièrement noires (♀), ou parées d'une petite tache humérale jaune (♂). *Dessous du corps* noir; ponctué, peu pubescent. *Pieds* noirs : extrémité des tibias et tarses d'un rouge flave.

Patrie : Biskra (Algérie).

Découverte par M. le docteur Teinturier à qui nous l'avons dédiée.

Obs. Elle se distingue des espèces voisines par son corps en ovale moins court ou plus allongé ; par l'étroitesse des bandes jaunes antérieures et latérales du prothorax, chez le ♂, etc.