
BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

Coléoptères de l'Ardèche

Deuxième supplément à l'inventaire de J. Balazuc (1984)

Henri-Pierre Aberlenc

*CIRAD, Laboratoire de Faunistique et de Taxonomie,
B.P. 5035, F - 34032 Montpellier Cedex 1*

Résumé. - Nouvelles corrections et additions à l'inventaire des Coléoptères du département de l'Ardèche (*Supp. Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1984, 53, 334 pp.*). Le recensement s'accroît de 2645 à 2857 espèces.

Mots-clés. - Ardèche, inventaire faunistique, répartition géographique, Coléoptères.

Coleoptera of Ardèche (France)

Second supplement to J. Balazuc's inventory (1984)

Summary. - New corrections and additions to the Ardèche Coleoptera inventory (*Supp. Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1984, 52, 334 pp.*). The census grows from 2645 to 2857 species.

Key words. - Ardèche, faunistic inventory, geographic distribution, Coleoptera.

A la mémoire d'un grand Naturaliste

Onze années ont passé depuis la publication des *Coléoptères de l'Ardèche* du Dr. Jean BALAZUC (1984). Il nous a quittés voici deux ans, laissant un vide douloureux dans le cœur de ses proches (ABERLENC, 1994 ; 1995). Nous lui dédions cette publication, en affectueux témoignage de notre estime pour l'Homme et de notre admiration pour son œuvre de Médecin, de Tératologiste, de Biospéologue, de Zoologiste, d'Entomologiste et de Mycologue.

Les notes relatives à nos propres observations et à celles de Collègues toujours plus nombreux se sont accumulées au fil des ans. Il était devenu indispensable de dresser le bilan des données nouvelles et de présenter un *Deuxième supplément aux Coléoptères de l'Ardèche*, neuf ans après le *Premier supplément* (ABERLENC, 1987).

Accepté pour publication le 21 décembre 1995

Des espèces nouvelles pour l'Ardèche ou pour la Science ont été découvertes et d'autres le seront certainement dans les années à venir : en déduire que la situation n'est pas inquiétante serait pourtant une grave erreur de perspective. En effet, il demeure que globalement la faune se raréfie et s'appauvrit dramatiquement d'année en année : pollutions de toutes sortes, éclairages toujours plus nombreux qui exterminent les insectes nocturnes, urbanisation, amélioration du réseau routier, prolifération des activités ludiques en montagne (sports d'hiver, véhicules tout terrain) et sur les rives des cours d'eau (campings, golfs, etc.). Par exemple, à Vallon-Pont-d'Arc, qu'est devenue la faune des bords de l'Ardèche après le passage des bulldozers, l'implantation massive des campings, le piétinement, la pollution de l'eau ? Quelle terrible banalisation, quelle uniformisation des biotopes !

La présente synthèse recense 7 suppressions, 30 confirmations et 189 nouveautés. L'inventaire des Coléoptères ardéchois passe de 2645 à 2857 espèces, ce qui est certainement encore très inférieur à la réalité. Approximativement 9500 espèces de Coléoptères vivaient en France (MARTINEZ, 1996) : celles qui sont actuellement recensées en Ardèche représenteraient donc 30 % de la faune française totale !

De nombreux groupes ne sont que très partiellement recensés et doivent réserver encore d'heureuses surprises : la faune aquatique, les endogés, les Staphylinidae, les Pselaphidae, les phytophages en général (Bruchidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Scolytidae...), les Elateridae, les Tenebrionidae, les Melyridae, les Colydiidae, les Silvanidae et Cucujidae, etc.

Nous remercions vivement pour leur collaboration les Collègues qui nous ont fait des remarques sur la nomenclature, ont collecté et (ou) identifié du matériel et nous ont transmis la substantifique moelle de leur patient et fructueux labeur. Ils sont désignés par leurs initiales, **chacun assumant la responsabilité de ses informations** :

H.-P. ABERLENC (H.P.A.), R. ALLEMAND (R.A.), A. ARTÉRO (A.A.), J. BALAZUC (J.B., *in memoriam*), F. BAMEUL (F.B.), J. BARAUD (J.BD., *in memoriam*), C. BESUCHET (C.B.), P. BONNEAU (P.B.), J.-C. BOURDONNÉ (J.C.B.), C. BOUYON (C.B.), H.J. CALLOT (H.J.C.), L. CASSET (L.C.), J.-M. CHAMPANHET (J.M.C.), A. CHAMINADE (A.C.), J. CHASSAIN (J.CS.), G. COLLOMB (G.C.), R. CONSTANTIN (R.C.), J. COULON (J.C.), S. DOGUET (S.D.), L. DIECKMANN (L.D.), P. DROUIN (P.D.), C. DUFAY (C.D.), C. DUVERGER (C.DR.), J.-M. EHRET (J.M.E.), H. FONGOND (H.F., *in memoriam*), A. FOUCART (A.F.), P. GUÉRARD (P.G.), J. JULIEN (J.J.), J. LAMBELET (J.L.), P. LEBLANC (P.LB.), P. LECLERC (P.L.), J.-C. LECOQ (J.C.L.), G. LEMPÉRIÈRE (G.LE.), L. LESEIGNEUR (L.L.), G. LISKENNE (G.L.), F. MARION (F.M.), Mme F. MARION (Me.F.M.), A. MATOCQ (A.M.), F. MATT (F.MT.) J. MESSUTAT (J.MT.), J. MOULIN (J.M.), L. PÉLISSIER (L.P., *in memoriam*), J.F. PERRIN (J.F.P.), J.L. POIRIER (J.L.P.), P. PONEL (P.P.), L. RATEL (L.R.), P. RÉVEILLET (P.R.), P. RICHOUX (Ph.R.), J. ROGÉ (J.R.), P. SAGNES (P.S.), L. SCHAEFER (L.S., *in memoriam*), M. SECQ (M.S.), F. SOLDATI (F.S.), J. SOLDATI (J.S.), J. SUDRE (J.S.), R. VINCENT (R.V.), F. VOISIN (F.V.), P. ZAGATTI (P.Z.).

Les patronymes écrits en entier et suivis d'une date, le plus souvent placés entre parenthèses, renvoient aux références bibliographiques. L'abondance des informations que notre Collègue J. MOULIN nous a transmises ou a publiées nous contraint à en inclure la plus grande partie dans un troisième supplément, pour ne pas alourdir au-delà du raisonnable le présent travail.

Soucieux de maintenir une unité, nous avons adopté pour le présent travail une présentation et des conventions presque semblables à celles du *Premier supplément* :

— Des crochets encadrent les citations relatives aux départements voisins de l'Ardèche : [].

— Les espèces nouvelles pour la faune de l'Ardèche sont signalées par un simple astérisque : (*).

— Les espèces citées précédemment entre crochets et dont la présence en Ardèche est confirmée sont signalées par un double astérisque : (**).

— Les espèces dont la présence en Ardèche était probable et a été confirmée sont signalées par un triple astérisque : (***) .

— Les espèces à rayer de l'inventaire sont signalées par un tiret : (—).

— Nous ne mentionnons des espèces déjà citées que si l'information présente un réel intérêt.

— La pagination mentionnée en **caractères gras** est celle des *Coléoptères de l'Ardèche* de J. BALAZUC, à l'exception de la partie Chrysomelidae où la pagination est celle de la liste des espèces de notre *Premier supplément*.

La diatomite de la Montagne d'Andance à Saint Bauzile, près de Privas (ne pas confondre avec Andance au nord du département), est riche en insectes fossiles qui sont l'objet de nombreux travaux. RIOU (1988) puis MEIN *et al.* (1983) ont publié des études sur ce gisement. En raison de leur grand intérêt, une bibliographie spéciale, à la fin du présent article, recense ces publications.

Puisse ce *Second supplément* stimuler de nouvelles recherches sur une région bien attachante qui nous réserve encore d'excellentes nouveautés tant paléo que néo-entomologiques. Nous renouvelons ici notre appel à tous les Collègues¹.

1. - N'hésitez pas à nous informer avec concision de vos découvertes les plus intéressantes (espèces nouvelles pour l'Ardèche ou remarquables à divers points de vue, confirmations, observations originales, etc.) et à nous signaler toute erreur éventuelle relevée dans le présent travail ou les travaux antérieurs.

Nous ne méprisons aucunement la bonne vieille méthode du stylo et de la feuille de papier, mais la saisie de votre prose en traitement de texte, surtout si elle couvre plusieurs pages, serait pour nous une aide précieuse ! (Word Perfect, sans changements de police de caractères en cours de texte). Nous aimerions publier désormais des suppléments plus fréquents et moins volumineux (le troisième est déjà en chantier !).

Une liste complète des espèces connues de Coléoptères de l'Ardèche, saisie en traitement de texte (Word Perfect) et réactualisée en permanence sera très prochainement disponible. Une disquette pourra être envoyée à ceux qui en feront la demande dès que nous l'aurons annoncé dans le Bulletin.

ADEPHAGA

CARABIDAE

Page 41 :

Chaetocarabus intricatus (L., 1761). - Talencieux. Annonay (J.L.P.).

Page 42 :

Chrysocarabus hispanus (F., 1792). - Veyrines. Talencieux. Vaudevant. Roiffieux. Sarras (J.L.P.).

Page 43 :

C. auronitens (F., 1792). - Veyrines. Saint Alban d'Ay (J.L.P.).

NEBRIIDAE

Page 44 :

Le genre *Leistus* est de Froehlig et non de Fröhlich.

Page 45 :

Nebria psammodes (Rossi, 1792). - Vallon-Pont-d'Arc : détritits d'inondations de l'Ardèche au confluent du Tioure, un exemplaire le 24 septembre 1994 (H.P.A.).

ELAPHRIDAE

Page 48 :

(* *Elaphrus riparius* Linné, 1758. - Montpezat : Lac Ferrand, le 2 août 1992 (J.B. et H.P.A.).

E. cupreus Duftschmidt, 1813. - Montpezat : Lac Ferrand, le 30 août 1992 (J.B. et H.P.A.).

CICINDELIDAE

Lophyra flexuosa (F., 1787). - Chandolas : vallée du Chassezac, un exemplaire sur un banc de sable le 5 juillet 1993 (P.G.).

TRECHIDAE

Page 56 :

Anillus cebennicus Balazuc et Bruneau de Miré, 1963. - Salavas : Bois des Bruyères : Cascade de Font-Garnide, lavage de terre le 10 avril 1990 (J.B.).

Page 57 :

Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822). - Forêt de Chap del Bosc, dans la litière, le 29 juin 1988 (J.B.).

Page 59 :

(* *Trepanes doris* (Panzer, 1797). - Montpezat : Lac Ferrand, le 30 août 1992. Localité intéressante, car il s'agit d'une espèce septentrionale et montagnarde. [Egalement au Mont Lozère, à la tourbière de la Croix de Maître Vidal] (J.B.).

Page 60 :

(*) *Ocydromus (Periphus) geniculatus* Heer, 1837. - Vernoux (J.MT). Borée (1350 m), suintement au pied d'un talus, le 5 juillet 1986 (H.J.C.).

Page 61 :

Ocydromus (Peryphus) bugnioni (K. Daniel, 1902). - Ardoix (près de Satillieu), les 16-17 août 1990 (Me.F.M.).

O. (P.) andreae (F., 1787). - Ardoix (près de Satillieu), les 16-17 août 1990 (Me.F.M.).

O. (s. str.) decorus (Zenker, 1801). - Ardoix (près de Satillieu), les 16-17 août 1990 (Me.F.M.).

Page 63 :

(*) *Metallina properans* (Stephens, 1828). - Saint-Laurent. Saint-Just (J.MT).

(*) *Asaphidion flavipes* (L., 1761). - Grospierres : bord du Chassezac, un mâle fin juin 1988. Identification confirmée par dissection (J.C.).

(*) *A. stierlini* (Heyden, 1880). - Grospierres : bord du Chassezac, deux exemplaires fin juin 1988 (J.C.).

A. curtum (Heyden, 1870). - Grospierres. Saint Just. Vallon-Pont-d'Arc (COULON, 1992).

PTEROSTICHIDAE

Page 64 :

Le genre *Astigis* Rambur, 1838 remplace *Abacetus*.

Page 66 :

Platysma (P.) nigrita (F., 1792). - Ardoix (près de Satillieu), les 16-17 août 1990 (Me.F.M.).

Le genre *Steropus* est de Dejean, 1821 et non de Stephens.

Page 67 :

(*) *Steropus (Steropidius) validus* Dejean, 1828 est une bonne espèce et non une simple variété du *S. madidus* (JEANNE, 1989).

Page 69 :

Calathus (s. str.) ambiguus (Paykull, 1790 et non 1970 !).

Page 72 :

Agonum nigrum Dejean, 1828. - Forêt de Chap del Bosc : point d'eau Méry, le 18 juillet 1993 (J.B. et H.P.A.).

Page 73 :

(**) *Amara similata* (Gyllenhal, 1810). - Saint Laurent (J.MT.).

Page 76 :

(**) *Ophonus (s. str.) subquadratus* (Dejean, 1829). - Forme *meridionalis* (Dejean, 1829) à Lablachère, le 12 avril 1982. Saint-Alban-sous-Sampzon : bord du Chassezac, le 12 avril 1982 (G.L.).

O. (Metophonus) schaubergerianus Puel, 1937. - Lagorce, le 5 juillet 1988 (G.L.).

O. (M.) puncticollis (Paykull, 1798). - Ardoix (près de Satillieu), les 16-17 août 1990 (Me.F.M.). Labeaume, à la lampe U.V., le 17 juillet 1991 (J.B.).

Page 77

O. (Pseudophonus) rufipes (De Geer, 1774). - Ardoix (près de Satillieux), les 16-17 août 1990 (Me.F.M.).

HARPALIDAE

Page 78 :

Harpalus quadripunctatus Dejean, 1829. - Forêt de Chap del Bosc, sous la mousse, le 9 septembre 1987. Très rare : espèce montagnarde. (J.B. leg., H.F. det.).

H. fuscipalpis Sturm, 1818. - Ardoix (près de Satillieu), les 16-17 août 1990 (Me.F.M.).

Page 79 :

(—) *H. impressipennis* est en réalité synonyme de *H. decipiens* (JEANNE, 1988) (voir le Premier supplément, page 323).

Egadroma marginatum (Dejean, 1829). - Saint-Just, le 31 juillet 1986 (QUENEY, 1988) et fin mai 1991 (J.C.).

Page 80 :

Acupalpus dubius Schilsky, 1888. - Vernoux (J.MT.).

PANAGAEIDAE

Page 81 :

Panagaeus crux-major (L., 1758). - Vernoux (J.MT.).

LEBIIDAE

Page 83 :

Lebia marginata (Fourcroy, 1785). - Vernoux (J.MT.).

Page 85 :

Dromius quadrimaculatus (L., 1758). - Forêt de l'Areilladou (1300 m), le 11 août 1991 (P.Z.).

Syntomus truncatellus (L., 1761). - Vernoux (J.MT.).

Page 86 :

(**) *Microlestes gallicus* Holdhaus, 1912. - Salavas : Bois des Bruyères, le 18 avril 1987 (G.L.).

Brachynus ganglbaueri Apfelbeck, 1904. - Vernoux (J.MT.).

HALIPLIDAE

Page 87 :

Peltodytes caesus (Duftschmidt, 1805). - Rochecolombe, le 21 juillet 1983 (J.B.).

P. rotundatus (Aubé, 1836). - Délaissées de l'Ardèche à Saint-Martin-d'Ardèche (Ph.R.).

NOTERIDAE

Page 88 :

Ajouter le genre *Noterus* Clairville, 1806 (après *Oreodytes*) :

(*) *N. clavicornis* (De Geer, 1774). - Marigots de Pradons, le 24 juin 1978 (J.B.).

DYTISCIDAE

Page 88 :

Bidessus minutissimus (Germar, 1824). - Ruoms : la Loubière, le 8 juillet 1989 (J.B.). Saint-Martin-d'Ardèche (Ph.R.).

Page 90 :

(*) *Hydroporus* (*s. str.*) *angustatus* Sturm, 1835. - Saint-Just, le 7 juillet 1962 (J.B.).

(*) *H.* (*s. str.*) *gyllenhali* (Schiodte, 1841) (= *piceus* Stephens). - Forêt de Chap del Bosc : mousses humides du point d'eau Méry, en août 1989, juillet-août 1991 et le 28 août 1994 (J.B. *leg.*, F.B. et P.L.B. *det.*).

(**) *H.* (*s. str.*) *discretus* Fairmaire, 1859. - Maison forestière de Chap del Bosc, le 29 juin 1988 (J.B. *leg.*, F.B. *det.*).

(**) *Graptodytes varius* (Aubé, 1836). - Lagorce : Sigaud, le 20 juin 1987 (A.F.).

Page 92 :

Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774). - Saint-Martin-d'Ardèche (Ph.R.).

Agabus (*Dichonectes*) *guttatus* (Paykull, 1798). - Maison forestière de Chap del Bosc, le 29 juin 1988 (J.B. *leg.*, F.B. *det.*).

A. (*Gaurodytes*) *bipustulatus* (L., 1767). - Maison forestière de Chap del Bosc, le 29 juin 1988 (J.B. *leg.*, F.B. *det.*).

Page 93 :

(*) *A.* (*G.*) *sturmi* Gyllenhal, 1808. - Saint-Agrève, le 14 août 1960 (J.B.). Antraigues : vallée de la Volane, le 9 septembre 1975 (J.B.). Forêt de Chap del Bosc : mousses humides du point d'eau Méry, en juillet-août 1991 (J.B. *leg.*, P.L.B. *det.*).

(**) *A.* (*G.*) *paludosus* (F., 1801). - Lagorce : vallée de l'Ibie, le 21 mai 1987 (A.F.).

A. (*G.*) *chalconotus* (Panzer, 1796). - Salavas : Bois des Bruyères, le 1er juillet 1963 (J.B.). Lagorce : Sigaud, le 20 juin 1987. Cette espèce n'était connue qu'en altitude (A.F.).

A. (*Agabynectes*) *didymus* (Olivier, 1795). - Desaignes, le 1er septembre 1960 (J.B.). Lagorce : vallée de l'Ibie, le 21 mai 1987 (A.F.).

(*) *Rhantus* (*s. str.*) *suturellus* Harris, 1848. - Saint-Alban-sous-Sampzon : le Bourbouillet, le 4 septembre 1963 (J.B.).

GYRINIDAE

Page 94 :

(*) *Gyrinus dejeani* Brullé, 1832. - Ruisseau de Naves, le 11 septembre 1989 (J.B. *leg.*, F.B. *det.*).

Gyrinus (*s. str.*) *colymbus* Erichson, 1847 et non 1837.

MYXOPHAGA

« Les Coléoptères sont actuellement divisés en quatre sous-ordres : Archostemata, Adephaga, Myxophaga et Polyphaga. Seuls les trois derniers sont représentés en France. Le sous-ordre des Myxophaga a été créé par CROWSON (1955) et comprend la famille des Hydroscaphidae, présente en Ardèche. Les termes Haplogastra et Heterogastra ne sont plus guère utilisés en tant que niveaux hiérarchiques fondamentaux » (Ph.R.).

HYDROSCAPHIDAE

Page 95 :

Hydroscapha granulum (Motschulsky, 1855). - RICHOUX et DOLÉDEC (1987) ont décrit la larve et fait d'intéressantes observations écologiques sur cette remarquable espèce aquatique. Elle vit dans des zones où le courant varie entre 30 cm et un mètre par seconde, avec des galets reposant sur un fond sablonneux.

POLYPHAGA

CATOPIDAE

Page 97 :

Bathysciola linderi (Abeille, 1875). - Rosières : Grotte du canal N° 1 (P.D.). Localité dans l'aire normale de répartition. [Gard, à Montclus : Grotte de Prével (P.D.)].

Page 101 :

Diaprysius serullazi Peyerimhoff, 1904. - Naves : Fontaine de Champclos, les 2 août 1991, 20 août 1993 et 26 novembre 1994 (H.P.A.).

Page 103 :

[*Diaprysius gezei* Jeannel, 1936. - CHAMPANHET (1987) a publié une mise au point sur la découverte de cette remarquable espèce dans le Gard (voir *Premier Supplément*, p. 325)].

HYDROSCAPHIDAE

Page 109 :

Famille transférée **page 95**.

STAPHYLINIDAE

Page 110 :

Metopsia gallica Koch, 1938. - Grospierres : dans l'humus, le 18 juin 1988. Thines : lavage de bulbes d'Asphodèles, le 2 mai 1991 (J.B.).

(*) *Anthobium rectangulum* Fauvel, 1898. - Col de l'Escrinet, un exemplaire sur une ombelle, le 8 juillet 1985 (H.J.C.).

Omalius rugatum Rey, 1880. - Forêt de Chap del Bosc : point d'eau Méry, le 29 juillet 1990 (J.B. leg., J.C.L. det.).

Page 111 :

Ajouter le genre *Geodromicus* Redtenbacher, 1874 (après *Lesteva*) :

(*) *G. nigrita* Müller, 1888. - Forêt de Bonnefoy, un exemplaire au bord d'un ruisseau le 8 juillet 1985 (H.J.C.).

(*) *Anthophagus bicornis* Block, 1799. - Maison forestière de Chap del Bosc, au battage, le 29 juin 1988 (G.L.).

Page 112 :

Hadrognathus longipalpis (Mulsant et Rey, 1851). - Forêt de Chap del Bosc : point d'eau Méry, le 18 juillet 1992 (J.B. et H.P.A.).

Ajouter le genre *Coryphium* Stephens, 1832 (après *Hadrognathus*) :

(*) *C. angusticolle* Stephens, 1832. - Forêt de Chap del Bosc, dans des mousses ruisselantes, le 22 août 1988 (J.B. leg., J.C.L. det.)

Pages 113 et 331 :

Trogophloeus (Taenosoma) elongatulus Erichson, 1839. - Salavas : Bois des Bruyères, cascade de Font-Garnide, par lavage de terre, les 10 avril 1987 et 28 juin 1989 (J.B. leg., J.C.L. det.).

Page 114 :

Stenus comma Leconte, 1863 remplace *S. bipunctatus* (DAUPHIN, 1991).

(*) *S. jarrigei* Puthz, 1970. - Vallon-Pont-d'Arc (Collection générale du MNHN de Paris, ex coll. Jarrige, ex coll. Oberthur) (DAUPHIN, 1991).

Page 115 :

S. providus Erichson, 1839 remplace *S. rogeri*, nom sans valeur taxonomique (DAUPHIN, 1991).

Page 119 :

Lathrobium fulvipenne Gravenhorst, 1806. - Forêt de Bonnefoy, un exemplaire sous une pierre le 5 juillet 1986 (H.J.C.).

Page 120 :

Ajouter le genre *Pseudobium* Mulsant et Rey, 1877 (après *Lobrathium*) :

(*) *P. gridellii* Jarrige, 1947. - Valgorge (P.P.).

Page 121 :

Ajouter le genre *Leptotyphlus* Fauvel, 1874 (après *Baptolinus*) :

(*) *L. audrasi* Jarrige, 1949. - Découverte considérable : ce Staphylin endogé n'avait jamais été repris depuis sa découverte en 1948 ! Le type provient probablement d'Écully, près de Lyon, d'une station aujourd'hui très menacée par l'urbanisation (OROUSSET, 1994). Thines : lavage de bulbes d'Asphodèles, le 2 mai 1991 (trois mâles et une femelle) et le 24 avril 1993 (un exemplaire) ; le même jour, en lavant de la terre prélevée aux pieds des arbres (un exemplaire) (J.B. et H.P.A.). Nous remercions vivement notre Collègue J. OROUSSET, spécialiste de la faune endogée, pour sa collaboration.

Page 123 :

(**) *Philonthus cognatus* (Stephens, 1832). - Meysse, un exemplaire sous une pierre du lit du Lavézon, le 6 avril 1986 (H.J.C.).

Page 126 :

(*) *Pseudocypus cupreus* Rossi, 1849. - Sceautres, un exemplaire sous une pierre le 2 avril 1986 (H.J.C.).

Page 127 :

Quedius (Microsaurus) cruentus (Olivier, 1794). - Meyse, un exemplaire sur pommes de terre pourries, le 6 avril 1986 (H.J.C.).

Pages 133 et 136 :

Notre Collègue H.J. CALLOT nous signale un « solide pataquès » : « Deux espèces de *Leptusa [angusta* Aubé (= *pulchella* Mannerheim) et *difformis* (Mulsant et Rey)] apparaissent deux fois p. 133 et 136, tandis que deux espèces [*fumida* (Erichson) et *ruficollis* (Erichson)] devraient être déplacées de la p. 136 à la p. 133. Tout ceci est dû à des problèmes de synonymie, le même nom de *Sipalia* ayant été donné à deux genres de tribus différentes, *Leptusa* (Bolitocharini) et *Geostiba* (Callicerini) ». Il faut donc supprimer :

(—) *Sipalia difformis* (Mulsant et Rey).

(—) *S. pulchella* (Mannerheim) = *S. angusta* (Aubé).

Page 136 :

(*) *Atheta deformis* Kraatz, 1856. - Salavas : Bois des Bruyères, cascade de Font-Garnide, au lavage de terre, le 10 avril 1987 (J.B. leg., J.C.L. det.).

SILPHIDAE

Page 143 :

(*) *Necrophorus fossor* Erichson, 1837. - Vernoux (J.MT.).

PSELAPHIDAE

Page 146 :

Bythinus macropalpus Aubé, 1833. - Thines, par lavage de terre, un mâle le 1er mai 1992 (J.B. et H.P.A.).

Bryaxis pyrenaeus Saulcy, 1863. - Grospièrres : parc du Château de Bournet, dans l'humus, le 20 juin 1988 (J.B. leg., C.B. det.).

B. cebennicus (Jeannel, 1950). - Forêt de Chap del Bosc, litière de Hêtres, le 19 juin 1988 (J.B. leg., C.B. det.).

B. puncticollis (Denny, 1825). - Col de la Croix de Millet, le 29 avril 1984, une femelle (H.P.A. leg., C.B. det.). Forêt de Chap del Bosc, litière de Hêtres, le 19 juin 1988 (J.B. leg., C.B. det.). Forêt de Mazan, dans la litière, le 2 août 1992 (J.B.).

HISTERIDAE

Page 149 :

Le genre *Gnathoncus* est de Jacquelin-Duval et non de « Jacquelin du Val ».

Page 150 :

Plegaderus vulneratus (Panzer, 1797 et non 1792) (M.S.) (voir le *Premier supplément*).

Page 151 :

Saprinus subnitescens Bickardt, 1909. - Orgnac, le 18 juin 1980 (A.C., in GOMY, 1992).

S. tenuistrius sparsutus est de Solsky, 1876 et non de « Schilsky » (M.S.).

Paromalus parallelipipedus (Herbst, 1792). - Lamastre, le 25 septembre 1971 (A.M. in GOMY, 1992).

Page 152 :

Margarinotus (Stenister) obscurus (Kugelann, 1792) remplace *Paralister stercorarius* (M.S.).

Le *Paralister ventralis* variété *quatuordecimstriatus* du Bourbouillet est en réalité un *Atholus duodecimstriatus* (Schrank, 1781) (J.B.).

Le genre *Pactolinus* Motschulsky, 1860 remplace *Macrolister* (M.S.).

P. major (L., 1767 et non 1766) (M.S.).

Hister quadrimaculatus L., 1758. - Vallon-Pont-d'Arc, en juillet 1972 (H.P.A.). M. et B. SECQ (1994) citent les localités de Vallon-Pont-d'Arc (J.B.D.) et de Sainte-Marguerite-Lafigère (J.L.).

Page 153 :

H. unicolor Linné, 1758. - Lavillatte (J.L., cité par SECQ, 1994). Le Béage, le 18 août 1963 et Saint Cirgues en Montagne (et non Saint Aigues en Montagne), en août 1963 (R.V., in GOMY, 1992).

H. striola Sahlberg, 1819 et non 1834 (M.S.).

H. teter Truqui, 1852. - Chandolas, le 24 août 1979 (R.A., cité par SECQ, 1994).

H. uncinatus Illiger, 1807 et non 1792 (M.S.).

Ajouter le genre *Margarinotus* Marseul, 1853 (après *Hister*) :

(*) *M. (Promethister) marginatus* Erichson, 1834. - Touloud, sous une pierre, le 19 mars 1971 (R.A. leg., M.S. det.).

Le genre *Atholus* Thomson date de 1859 et non de 1862 (M.S.).

A. duodecimstriatus (Schrank, 1781 et non 1803). Bois de Païolive, le 25 juillet 1984 (P.B. in GOMY, 1992).

(*) *Platysoma (Eurylyster) minor* (Rossi, 1792) [= *frontale* (Paykull)]. - Saint-Etienne-de-Lugdarès, un exemplaire le 28 avril 1984 (J.L., cité par SECQ, 1991).

Page 154 :

(—) *P. (Cylyster) elongatum* (Thunberg, 1787) remplace *Cylyster oblongum*. La combinaison « *Platysoma oblongum* (F., 1792) » n'existe pas et les citations de Saint-Etienne-de-Lugdarès et de Labeaume se rapportent à *P. (C.) elongatum*. Brahic, nombreux individus sous écorces de Pins abattus, le 15 août 1993 (J.B. et H.P.A.).

HYDRAENIDAE

Pages 154 et 155 :

« Les Hydraenidae font partie des Staphylinoidea alors que les Hydrophilidae font partie des Hydrophiloidea » (Ph.R.) : famille transférée **page 143**.

Hydraena gracilis Germar, 1824. - L'Eyrieux, de Saint Agrève à Beauchastel (Ph.R.).

Page 155 :

(*) *Ochthebius (Asiobates) striatus* (Laporte de Castelnau, 1840). - Beaulieu : le Peyraou de Rouveyrols, le 14 septembre 1985. Salavas : Bois des Bruyères, cascade de Font-Garnide, une femelle le 28 juin 1989 (J.B. leg., F.B. det.).

HYDROPHILIDAE

(* *Helophorus (Rhopalelophorus) obscurus* Mulsant, 1844. - Tanargue, le 23 juillet 1985 (J.B. leg., F.B. det.).

H. (R. et non H.) griseus Herbst, 1793. - Salavas : Bois des Bruyères, cascade de Font-Garnide, une femelle le 28 juin 1989 (J.B. leg., F.B. det.).

Page 157 :

(* *Anacaena lutescens* (Stephens, 1829). - Forêt de Chap del Bosc : point d'eau Méry, dans des *Sphagnum*, le 27 août 1989 (J.B. leg., F.B. det.).

Laccobius (Microlaccobius) gracilis Motschulsky, 1855. - Labeaume : Chapias, dans un abreuvoir le 14 septembre 1988 (J.B. leg., F.B. det.).

(* *L. (Dimorpholaccobius) obscuratus* Rottenberg, 1874. - Maison forestière de Chap del Bosc (1100 m), dans un ruisseau, un mâle le 29 juin 1988 (J.B. leg., F.B. det.).

(* *L. (D.) sinuatus* Motschulsky, 1849. - Labeaume : Chapias, dans un abreuvoir le 14 septembre 1988 (J.B. leg., F.B. det.).

(* *L. (D.) atratus* Rottenberg, 1874. - Labeaume : Chapias, dans un abreuvoir le 14 septembre 1988. Maison forestière de Chap del Bosc (1100 m), dans un ruisseau, deux femelles le 29 juin 1988 (J.B. leg., F.B. det.).

(* *L. (D.) atrocephalus* Reitter, 1872 *subsp. ytenensis* Sharp, 1910. - Forêt de Chap del Bosc : point d'eau Méry, dans des *Sphagnum*, un mâle le 27 août 1989 (J.B. leg., F.B. det.).

LUCANIDAE

Page 158 :

Le genre *Sinodendron* est de Hellwig, 1792 et non de Fabricius.

S. cylindricum (L., 1758 *nec* 1735). - Col de Quatre Vios, dans du hêtre décomposé, en avril 1984 (H.J.C.).

Platycerus caraboides (L., 1758 et non 1735 !).

P. caprea (De Geer, 1774 et non 1781).

Dorcus parallelepipedus et non *parallelepipedus* (L., 1758 et non 1735 !).

Page 159 :

Lucanus cervus (L., 1758 et non 1735).

TROGIDAE

Page 161 :

Trox scaber (L., 1767). - Vernoux (J.MT.).

GEOTRUPIDAE

Typhaeus typhaeus (L., 1758). - Toissieux, le 20 juin 1990 (J.L.P.). Vernoux (J.MT.).

APHODIIDAE

Page 163 :

(*) *Aphodius (Agrilinus) ater* (De Geer, 1774). - Sceautes, dans du crottin de cheval, le 27 mars 1985. Berzème, dans des crottes de moutons, le 2 avril 1986 (H.J.C.).

(*) *A. (Melinopterus) sphacelatus* (Panzer, 1798). - Freyssenet en Coiron, dans des crottes de mouton, le 27 mars 1985 (H.J.C.).

A. (Plagiogonus) arenarius (Olivier, 1789). - Saint-Laurent-les-Bains : pont de Nicouveau. Thueyts (BOUYON, 1991).

A. (Agolius) abdominalis Bonelli *subsp. balazuci* Nicolas, 1971. - Forêt de l'Areilladou (1300 m), le 11 août 1991 (P.Z.). Borée : Forêt de Bonnefoy, le 23 juin 1980. Forêt de Mazan, le 9 juillet 1977. Cham de Cham Longe, en mai et juin (BOUYON, 1991).

(*) *A. (Limarus) zenkeri* Germar, 1813. - Mayres (520 m), dans la châtaigneraie où paissent les moutons, le 12 octobre 1985 (BOUYON, 1991).

A. (Emadus) quadriguttatus (Herbst, 1783). - Saint-Laurent-les-Bains : pont de Nicouveau, le 12 mai 1974. La Souche, les 14 avril 1974 et 7 mai 1977 (BOUYON, 1991).

Page 164 :

A. (Volinus) paykulli Bedel, 1907 et non 1908. - Lespéron, le 28 avril 1975 (BOUYON, 1991).

A. (V.) sticticus (Panzer, 1798). - Borne, le 5 mai 1974. Saint-Laurent-les-Bains : pont de Nicouveau. Mayres, le 12 octobre 1985. Thueyts, le 25 mai 1985 (BOUYON, 1991).

A. (V.) distinctus (Müller, 1776). - Saint-Laurent-les-Bains : pont de Nicouveau. Saint-Etienne-de-Lugdarès (et non Ludgares). Borne, le 12 juin 1975. Thueyts. Lespéron. Mayres, le 18 septembre 1985 (BOUYON, 1991).

(*) *A. (V.) melanostictus* Schmidt, 1840. - Saint-Etienne-de-Lugdarès (et non Ludgares). Borne. Mayres, le 19 avril 1975. Thueyts, le 9 avril 1977. Lespéron, le 28 avril 1975 (BOUYON, 1991).

Page 165 :

(*) *A. (Agrilinus) borealis* Gyllenhal, 1827. - Saint-Etienne-de-Lugdarès (et non Ludgares), bosquet de Pins sylvestres, un mâle dans du crottin de moutons le 3 août 1986 (BOUYON, 1991).

A. (Oromus) corvinus Erichson, 1848. - Saint-Etienne-de-Lugdarès (et non Ludgares), bosquet de Pins sylvestres, dans du crottin de moutons avec *A. borealis*, le 3 août 1986. Mayres (520m), dans la châtaigneraie où paissent les moutons, avec *A. zenkeri*, le 12 octobre 1985. Le-Cellier-du-Luc (et non Le-Cellier-le-Duc), le 12 novembre 1987 (BOUYON, 1991).

SCARABAEIDAE

Page 167 :

Scarabaeus laticollis L., 1767. - Un exemplaire au village de Balazuc le 1er mai 1988 (J.M.C.). Très intéressant : localité septentrionale remarquable.

Page 168 :

Bubas bubalus (Olivier, 1811). - Grospierres : la Font-Vive, dans du crottin de Cheval, le 2 avril 1989 (J.B.).

MELOLONTHIDAE

Page 174 :

Amphimallon solstitialis (L., 1758). - Lespéron, un mâle *ex larva* trouvée dans un sol sablonneux couvert de graminées, avec de nombreuses larves d'*Aphodius contaminatus* (C.B.).

(*) *A. ruficorne* (F., 1775). - Lagorce : la Fontaine du Cade, sept mâles et une femelle au vol entre 5 et 6 heures du matin (heure solaire), le 18 juin 1988 (A.F. *leg.*, J.B.D. *det.*).

Polyphylla fullo (L., 1758). - Saint-Marcel-les-Annonay, le 18 juillet 1988 (J.L.P.).

Page 176 :

Hoplia caerulea (Drury, 1773). - Grospierres, nombreux exemplaires (dont trois femelles) le 18 juin 1989 (excursion de la S.E.F.).

Hoplia christinae Baraud, 1967. - Vallée de l'Ibie, au vol autour des branches de *Salix* vers 10 heures solaires, le 19 juin 1988 (A.F.).

CETONIIDAE

Page 177 :

Valgus hemipterus (L., 1758). - Felines : la Remise, en souche le 4 février 1991. Davezieux : Chevenas, le 21 mai 1993 (J.L.P.).

Osmoderma eremitum (Scopoli, 1763) remplace *Osmoderma eremita* (TAUZIN, 1994a).

Page 178 :

Trichius rosaceus (Voet, 1769). - Arlebosc : vallée du Doux, le 21 juillet 1991. Saint Alban d'Ay, le 20 juin 1979. Annonay : Bois de l'Ane, le 13 juin 1993 (J.L.P.).

Gnorimus variabilis (L., 1758) remplace *G. octopunctatus*.

G. nobilis (L., 1758). - Forêt de Chap del Bosc, nombreux exemplaires le 18 juillet 1992 sur fleurs de Vérâtre (*Veratrum album* L., Liliaceae). Col des Quatre Vios, sur ombelle, le 5 juillet 1986 (H.J.C.).

Page 179 :

Liocola lugubris (Herbst, 1770). - Boucieux le Roi, le 28 août 1991 (J.L.P.). Saint-Etienne-de-Lugdarès : Bois du Bez (1200 m), dans la hêtraie-sapinière. Mayres, dans la châtaigneraie. Valgironne (C.B.).

Cetonischema aeruginosa (Drury, 1770). - Labeaume, au piège à vin, du 18 au 23 juin 1990 (J.B.). Barrage du Ternay, le 10 juillet 1991. Vernosc : vallée de la Cance, le 17 juillet 1986 (J.L.P.).

Eupotosia affinis (Andersch, 1797). - Thueyts, larves sous écorces de souches de Peupliers noirs, en compagnie de larves d'*Oryctes nasicornis*, émergences en septembre 1983 (C.B.).

E. mirifica (Mulsant, 1842). - TAUZIN (1991) a publié une synthèse sur le genre *Eupotosia* et a signalé (1994b) la capture au Bois de Païolive, en juillet 1993, d'un exemplaire de l'aberration *balcanica* Miksic.

Page 181 :

Netocia (Potosia) cuprea (F., 1775) *subsp. bourgini* (Ruter, 1967). - Les *cuprea* de la haute vallée de l'Allier (Saint-Etienne-de-Lugdarès et l'Espéron) sont des *bourgini* typiques, de taille plus petite qu'en basse Ardèche et à nombreuses taches blanches sur les élytres et parfois sur le pronotum. Dans la haute vallée de l'Ardèche (Thueyts, Mayres, Astet et Valgirone), les individus sont de plus grande taille et ont moins ou pas de taches blanches. Ces populations doivent être considérées comme des *bourgini* (C.B.).

N. (P.) fieberi (Kraatz, 1880). - Thines, sur des fleurs, une femelle le 2 juin 1991 (H.P.A.). Boulieu : Samoyas, le 30 août 1992 (J.L.P.). Mayres. Valgirone (C.B.).

LYCIDAE

Page 183 :

Ajouter le genre *Pyropterus* Mulsant, 1838 (après *Dictyopterus*) :

(*) *P. nigroruber* (De Geer, 1774) (= *affinis* Paykull, 1799). - Sanilhac : source de la Boucharade, le 18 juillet 1981 (J.B. leg., R.A. det.).

CANTHARIDAE

Page 184 :

Ajouter le genre *Metacantharis* Bourgeois, 1886 (après *Cantharis*) :

(*) *M. haemorrhoidalis* (F., 1792). - Maison forestière de Chap del Bosc, le 19 juin 1988 (J.B. leg., R.C. det.).

MELOIDAE

Cerocoma schaefferi (L., 1758). - Mézilhac : col des Quatre Vios (1100 m), le 13 août 1991 (P.Z.).

Page 185 :

Lytta vesicatoria (L., 1758). - Abondante à Saint-Vincent-de-Gras, début juillet 1991, sur des Frênes (BELIN, 1991).

Page 186 :

Ajouter le genre *Sitaris* Latreille, 1802 (après *Meloe*) :

(*) *S. muralis* (Förster, 1771). - Ardoix (près de Satillieu), les 16-17 août 1990 (Me.F.M.).

TENEBRIONIDAE

Dichillus minutus (Solier, 1838). - Atteint au Bourbouillet sa limite septentrionale de répartition en France (F.S., in collection P. GINDRE).

Asida (Polasida) sabulosa (Fueslin, 1775 et non Goeze).

Page 187 :

(*) *Asida (Polasida) sericea* (Olivier, 1795). - Forêt des Chambons, 1966 (J.B.) et Jaujac (J.L.).

A. (P.) jurinei Solier, 1836. - Grospierres : Voidon (P.L.), Vallon-Pont-d'Arc (H.P.A.).

Blaps gigas (L., 1767). - Bourg-Saint-Andéol est l'une des localités les plus septentrionales connues en France (F.S.).

B. mucronata Latreille, 1804. - Mézilhac : le Crouzet (950 m), les 6 et 10 août 1991 (P.Z.).

Page 188 :

Le genre *Gonocephalum* est de Solier, 1834 et non de Chevrolat (F.S.).

(*) *G. granulatum subsp. nigrum* Küster, 1854. - Saint-Alban-sous-Sampzon : le Bourbouillet, dans des débris végétaux accumulés à l'entrée d'une fourmilière, trois exemplaires en août 1974, qui furent cités par erreur sous le nom de *G. pygmaeum* dans les *Coléoptères de l'Ardèche*. Intéressante localité qui jalonne la limite septentrionale de répartition de cette espèce dans notre pays (H.P.A. leg., F.S. det.).

(*) *G. pusillum* (F., 1791). - Vernoux (J.MT.).

(*) *G. rusticum* (Olivier, 1811). - Vernoux (J.MT.).

Platydema europaeum Laporte de Castelnau et Brullé, 1831. - Capture intéressante, Bois du Laoul, champignon de souche de Pin, en 1991 (J.S.).

(*) *P. violaceum* (F., 1790). - Saint-Laurent-les-Bains (J.L.). Espèce sporadique mais largement répandue.

Page 189 :

Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797) remplace *A. piceus*. - Lagorce : la Fontaine du Cade, en litière de clapier de lapins, le 10 septembre 1988 (A.F.). Vernoux (J.MT.).

Ajouter le genre *Pentaphyllus* Latreille, 1829 (avant *Tribolium*) :

(*) *P. chrysomeloides* (Rossi, 1792). - Bois du Laoul, champignon de souche de Pin, en compagnie de *Platydema europaeum*, en 1991 (J.S.).

Le genre *Uloma* Latreille, 1829 remplace *Melasia* (F.S.).

Le genre *Corticeus* Piller et Mitterpacher, 1783 remplace *Hypophloeus* (F.S.).

Le genre *Menephilus* Mulsant date de 1854 et non de 1834 (F.S.).

Tenebrio molitor L., 1758. - Vallon-Pont-d'Arc et Salavas, vient aux lumières (H.P.A.).

Helops caeruleus (L., 1758). - Ardoix (près de Satillieu), le 10 avril 1979 (F.M.).

LAGRIIDAE (TENEBRIONIDAE LAGRIINAE)

Ce taxon est considéré par de nombreux auteurs comme une sous-famille des Tenebrionidae : à transférer de la **page 191** à la **page 190**.

Ajouter le genre *Agnathus* Germar (après *Lagria*) :

(*) *A. decoratus* Germar. - Vallon-Pont-d'Arc, détritus d'inondations de l'Ardèche, un exemplaire le 24 septembre 1994. Intéressante station d'une espèce rare (H.P.A.).

ALLECULIDAE

Page 190 :

(*) *Prionychus melanarius* (Germar, 1813). - Aubenas, le 18 juillet 1983 (G.L.).

Page 191 :

(*) *Isomira antennata* (Panzer). - Planzolles, sur genêts brûlés en plantation de Pins, le 8 mai 1992 (J.B.).

MELANDRYIDAE

Page 192 :

Ajouter le genre *Serropalpus* Hellenius, 1786 (après *Xylita*) :

(*) *S. barbatus* (Schaller, 1783). - Forêt de l'Areilladou (1300 m), sur coupe de *Picea*, le 12 août 1991 (P.Z.).

PYTHIDAE

(*) *Rhinosimus aeneus* (Olivier, 1807). - Labeaume, sur branche morte de Chêne, le 29 avril 1991 (J.B.).

RHIPIPHORIDAE

Page 198 :

Macrosiagon tricuspidatum (Lepechin, 1774). - Vallon-Pont-d'Arc : vallée de l'Ibie, sur *Echinops sphaerocephalus*, deux exemplaires en août 1974 (H.P.A.). Ces exemplaires ont été cités par erreur sous le nom de *M. ferrugineum flabellatum* dans les *Coléoptères de l'Ardèche*.

M. ferrugineum flabellatum (F., 1781 et non 1792).

(*) *Macrosiagon praeustum* (Gebler, 1830). - Tanargue, un exemplaire sur fleur de Sureau, le 23 juin 1991 (H.P.A.).

OEDEMERIDAE

Page 199 :

Oedemera flavipes (F., 1792). - Vernoux (J.MT.).

O. podagrariae (L., 1767). - Vernoux (J.MT.).

(*) *Ischnomera cinerascens* (Pandellé, 1867). - Forêt de Chap del Bosc, le 27 juin 1983 (J.B. leg., R.A. det.).

CLERIDAE

Page 200 :

Ajouter le genre *Denops* Fischer de Waldheim, 1829 (au début) :

(*) *D. albofasciatus* (Charpentier, 1825). - Vernoux (J.MT.). Chandolas : Serre de Bernard, le 27 décembre 1985, adultes en loge dans des branchettes de Figuier mort de trois centimètres de diamètre (G.C.).

Tillus unifasciatus (F., 1787). - Labeaume : Chapias, le 22 mai 1988 (J.F.P.).

Ajouter le genre *Tarsostenus* Spinola, 1844 (après *Trichodes*) :

(*) *T. univittatus* Rossi, 1792. - Vallon-Pont-d'Arc, au vol, le 8 juillet 1989 (J.B. leg., R.V. det.).

MELYRIDAE

Page 201 :

Charopus pallipes (Olivier, 1798). - Vernoux (J.MT.).

Axinotarsus marginalis (Laporte de Castelnau, 1840). - Vernoux (J.MT.).

Page 202 :

(—) Rayer *Malachius parilis* de l'inventaire : cette espèce n'est pas présente en France. La citation de BALAZUC se rapporte vraisemblablement à *M. arnaizi* (J.R.).

M. elegans (Olivier, 1790). - Maison forestière de Chap del Bosc, le 18 juillet 1988 (J.B. leg., R.C. det.). Vernoux (J.MT.).

(*) *M. ambiguus* Peyron, 1877. - Vernoux (J.MT.).

(*) *M. geniculatus* Germar, 1824. - Vernoux (J.MT.).

Page 203 :

M. bipustulatus (L., 1758). - Vernoux (J.MT.).

(*) *Dasytes subaeneus* Schönherr, 1817. - Tanargue, le 21 juillet 1980 (G.L.).

(*) *D. plumbeus* (Müller, 1776). - Col de l'Escrinet, sur une ombelle le 8 juillet 1985 (H.J.C.).

EUCNEMIDAE

Page 206 :

Ajouter le genre *Melasis* Olivier, 1790 (au début) :

(*) *M. buprestoides* (L., 1761). - Borne : Forêt des Chambons, nombreux exemplaires sur grumes de Hêtres présentes depuis deux ans, dans les fentes des extrémités, le 15 juin 1991 (C.B.).

(**) *Eucnemis capucina* Ahrens, 1812. - Thueyts, un mâle sur une branche d'un Pommier mort sur pied, le 5 juin 1990 (C.B.).

Ajouter le genre *Hypocoelus* Guérin, 1843 (après *Melasis*) :

(*) *H. cariniceps* (Reitter, 1902). - Mayres, sur Aulne glutineux, une femelle le 4 août 1989. Localité intéressante, car intermédiaire entre celles des Alpes (Isère) et celles du sud-ouest (Tarn) (C.B. in CHASSAIN, 1992a).

THROSCIDAE

Drapetes biguttatus (Piller et Mitterpacher, 1783). - Villeneuve-de-Berg : vallée de l'Ibie, sur Peuplier mort, le 25 juin 1988 (G.L.).

ELATERIDAE

Page 207 :

(*) *Ampedus (Brachygonus) bouyoni* Chassain, 1992. - Holotype mâle de Mayres, sur orme, dans un piège appâté par un mélange de vin, de bière et de sucre, le 17 août 1988. Allotype de Casteljau, au piège, le 8 juillet 1984. Deux autres femelles de la même localité, au piège à vin, le 16 août 1984. Espèce citée de la Drôme, du Gard et du Lot (CHASSAIN, 1992b).

(*) *A. (B.) megerlei* (Lacordaire, 1835). - Berrias et Casteljau, au piège, le 15 juillet 1984 (R.A.).

(*) *A. (B.) dubius* (Platia et Cate, 1990). - Les Ollières sur Eyrieux, à la lampe U.V., le 3 juin 1987 (P.S. et C.D. leg., R.A. det.).

(*) *A. nigerrimus* (Lacordaire, 1835). - Sainte-Marguerite-Lafigère, le 10 juin 1984. Thueyts, les 30 mai 1987 et le 16 mai 1989 sur Cerisier mort sur pied (C.B. leg., J.CS. det.). Vernoux (J.MT.).

A. balteatus (L., 1758). - Saint-Laurent-les-Bains : pont de Nicouleau, un mâle éclos le 15 mai 1984 d'un élevage de *Gnorimus variabilis* dans de la carie de Châtaignier (C.B.).

A. praeustus (F., 1792). - Borne, un mâle le 10 avril 1976. Sainte-Marguerite-Lafigère, un mâle le 22 mai 1983. Thueyts, un mâle le 8 avril 1991 d'un élevage de *Gnorimus variabilis* dans de la carie de Châtaignier (C.B.).

A. cardinalis (Schiödte, 1835). - Thueyts, le 19 mars 1990, élevage sur Peuplier noir (C.B.).

A. cinnabarinus (Eschscholtz, 1829). - Thueyts, sur fleurs de Fusain le 31 mai 1986 et sur Aubépine blanche en fleurs le 16 mai 1989 (C.B.).

(**) *A. sanguinolentus* (Schrank, 1776). - Thueyts, le 31 mai 1986 et le 29 avril 1988 (C.B.).

A. elongatulus (F., 1787). - Bois de Païolive, le 10 mai 1984. Thueyts. Sainte-Marguerite-Lafigère, le 9 juin 1984 (C.B.).

(*) *A. nigroflavus* (Goeze, 1777). - Thueyts, un mâle le 9 avril 1977 (C.B.).

Ajouter le genre *Ischnodes* Germar, 1844 (après *Ampedus*) :

(*) *I. sanguinicollis* (Panzer, 1793). - Vernoux (J.MT.), Toulaud (R.A.).

Page 208 :

Negastrius pulchellus (L., 1761). - Saint-Just : bord de l'Ardèche, avec *Egadroma marginatum*, fin mai 1991 (J.C.).

(*) *Cardiophorus vestigialis* Erichson, 1840. - Vernoux (J.MT.).

Page 209 :

Cardiophorus biguttatus (Olivier, 1790). - Planzolles, battage de Genêts brûlés, le 1er mai 1992 (J.B.).

C. nigerrimus Erichson, 1840. - Vernoux (J.MT.). Sainte-Marguerite-Lafigère, le 22 mai 1988 (C.B.).

Melanotus crassicollis (Erichson, 1841). - Vernoux (J.MT.). Sainte-Marguerite-Lafigère, le 22 mai 1988 (C.B.).

(*) *M. niger* (F., 1792). - Thueyts, un mâle sur une branche morte de Prunier, le 29 mai 1987 (C.B.).

Page 210 :

(*) *Stenagostus rufus* (De Geer, 1774). - Vernoux (J.MT.).

S. villosus (Fourcroy, 1785). - Mayres, le 14 août 1990 (C.B.).

(*) *Athous frigidus* Mulsant et Guillebeau, 1855. - Vernoux (J.MT.).

Page 211 :

A. chamboveti Mulsant et Godart, 1867. - Saint-Laurent-les-Bains, un exemplaire le 18 juin 1989 (J.B.).

(*) *A. puncticollis* Kiesenwetter, 1858. - Vernoux (J.MT.).

Page 213 :

Anostirus pseudosulphuripennis Binaghi, 1940. - Mayres, une femelle le 20 juin 1991 (C.B.).

Selatosomus amplicollis (Germar, 1843). - Freyssenet en Coiron, sous une pierre, le 14 avril 1981 (G.L.).

S. affinis (Paykull, 1800). - Forêt des Chambons, au vol par temps chaud, le 10 juillet 1986 (C.B.).

Prosternon tessellatum (L., 1758). - Vernoux (J.MT.).

Page 214 :

Ajouter le genre *Hypoganus* Kiesenwetter, 1858 (après *Prosternon*) :

(*) *H. cinctus* (Paykull, 1800). - Mayres, par battage de fleurs de Châtaignier, un mâle le 24 juillet 1987 (C.B.) et, dans la même localité, à Conge, le 3 mai 1989 (C.B. leg., J.CS. det.). Lac d'Issarlès (P.P.). Vernoux (J.M.T.).

Agriotes lineatus (L., 1767). - Vernoux (J.MT.).

A. pilosellus (Schönherr, 1817). - Vernoux (J.MT.).

BUPRESTIDAE

Page 215 :

Acmaeodera prunneri Gené, 1839. - Paiolive (BONNEAU, 1985). Présence de la forme type et de la forme *18-punctata* Gory à Casteljou en juillet (P.G. ; PAULIAN et CHAMINADE, 1985 ; F.MT.).

A. bipunctata (Olivier, 1790). - Vernoux (J.MT.).

Page 216 :

A. flavofasciata (Piller et Mitterpacher, 1783). - Vernoux (J.MT.).

Ptosima flavoguttata (Illiger, 1803). Vernosc : vallée de la Cance, le 1er juillet 1993 (J.L.P.). Grospierres : la Font-Vive, un exemplaire sur Ronce le 8 juillet 1987 (F.MT.). Sainte-Marguerite-Lafigère, sur branches mortes de Cerisier. Thueyts, sur Pruniers morts sur pied (C.B.).

Sphenoptera laportei Saunders, 1871. - Saint-Paul-le-Jeune, au fauchage, le 24 juillet 1987 (G.L.).

Capnodis tenebricosa (Olivier, 1790). - Aubenas, le 16 juillet 1986 (G.L.). Thueyts (C.B.).

Page 217 :

Ajouter le genre *Latipalpis* Solier, 1833 (avant *Dicerca*) :

(*) *L. plana* (Olivier, 1790). - Bois de Paiolive, mai 1990 (L.C.), Chandolas, au piège à vin sur *Quercus ilex*, un petit exemplaire le 25 juillet 1993 (H.P.A.) : stations parmi les plus septentrionales connues en France.

Dicerca aenea (L., 1761). - Vallon-Pont-d'Arc : les Mazes (J.L.P.).

D. alni (Fischer de Waldheim, 1824). - Barrage du Ternay, le 6 juillet 1990 (J.L.P.). Montselgues, sur Aulne glutineux, le 21 juin 1984. Thueyts, sur Prunier mort, le 19 juin 1992 (C.B.).

Le genre *Ovalisia* Kerremans, 1900 remplace *Scintillatrix*.

(*) *O. dives* (Guillebeau, 1889). - Lagorce : vallée de l'Ibie, sur *Salix*, en juin 1987 (CHAMPANHET, 1988).

O. mirifica (Mulsant, 1855). - Grospierres. Banne. Saint-Alban-sous-Sampzon : le Bourbouillet. Casteljau. Bois de Païolive. Vagnas. Sur Orme en compagnie de *Saperda punctata*, tout le mois de juillet 1987 (F.MT.). Astet, sur Orme coupé, le 24 juillet 1986. Mayres, le 6 août 1988 (C.B.).

O. festiva (L., 1767). - Davezieux : Chevenas, le 10 juillet 1990 (J.L.P.).

Eurythyrea micans (F., 1794). - Naves, un exemplaire le 31 juillet 1991 (H.P.A.)

Page 218 :

Ajouter le genre *Kisanthobia* De Marseul, 1865 (après *Buprestis*) :

(*) *K. ariasi* Robert, 1858. - Bois de Païolive, au piège à bière, un exemplaire le 2 juillet 1987 (F.MT.).

Melanophila picta (Pallas, 1773). - Colombier le Cardinal, le 7 juin 1993. Boucieu le Roi : vallée du Doux, en juin. Ardoix (près de Satillieu) : Fourany, en juillet (J.L.P.).

Phaenops cyanea (F., 1774). - Planzolles, juillet 1987 (F.MT.). Saint-Laurent-les-Bains (C.B.).

Page 219 :

Anthaxia millefolii polychloros Abeille, 1894. - Vernoux (J.MT.).

A. scutellaris Gené, 1839. - Saint-Montan, sur Composée, deux exemplaires le 3 juillet 1988 (G.L.).

A. manca (L., 1767). - Grospierres. Vagnas, sur Orme (F.MT.).

A. salicis (F., 1777). - Vernoux (J.MT.).

A. funerula (Illiger, 1813). - Aubenas, une femelle le 10 juillet 1989 (G.L.).

(*) *A. mendizabali* Cobos, 1965. - Vernoux (J.MT.). Bois de Païolive. Mayres. Sainte-Marguerite-Lafigère, au battage de branches mortes de Chêne vert tuées par *Coroebus*, le 16 mai 1991 (C.B.).

(**) *A. quadripunctata* (L., 1758). - Vernoux (J.MT.).

Page 220 :

(*) *Chrysobothris chrysostigma* (L., 1758). - Borne : Forêt des Chambons, Bois du Bouquet, sur baliveaux de Sapins (dans une coupe d'Epicéas), en juin 1991 (C.B.).

C. solieri Laporte de Castelnau et Gory, 1841. - Boulieu : Samoyas, le 6 juillet 1990 (J.L.P.).

(*) *Coroebus elatus* (F., 1787). - Lagorce : la Fontaine du Cade, assiette jaune, le 14 juin 1989 (A.F.). Sainte-Marguerite-Lafigère, les 22 mai et 30 juin 1982 (C.B.).

Page 221 :

Agrilus guerini Boisduval et Lacordaire, 1835. - Borne : Forêt des Chambons, au battage d'un Saule Marsault, une femelle le 15 juillet 1986 (C.B.).

A. ater (L., 1767). - Pont d'Ucel : le Lauzat, sur *Quercus*, une femelle le 18 juillet

1992. Capture remarquable, car cette espèce n'est citée que des Salicaceae. « XAMBEU avait déjà affirmé que cet *Agrilus* vivait sur le Chêne, mais BEDEL l'avait réfuté sans appel ! » (G.L.).

A. biguttatus (F., 1777). - Banne. Bois de Païolive. Vagnas (F.MT.). Vernoux (J.MT.).

A. angustulus (Illiger, 1803). - Loubaresse, sur grume de Hêtre (C.B.).

A. laticornis (Illiger, 1803). - Vernoux (J.MT.).

(*) *A. obscuricollis* Kiesenwetter, 1857. - Vernoux (J.MT.).

(*) *A. sulcicollis* Lacordaire, 1835. - Vernoux (J.MT.).

A. convexicollis Redtenbacher, 1849. - Vernoux (J.MT.).

A. graminis Laporte de Castelnau et Gory, 1837. - Vernoux (J.MT.). Forêt de Chap del Bosc, sur grume de Hêtre (C.B.).

A. cyanescens Ratzeburg, 1837. - Lagorce : la Fontaine du Cade, au battage de *Quercus pubescens* le 21 mai 1987 (A.F. leg., L.S. det.). Bois de Païolive, sur Chêne pubescent (C.B.).

(*) *A. suvorovi* Obenberger, 1935. - Très intéressant : les exemplaires de Mazan-l'Abbaye du 17 juin 1960, cités par erreur sous le nom d'*A. viridis*, appartiennent en fait à cette espèce longtemps méconnue et non encore citée du Massif central (J.B. leg., G.L. det.). Les autres localités mentionnées concernent réellement *A. viridis*.

A. angustulus (Illiger, 1803). - Villeneuve-de-Berg : vallée de l'Ibie, le 4 juillet 1984. Aubenas, sur *Quercus*, en juillet 1987. Lablachère et Saint-Montan, en juillet 1988 (G.L.). Loubaresse, sur grume de Hêtre (C.B.).

A. derasofasciatus Lacordaire, 1835. - Aubenas, commun sur Vigne sauvage, juillet 1988 (G.L.).

A. aurichalceus Redtenbacher, 1849 (variété *rubicola* Abeille). - Grospierres, sur Sorbier, le 21 juin 1988 (G.L.).

A. hastulifer Ratzeburg, 1839. - Aubenas, sur Chêne, du 12 au 20 juillet 1987 (G.L.). Lagorce : la Fontaine du Cade, sur *Quercus pubescens*, en compagnie de nombreux *Coroebus florentinus*, le 13 septembre 1987 (A.F. leg., L.S. det.).

(*) *A. betuleti* Ratzeburg, 1837. - Borée : Croix de Boutières (C.B.).

A. sinuatus (Olivier, 1790). - Lagorce : la Fontaine du Cade, un exemplaire le 22 juillet 1987 (A.F. leg., L.S. det.).

A. roscidus Kiesenwetter, 1857. - Aubenas, sur Cerisier, du 15 au 20 juillet 1987. Casteljou et Saint-Montan, en juillet 1988 (G.L.). Sainte-Marguerite-Lafigère (C.B.).

(*) *A. elegans* Mulsant et Rey, 1863. - Vernoux (J.MT.).

Page 222 :

(**) *A. hyperici* (Creutzer, 1799 et non 1899 !). - Saint-Alban-sous-Sampzon : le Bourbouillet, sur Millepertuis, le 6 août 1987 (L.P. et G.L.). Vernoux (J.MT.).

A. cinctus (Olivier, 1790). - Vernoux (J.MT.).

Paracylindromorphus subuliformis (Mannerheim, 1837). - Vernoux (J.MT.).

Page 223 :

Aphanisticus emarginatus (Olivier, 1792). - Vernoux (J.MT.). Sainte-Marguerite-Lafigère, le 9 juin 1984 (C.B.).

(*) *A. angustatus* Lucas, 1849. - Vernoux (J.MT.).

Trachys minutus (L., 1758). - Grospierres : la Font-Vive, un exemplaire le 8 juillet 1987 (F.M.T.). Forêt de Mazan, sur Noisetier, le 9 juillet 1977 (C.B.).

T. fabricii Schaefer, 1949. - Vallon-Pont-d'Arc. Meyres. Borne : Forêt des Chambons, Bois du Bouquet le 18 juin 1982 (C.B.).

Habroloma triangulare (Lacordaire, 1835). - Sainte-Marguerite-Lafigère, le 15 mai 1985. Thueyts, le 20 avril 1992 (C.B.).

BYRRHIDAE

Page 227 :

Le genre *Pedilophorus* Steffahn, 1842 remplace *Lamprobyrrhulus* (R.A.)

P. nitidus (Schaller, 1783 et non 1789). - Glun, le 9 mai 1976 (P.R. leg., R.A. det.).

(**) *Cytilus sericeus* (Förster, 1771). - Flanc est du Mont Mézenc à la Croix de Boutières, le 19 juillet 1980, dans les mousses d'un ruisseau. Col de la Chavade, au piège à vinaigre, le 9 juillet 1962 (J.B. leg., R.A. det.). Mézenc, le 25 juin 1984 (H.P.A. leg., R.A. det.).

Byrrhus (*B.*) *fasciatus* Förster, 1771. - Les localités du Mont Mézenc, du col de la Chavade, du Tanargue et de Lablachère citées dans les *Coléoptères de l'Ardèche* doivent être supprimées, car elles se rapportent en réalité à d'autres espèces énumérées ci-contre. Consulter la révision d'ALLEMAND (1989).

B. (*B.*) *pilula* (L., 1758). - Lablachère, le 17 mai 1981. Freyssenet, le 25 mai 1964 (J.B. leg., R.A. det.).

(**) *Byrrhus* (*B.*) *arietinus* Steffahn, 1843. - Tanargue : forêt des Chambons, le 9 avril 1962 (J.B. leg., R.A. det.). Les *arietinus* cités du Mont Mézenc par MANEVAL sont en fait des *fasciatus* (ALLEMAND, 1989).

B. (*Seminolus*) *glabratus* Heer, 1838 (= *ornatus*, contrairement à ce que nous affirmions dans le *Premier supplément*, page 332 !). Tanargue : forêt des Chambons, cinq exemplaires le 31 mai 1984. Forêt de Bauzon (J.B. leg., R.A. det.). Loubaresse (P.R. leg., R.A. det.). Dans l'humus et la mousse.

(—) *B.* (*S.*) *pyrenaeus* L. Dufour, 1834. - La citation de CLEU (Forêt des Chambons) concerne en réalité un mâle de *B. nigrosparsus*. Cette espèce doit donc pour l'instant être rayée de l'inventaire de la faune de l'Ardèche (R.A.). [Mont Lozère (J.B. leg., R.A. det.).]

(*) *B.* (*Pseudobyrrhus*) *nigrosparsus* Chevrolat, 1866. - Forêt des Chambons (H. CLEU, P.R. leg., R.A. det.).

DRYOPIDAE

Page 228 :

(*) *Dryops gracilis* (Karsch, 1881). - Saint-Alban-sous-Sampzon : le Bourbouillet, le 10 juin 1989 (J.B. leg., F.B. det.).

Helichus substriatus (Müller, 1821). - L'Eyrieux à Beauchastel. Saint-Martin-d'Ardèche (Ph.R.).

ELMIDAE

Stenelmis canaliculata (Gyllenhal, 1808). Saint-Martin-d'Ardèche. L'Eyrieux à Beauchastel (Ph.R.).

Elmis aenea (Ph. Müller, 1806). - Saint-Alban-sous-Sampzon : source du Bourbouillet, adultes (le 5 septembre 1993) et larves (le 22 mai 1994 et le 4 mars 1995) sous les pierres immergées. Nous l'avons observé dans ce biotope lors de chacune de nos visites, l'été, depuis 1972 jusqu'en juin 1988. Après les travaux de captage de la source, il disparut pendant quelques années, avant de réapparaître en 1993 (H.P.A. leg., Ph.R. det.). Vallon-Pont-d'Arc : source immédiatement en aval du Tiourre le 31 août 1988 (J.B.). L'Eyrieux à Beauchastel. Le Rhône à La Voulte (Ph.R.).

(*) *E. rioloides* (Kuwert, 1890). - Saint-Alban-sous-Sampzon : source du Bourbouillet, le 18 juin 1988. Cohabite avec l'espèce précédente (H.P.A. leg., F.B. det.).

Page 229 :

Esolus parallelepipedus (Müller, 1806). - Le Rhône au Pouzin (Ph.R.).

E. pygmaeus (Müller, 1821). - Le Rhône à sa confluence avec l'Ardèche (Ph.R.).

Oulimnius tuberculatus (Müller, 1806). - L'Eyrieux à Beauchastel. Le Rhône à sa confluence avec l'Ardèche. Saint-Martin-d'Ardèche (Ph.R.).

(*) *Limnius intermedius* Kuwert, 1890. - Le Rhône au Pouzin (Ph.R.).

COLYDIIDAE

Page 230 :

Ajouter le genre *Colydium* F., 1792 (au début) :

(*) *C. filiforme* F., 1792. - Casteljau, le 6 juillet 1989 (G.L.).

Ajouter le genre *Langelandia* Aubé, 1842 (après *Bitoma*) :

(*) *L. anophtalma* Aubé, 1842. - Grospierres : parc du Château de Bournet, tamisage d'humus le 18 juin 1989 (J.B.).

NITIDULIDAE

Page 233 :

(**) *Meligethes (Acanthogetes) solidus* Illiger, 1798. - Aubenas, le 7 juillet 1983. Lablachère, le 13 juillet 1984 (G.L.).

RHIZOPHAGIDAE

Page 235 :

(*) *Rhizophagus grandis* Gyllenhal, 1827. - Forêt de Lacham-Raphaël, introduit en octobre 1981 dans le cadre d'un programme de lutte biologique contre le *Dendroctonus micans* (consulter LEMPÉRIERE, 1984 ; 1988).

SILVANIDAE

Page 237 :

Ahasverus advena (Waltl, 1832). - Vallon-Pont-d'Arc, au vol le soir dans un

jardin, le 5 août 1995 (H.P.A.). Espèce cosmopolite, dans les denrées stockées trop humides. A été signalée aux U.S.A. dans des nids de *Polistes*.

EROTYLIDAE

Triplax melanocephala (Latreille, 1804). - Aubenas, le 11 juillet 1989 (G.L.).

LATHRIDIIDAE

Page 239 :

Dienerella clathrata (Mannerheim, 1844) remplace *Cartodere separanda* Reitter, 1887, cette dernière espèce n'existant pas en France métropolitaine (VINCENT, 1990 ; 1991).

COCCINELLIDAE

Page 241 :

Subcoccinella vingintiquatuorpunctata (L., 1758). - Vernoux (J.MT.).

Page 242 :

(*) *Hyperaspis duvergeri* Fürsch, 1985. - Vallon-Pont-d'Arc, le 20 avril 1974, deux exemplaires (R.A. leg., C.DR. det.).

Coccinula quatuordecimpustulata (L., 1758). - Vernoux (J.MT.).

Page 244 :

Adalia decempunctata (L., 1758). - Vernoux (J.MT.).

CHRYSOMELIDAE

Page 245 :

Rappel : la pagination des Chrysomelidae est celle de la liste de notre *Premier supplément* (ABERLENC, 1987).

Page 333 :

Donacia simplex F., 1775. - Lespéron, marais de Concoules (BOUYON, 1989).

(*) *D. bicolor* Zschach, 1788. - Lespéron : bords de l'Espezonnette, sur *Sparganium ramosum*. Sainte-Marguerite-Lafigère (BOUYON, 1989).

(*) *D. obscura* Gyllenhal, 1813. - Lespéron (BOUYON, 1989).

(*) *D. thalassina* Germar, 1811. - Lespéron (900 m), le 12 juillet 1975 (C.B. leg., J.C.B. det.). D'avril à juillet, sur *Carex sp.* (J.C.B.).

[*D. antiqua* Kunze, 1818. - Lozère : Auroux (1000 m), à 8 km à l'ouest des limites de l'Ardèche, le 8 juin 1976 (C.B. leg., J.C.B. det.). Mi-mars à mi-juin sur *Carex sp.* (J.C.B.).]

Page 334 :

Plateumaris sericea (L., 1761). - Lespéron. Lanarce : bords de l'Espezonnette (BOUYON, 1989).

P. discolor (Panzer, 1795). - Lespéron. Forêt de Mazan. Forêt de Bauzon. Borée (BOUYON, 1989). Borne. Le Bez (C.B.).

P. consimilis (Schrank, 1781). - Lespéron. Forêt de Mazan. Forêt de Bauzon. La Villatte (BOUYON, 1989).

P. affinis (Kunze, 1818). - Lespéron (BOUYON, 1989).

Les genres *Lema* et *Oulema* ont été intervertis dans la liste du *Premier supplément*. De plus, *Oulema* (s. str.) *gallaeciana* (Heyden, 1870) avait été par erreur remplacée par *O. lichenis*.

(*) *Labidostomis tridentata* (L., 1758) . - Forêt de Chap del Bosc, au battage, le 29 juin 1988 (G.L.).

L. pallidipennis Gebler, 1830. - Saint-Paul-le-Jeune : Sauvas, le 18 juin 1988 (J.B.).

Smaragdina (*Monrosia*) *aurita* (L., 1767). - Bois de Païolive, le 12 mai 1984 (C.B.).

(*) *S. (M.) salicina* (Scopoli, 1763) (= *S. cyanea*). - Sainte-Marguerite-Lafigère, un couple le 16 mai 1982 (C.B.).

Tituboea biguttata (Olivier, 1791). - Labeaume, le 1er août 1992 (J.B.).

Page 335 :

(*) *Cryptocephalus variegatus* F., 1781 et non *Cryptocephalus* ! - Vallée de l'Ïbie, le 8 mai 1989 (H.P.A. leg., J.C.B. det.).

(*) *C. carinthiacus* Suffrian, 1848. - Vernoux (J.MT.).

C. violaceus Laicharting, 1781. - Forêt de l'Areilladou (1300 m), le 14 août 1991 (P.Z.).

C. imperialis Laicharting, 1781. - Naves, le 28 août 1990 (J.B. leg., S.D. det.).

C. tetraspilus Suffrian, 1851. - Sainte-Marguerite-Lafigère. Bois de Païolive (C.B.).

C. sulphureus Olivier, 1808. - Villeneuve-de-Berg : vallée de l'Ïbie, le 16 juillet 1988 (G.L. leg., J.C.B. det.). Labeaume (J.MT.).

C. flavipes F., 1781. - Forêt de l'Areilladou (1300 m), le 11 août 1991.

C. chrysopus Gmelin, 1788. - Vernoux (J.MT.).

(*) *C. labiatus* (L., 1761). - Saint-Agrève (J.MT.).

Page 336 :

(**) *Pachybrachis picus* Weise, 1882. - Vernoux (J.MT.). Sainte-Marguerite-Lafigère, au battage de Chênes, le 29 mai 1982. Borne : Forêt des Chambons, Bois du Bouquet, le 18 juin 1982 (C.B.).

Le genre *Eumolpus* Illiger, 1798 remplace *Chrysochus*.

Timarcha goettingensis subsp. *cyanescens* Fairmaire, 1861. - Vernoux (J.MT.).

Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824). - Vallon-Pont-d'Arc, sur *Solanum dulcamara* L. (la Douce-amère), plusieurs exemplaires le 8 octobre 1994 (H.P.A.).

Chrysolina (s. str.) *staphylaea* (L., 1758) et non *staphylea*.

C. (Fastuolina) fastuosa et non *C. (Dlochrysa) fastuosa*.

(*) *C. (Erythrochrysa) polita* (L., 1758). - Lespéron : marais de Concoule, sur Menthe à longues feuilles (C.B.).

(*) *Chrysolina (Threnosoma) joliveti* Bechyné, 1950. - Lanas : les Gras, le 4 avril 1986 (A.A. leg., J.C.B. det.). De mai à octobre, sur *Laserpitium siler*, *L. gallicum* et *Seseli montanum* (J.C.B.).

[*C. (Chacoidea) interstincta* (Suffrian, 1851): - Existe en Lozère et dans le Gard. De fin avril à fin novembre, sur *Achillea odorata*, *A. millefolium* et *Anthemis arvensis* (J.C.B.).]

C. (C.) carnifex melanaria (Suffrian, 1851) et non *C. (C.) carnifex coerulescens* (J.C.B.).

(*) *C. (Allochrysolina) fuliginosa* (Olivier, 1807). - Lentillères (6 km à l'ouest d'Aubenas), le 22 avril 1992 (G.C.). [Barjac (Gard) : bords de la Cèze, le 1er juillet 1984, à 3 km au sud-est des limites de l'Ardèche (P.B.)]. Sainte-Marguerite-Lafigère, le 30 juin 1982 (C.B.). De la mi-juin à décembre, sur *Centaurea calcitrapa*, *paniculata*, *pectinata* et *collina* (J.C.B.).

[*C. (Minckia) rufoaenea* (Suffrian, 1851). - Auroux (Lozère), 8 km à l'ouest des limites de l'Ardèche, le 8 juin 1976 (C.B. leg., J.C.B. det.)]. De mai à novembre sur *Carum verticillatum*, dans les tourbières (J.C.B.).

C. (Hypericia) quadrigemina (Suffrian, 1851) et non *C. (H.) cuprina*. - Saint-Laurent-les-Bains : Notre-Dame-des-Neiges. Sainte-Marguerite-Lafigère, le 23 mai 1982. Bois de Païolive. [Pied-de-Borne (Lozère), le 16 juin 1980] (C.B.). De mai à novembre sur *Hypericum perforatum* (J.C.B.).

Oreina (Allorina) coerulea (Olivier, 1790) remplace *O. (A.) collucens* (et non *colluceus* !), laquelle est endémique des Alpes (J.C.B.).

O. (s. str.) speciosa (L., 1758) et non *gloriosa* (F., 1781). Voir BONTEMS, 1981.

O. (Chrysochloa) cacaliae (Schrank, 1785) : la sous-espèce *tussilaginis* est un endémique pyrénéen (J.C.B.).

Page 337 :

Hydrotassa (s. str.) hannoveriana et non *hanoverana*. [Plusieurs stations connues dans l'est des Pyrénées (J.C.B.)].

(*) *H. (s. str.) marginella* (L., 1758). - La Vilatte, sur Renoncule à feuilles d'aconit, le 13 juin 1975. Lanarce (C.B.).

H. (Agrostithassa) glabra (Herbst, 1783) et non *H. (s. str.) glabra* (J.C.B.).

Ajouter le genre *Neophaedon* Jacobson, 1901 (après *Phaedon*) :

(*) *N. pyritosus* (Rossi, 1792). - Casteljau, le 10 mai 1984 (C.B. det., J.C.B. det.). De mai à juillet, surtout sur *Ranunculus repens* (J.C.B.).

Plagioderma versicolora (Laicharting, 1781) et non *versicolor* Auct.

[*Chrysomela (Macrolina) lapponica* L., 1758. - Saint-Frézal-d'Albuges (Lozère) : source du Chassezac (à 11 km à l'ouest des limites de l'Ardèche), larves sur *Salix* aux environs du 10 août 1994, éclosion des adultes fin août 1994 (C.B.). De fin avril à fin août, sur *Salix caprea* et *nigricans* (J.C.B.)].

(*) *Gonioctena (s. str.) linnaeana* (Schrank, 1781). - Borne : Forêt des Chambons, sur Saule Marsault (*Salix caprea*, C.B.).

Lochmaea caprea (L., 1758) et non *capreae* Auct. (J.C.B.).

Page 338 :

(*) *Galeruca (s. str.) laticollis* Sahlberg, 1837. - Borée : rocher du Cruzet, larves au 4e stade sur *Trollius europaeus* en juin, élevées sur cette plante, éclosion des adultes le 15 juillet 1983. Forêt de Bauzon, larves au 4e stade sur *T. europaeus* en juin, élevées sur cette plante, éclosion des adultes le 3 juillet 1976. [Landos, en Lozère, à 9 km ouest-nord-ouest des limites du département de l'Ardèche, larves au 4e stade sur *T. europaeus*

en juin, élevées sur cette plante, éclosion des adultes le 3 juillet 1984] (C.B. *leg.*, J.C.B. *det.*). De la mi-juillet à fin août, sur *Aconitum napellus*, *Thalictrum flavum* et *Trollius europaeus* (J.C.B.).

(*) *G. (Emarhopa) rufa* Germar, 1824. - Mauves (près de Tournon), un exemplaire le 14 juillet 1917 et un autre le 14 mai 1919 (*in coll.* Société linnéenne de Lyon, voir BOURDONNÉ et MALDES, 1995).

Exosoma lusitanicum (L., 1767) et non *lusitanica* Auct.

(*) *Phyllotreta nodicornis* (Marsham, 1802). - Vernoux (J.MT.).

(*) *Aphthona violacea* (Koch, 1803). - Aubenas, le 10 avril 1982 (G.L.).

(*) *A. herbigrada* (Curtis, 1837). - Saint-Clément (J.MT.).

Page 339 :

(**) *Longitarsus atricillus* (L., 1761). - Vernoux. Saint-Clément (J.MT.).

(*) *L. echii* (Koch, 1803). - Saint-Marguerite-Lafigère, sur fleurs d'*Echium vulgare*, le 12 mai 1985. Thueys (C.B.).

(*) *L. obliteratoides* Gruev, 1975. - Vernoux (J.MT.).

(*) *Altica pusilla* Duftschmid, 1825. - Mézilhac (J.MT.).

(*) *Asioresta sublaevis* (Motschulsky, 1859). - Le Planial, le 12 août 1978 (C.B.).

(*) *Podagrica malvae* (Illiger, 1807) . - Villeneuve-de-Berg, le 14 juillet 1984. Saint-Paul-le-Jeune, le 24 juillet 1987 (G.L.). Vernoux (J.MT.).

(**) *Chaetocnema arida* Foudras, 1860. - Vernoux (J.MT.).

(*) *C. hortensis* (Geoffroy *apud* Fourcroy, 1785). - Vernoux (J.MT.).

Page 340 :

(*) *Sphaeroderma rubidum* (Graells, 1858). - Berrias : Jalès, le 4 juillet 1985 (G.L. *leg.*, S.D. *det.*). Vernoux (J.MT.). Sainte-Marguerite-Lafigère, le 22 septembre 1983 (C.B.).

(*) *Apteropeda orbiculata* (Marsham, 1802). - Sainte-Marguerite-Lafigère (C.B.).

(*) *Psylliodes cuprea* (Koch, 1803). - Vernoux (J.MT.).

(*) *P. chrysocephala* (L., 1758). - Sainte-Marguerite-Lafigère, le 22 juin 1977 (C.B.).

(*) *P. isatidis* Heikertinger, 1912. - Loubaresse, le 2 juillet 1992. Borne : Forêt des Chambons, Bois du Bouquet, le 22 juillet 1983 (C.B.).

(*) *P. napi* (F., 1792). - Grospierres (C.B.).

Cassida (Mionycha) margaritacea Schaller, 1783. - Privat. Vacheresse (J.MT.). Sainte-Marguerite-Lafigère. Thueys (C.B.).

(*) *C. (M.) flaveola* Thunberg, 1794. - Maison forestière de Chap del Bosc, le 16 août 1989 (H.J.C.).

C. (Hypocassida) meridionalis Suffrian, 1844. - Vernoux (J.MT.).

C. (s. str.) sanguinolenta O.F. Müller, 1776. - Vernoux (J.MT.).

C. (s. str.) prasina Illiger, 1798. - Vernoux (J.MT.).

(*) *C. (s. str.) vibex* L., 1767. - Sainte-Marguerite-Lafigère (C.B.).

(*) *C. (s. str.) pannonica* Suffrian, 1844. - Bois de Païolive, le 31 mai 1982 (C.B.).

(*) *C. (s. str.) denticollis* Suffrian, 1844. - Mayres. Borne : Forêt des Chambons. Borée. Forêt de Bonnefoy (C.B.).

(*) *C. (s. str.) inquinata* Brullé, 1832. - Sainte-Marguerite-Lafigère, le 30 juin 1982 (C.B.).

C. (s. str.) rubiginosa Müller, 1776. - Vernoux (J.MT.). Saint-Alban-la-Montagne, le 16 juin 1985, sur Cirse des marais (C.B.)

(*) *C. (s. str.) deflorata* Suffrian, 1844. - Casteljau (C.B.).

Page 341 :

Le texte du *Premier supplément* relatif à *Mantura chrysanthemi* a été dénaturé. Il fallait lire : « Maison forestière de Chap del Bosc, sur *Rumex acetosella*, le 20 juin 1985. Espèce assez rare (S.D.) ».

BRUCHIDAE

Page 263 :

Bruchidius murinus (Boheman, 1829). - Vernoux (J.MT.).

B. perparvulus (Boheman, 1839) (= *B. pygmaeus*). - Vernoux (J.MT.).

B. lividimanus (Gyllenhal, 1833). - Vernoux (J.MT.).

B. fasciatus (Olivier, 1795) (= *B. villosus* Bedel nec F.). - Vernoux (J.MT.).

CERAMBYCIDAE

Page 264 :

Prionus coriarius (L., 1758). - Labeaume, au piège lumineux, une femelle le 12 juillet 1991 (J.B.). Vernoux (J.MT.). Saint-Etienne-de-Lugdardès, au vol au crépuscule en août (C.B.). Boulieu, le 7 juillet 1979. Annonay, le 14 juillet 1979. Davezieu : Gourdan, le 2 septembre 1993 (J.L.P.).

Page 265 :

(**) *Rhamnusium bicolor* (Schrank, 1781). - Boulieu : Samoyas, le 30 juin 1980 (J.L.P.).

Page 266 :

(**) *Carilia virginea* (L., 1758). - Vernoux (J.MT.).

Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775). - Col de l'Escrinet (L.R.). Vernoux (J.MT.).

Page 267 :

Anoplodera sexguttata (F., 1775). - Torrenc, le 14 juin 1986 (J.L.P.).

Stictoleptura scutellata (F., 1781). - Bois de Païolive, au piège à vin, un exemplaire en juillet 1991. Localité surprenante, à basse altitude (J.C.).

Brachyleptura hybrida (Rey, 1885). - Col de la Croix de Bauzon, le 15 juillet 1987 (F.MT.).

Page 268 :

Leptura quadrifasciata (L., 1758). - Borne : Forêt des Chambons, sur fleurs d'Impératoire, le 10 juillet 1980. Forêt de Mazan, le 18 août 1980 (C.B.).

Page 270 :

Strangalia attenuata (L., 1758). - Bois de Païolive, au piège à bière, un exemplaire le 5 juillet 1987 (F.MT.).

Necydalis ulmi Chevrolat, 1838. - Labeaume, au piège à vin, un exemplaire, du 18 au 23 juin 1990 (J.B.). Païolive, au piège à vin, deux exemplaires en juillet 1991 (J.C.). Casteljau. Grospierres (F.MT.).

Arhopalus tristis (F., 1787). - Forêt de Chap del Bosc, sur Pins abattus, le 27 août 1989 (J.B. et P.R.). Localité montagnarde d'une espèce précédemment citée, en Ardèche, à basse altitude. Salavas (L.R.).

(*) *A. syriacus* (Reitter, 1895). - Saint-Marcel-les-Annonay : Chavanne, le 8 juillet 1980 (J.L.P.).

Page 271 :

(**) *Hesperophanes (s. str.) cinereus* (Villers, 1789). - Vallon-Pont-d'Arc, le 2 août 1984 (H.P.A.).

Gracilia minuta (F., 1781). - Labeaume, au piège Malaise, du 10 au 14 juillet 1988 (J.B.).

Ajouter le genre *Molorchus* F., 1792 (après *Nathrius*) :

(*) *M. minor* (L., 1758). - Saint-Julien-Vocance : vallée de la Cance, le 20 juin 1990 (J.L.P.).

Callimellum angulatum (Schrank, 1789). - Bois de Païolive, sur Chêne pubescent, le 10 mai 1984 (C.B.).

Ajouter le genre *Cartallum* Serville, 1834 (après *Callimellum*) :

(*) *C. ebulinum* (L., 1767). - Lagorce : la Fontaine du Cade, le 6 mai 1989 (A.F.). Villeneuve-de-Berg : vallée de l'Ibie, un exemplaire le 6 juin 1995 (G.L.).

Obrium cantharinum (L., 1767). - Vernoux (J.MT.).

Page 273 :

Purpuricenus globulicollis Mulsant, 1839. - Lablachère, en juillet 1986 (G.L.).

Rosalia alpina (L., 1758). - Bois de Païolive, un mâle le 17 août 1988 (J.M.C.). Localité remarquable, de basse altitude, bien évidemment sans aucun Hêtre.

Hylotrupes bajulus (L., 1758). - Mézilhac : le Crouzet (950 m), le 10 août 1991 (P.Z.).

Ajouter le genre *Semanotus* Mulsant, 1839 (après *Hylotrupes*) :

(*) *S. laurasi* (Lucas, 1852). - Lagorce : la Fontaine du Cade. Des galeries larvaires et de nombreux trous de sortie sur *Juniperus oxycedrus* lui sont attribuables. Il faudrait cependant que la capture de l'imago vienne confirmer la présente citation (A.F.).

Page 274 :

Ropalopus femoratus (L., 1758). - Vernoux (J.MT.). Thueyts, sur branches mortes d'un Pommier, le 29 mai 1987 (C.B.).

(*) *Phymatoderus lividus* (Rossi, 1794). - Sainte-Marguerite-Lafigère, sur des branches mortes de Chêne vert attaquées par des *Coroebus*, six exemplaires (C.B.).

Page 275 :

(*) *Xylotrechus arvicola* (Olivier, 1795). - Mézilhac : le Crouzet, 950 m., sur coupe de hêtres, le 12 août 1991 (P.Z.). Vernoux (J.MT.).

Clytus rhamni Germar, 1817. - Vernoux (J.MT.).

Pseudosphegistes cinereus (Laporte de Castelnau et Gory, 1836). - Forêt de Mazan (L.R.).

Page 276 :

Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763). - Forêt de Mazan (L.R.).

C. ruficornis (Olivier, 1781). - Bois de Paöolive, au piège à vin en juillet 1991 (J.C.).

Page 277 :

Dorcadion molitor (F., 1775). - Saint-Jean-de-Pourcharesse : Peyre, le 19 juin 1988 (J.B.).

Mesosa curculionoides (L., 1761). - Col du Fayet, le 3 juillet 1990 (J.L.P.).

Agapanthia dahli (Richter, 1821). - Toissieux, le 22 juin 1980 (J.L.P.).

A. kirbyi (Gyllenhal, 1817). - Sainte-Marguerite-Lafigère, le 19 juin 1988. Saint-Alban-sous-Sampzon : le Bourbouillet, un exemplaire le 18 juin 1989, trente ans après la première capture ! (L.L.).

Page 278 :

A. violacea (F., 1775). - Saint André en Vivarais, le 18 juin 1989 (J.L.P.).

Page 279 :

Parmena balteus (L., 1767). - Lamastre, le 16 juillet 1993 (J.L.P.). Thueyts, sur branche morte de Pommier (C.B.).

Lamia textor (L., 1758). - Thueyts, le 6 mai 1979 (C.B.).

Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795). - Saint-Jean-de-Pourcharesse, dans un tas de bûches de Pin, une série d'exemplaires le 18 juin 1989 (J.B.). Planzolles, à la face inférieure de troncs de Pins abattus, assez nombreux exemplaires, souvent accouplés, le 18 août 1991 (J.B. et P.R.).

Eupogonocherus hispidus (L., 1758). - Labeaume, le 13 juin 1989, un exemplaire mort (J.B. leg., H.P.A. det.). Mayres. Thueyts. Montselgues. Sainte-Marguerite-Lafigère. Sur les branches mortes de Pommiers et de Cerisier (C.B.).

Page 280 :

Anaesthetis testacea (F., 1781). - Aubenas, en juillet 1986 et 1987 (G.L.). Mayres, sur branchettes mortes de Chataîgniers et Chênes (C.B.).

Acanthocinus aedilis (L., 1758). - Annonay, le 15 septembre 1988 (J.L.P.). Brahic, sous écorces de troncs coupés de *Pinus*, un couple fraîchement éclos et un couple *ex pupa*, le 15 août 1993 (J.B. et H.P.A.).

Acanthocinus griseus (F., 1792). - Boulieu : Samoyas, le 12 juillet 1986 (J.L.P.). Forêt de Mazan (L.R.).

(*) *Exocentrus punctipennis* Mulsant et Guillebeau, 1856. - Davezieux : Bois de Gourdan, le 11 juin 1993 (J.L.P.). Casteljau, un exemplaire au vol près d'un Ormeau malade le 17 juillet 1987 (F.MT.). Mayres, le 24 juillet 1986. Astet (C.B.).

Acanthoderes clavipes (Schränk, 1781). - Toissieux, le 16 juin 1980 (J.L.P.).

Tetrops praeusta (L., 1758). - Aubenas : Lazuel, au battage d'Aubépines, le 19 mai 1987 (A.F.). Vernoux (J.MT.).

Page 281 :

Anaerea carcharias (L., 1758). - Saint Cyr, le 27 juin 1990. Davezieux : Chevenas, le 2 septembre 1993 (J.L.P.).

A. similis (Laicharting, 1784). - Villeneuve-de-Berg : vallée de l'Ibie, sur Saule, le 25 juin 1988 (G.L.).

Saperda scalaris (L., 1758). - Forêt de Mazan (L.R.). Borne : Forêt des Chambons, sur grumes de Hêtres. Loubaresse : Forêt de Prataubérat, sur des *Sorbus aria* coupés. Col de Meyrand, sur grume de Hêtre. Forêt de Mazan, au battage de Noisetiers. Saint-Laurent-les-Bains. Thueyts, sur Pruniers morts sur pied (C.B.).

(*) *S. punctata* (L., 1767). - Saperde particulièrement abondante à Grospierres et à Banne. Saint-Alban-sous-Sampzon : le Bourbouillet. Casteljau. Bois de Païolive. Vagnas. Toujours en compagnie de *Ovalisia mirifica*, tout le mois de juillet 1987 (F.MT.). Mayres, sur Ormes le 6 août 1988. Aset, le 24 juillet 1986 (C.B.).

Page 282 :

Phytoecia icterica (Schaller, 1783). - Bois de Païolive, le 19 juin 1987 (C.B.).

(*) *P. nigricornis* (F., 1781). - Borne : Forêt des Chambons, Bois du Bouquet, sur Armoise commune, le 4 juillet 1986 (C.B.).

P. pustulata (Schrank, 1776). - Vernoux (J.MT.). Sainte-Marguerite-Lafigère. Thueyts (C.B.).

Oberea oculata (L., 1758). - Casteljau : bord du Chassezac, sur *Salix*, un couple le 20 juin 1993 (H.P.A.). Mayres, sur un Saule Marsault (*Salix caprea*) dans le lit de l'Ardèche, le 15 juillet 1986 (C.B.).

O. linearis (L., 1761). - Grospierres : ravin de Notre-Dame-des-Songes, le 18 juin 1988 (J.C.). Thueyts, sur Noyers et Noisetiers, le 19 juin 1992 (C.B.).

CURCULIONIDAE

Page 283 :

Otiorhynchus (*s. str.*) *fuscipes* (Olivier, 1807). - Flanc sud du Mont Mézenc (1500 m), le 10 août 1991 (P.Z.).

(*) *O. (s. str.) hungaricus* Germar, 1824. - Vernoux (J.MT.).

(*) *O. (Dorymerus) singularis* (L., 1767). - Montpezat : Lac Ferrand, le 30 août 1992 (J.B.).

Page 286 :

(*) *Trachyphloeus angustisetulus* Hansen, 1915. - Vernoux (J.MT.).

Page 287 :

Polydrusus (Metallites) marginatus Stephens, 1831. - Vernoux (J.MT.).

Barypeithes pellucidus (Boheman, 1834). - Vernoux (J.MT.).

Page 288 :

Strophosoma melanogrammus (Förster, 1771). - Flanc sud du Mont Mézenc (1500 m), le 10 août 1991 (P.Z.).

S. retusum (Marsham, 1802). - Vernoux (J.MT.).

Brachyderes incanus (L., 1758). - Planzolles : vers Peyre, dans des bourses de *Thaumetopoea pityocampa*, trois exemplaires le 8 mai 1992.

Page 289 :

(*) *Sitona intermedius* Küster, 1842. - Vernoux (J.MT.).

(*) *S. lividipes* Fähræus, 1840. - Vernoux (J.MT. *leg.*, L.D. *det.*).

S. sulcifrons (Thunberg, 1798). - Vernoux (J.MT.).

(*) *S. gemellatus* Gyllenhal, 1834. - Vernoux (J.MT.).

S. puncticollis Stephens, 1831. - Vernoux. Privat. Vacheresse (J.MT.).

(*) *S. ambiguus* Gyllenhal, 1834. - Mézilhac (J.MT.).

(*) *S. macularius* (Marsham, 1802). - Vernoux. Saint-Clément (J.MT.).

S. hispidulus (F., 1776). - Vernoux (J.MT.).

Page 290 :

Brachycerus undatus F., 1798. - Lagorce : la Fontaine du Cade, le 26 mars 1989 (A.F.).

(*) *B. algerius* (F., 1787). - Vallon-Pont-d'Arc, avril-juin 1989 (H.P.A.).

Page 291 :

Coniocteonus nigrosuturatus (Goeze, 1777). - Villeneuve-de-Berg : vallée de l'Ibie, le 17 avril 1987. Intéressant : c'est la première citation depuis HUSTACHE ! (G.L.).

Citons ici pour mémoire la description de l'espèce fossile *Lixus balazuci* (VOISIN et NEL, 1993).

Page 292 :

Lixus vilis (Rossi, 1790). - Vernoux (J.MT.).

(*) *Larinus rugulosus* Petri, 1907. - Vernoux (J.MT.).

Page 293 :

Hypera nigrirostris (F., 1775). - Vernoux (J.MT.).

(*) *Donus intermedius* (Boheman, 1842). - Vernoux (J.MT.).

Page 294 :

Hylobius abietis (L., 1758). - Dornas (900 m), dans un piège à α -pinène, le 6 août 1991 (P.Z.).

Page 295 :

Pissodes pini (L., 1758). - Vernoux (J.MT.).

(*) *Magdalis violacea* (L., 1758). - Vernoux (J.MT.).

Page 296 :

Ajouter le genre *Phloeophagus* Schönherr, 1838 (après *Brachytemnus*) :

(*) *P. (R.) lignarius* (Marsham, 1802). - Villeneuve-de-Berg : vallée de l'Ibie, le 17 avril 1987 (G.L.).

(*) *Rhinoncus castor* (F., 1792). - Vernoux (J.M.T.).

(*) *R. pericarpus* (L., 1758). Vernoux (J.MT.).

(*) *Amalus scortillum* (Herbst, 1795). - Vernoux (J.MT.).

Zacladus exiguus (Olivier, 1807). - Vernoux (J.MT.).

Z. geranii (Paykull, 1800) remplace *Z. affinis*.

Page 297 :

(*) *Coeliodes rubicundus* (Herbst, 1795). - Saint Agrève (J.MT.).

Le genre *Trichosirocalus* Colonnelli, 1979 remplace *Ceuthorhynchidius*.

(*) *T. horridus* (Panzer, 1801). - Vernoux (J.MT.).

(*) *Ceuthorhynchus resedae* Marsham, 1802. - Forêt de Bonnefoy, le 2 juillet 1985 (G.L.)

(*) *C. asperifoliarum* (Gyllenhal, 1813). - Vernoux (J.MT.).

C. atomus Boheman, 1845. - Vernoux (J.MT.).

Page 298 :

Orobitis cyaneus (L., 1758). - Vernoux (J.MT.).

Curculio venosus (Gravenhorst, 1807). - Mont Mézenc (J.MT.).

Page 299 :

Balanobius pyrrhoceras (Marshall, 1802). - Salavàs, le 18 avril 1987 (G.L.).

Furcipes rectirostris (L., 1758). - Mézilhac : le Crouzet (950 m), le 10 août 1991 (P.Z.).

Ajouter le genre *Ellescus* Dejean, 1821 (après *Lignyodes*) :

(*) *E. bipunctatus* (L., 1758). - Mézilhac (J.MT.).

(*) *Sibinia variata* (Gyllenhal, 1836). - Vernoux (J.MT.).

S. sodalis Germar, 1824. - Vernoux (J.MT.).

(*) *S. viscaria* (L., 1761). - Vernoux (J.MT.).

Page 300 :

Tychius tibialis Boheman, 1843. - Vernoux. Saint-Clément (J.MT.).

Il faut écrire *Miccotrogus* et non *Microtrogus* !

Miccotrogus cuprifer (Panzer, 1799). - Vernoux (J.MT.).

(*) *Cionus schoenherri* Ch. Brisout, 1863. - Vernoux (J.MT.).

Nanophyes flavidus Aubé, 1850. - Vernoux (J.MT.).

Page 301 :

Mecinus janthinus (Germar, 1817). - Vernoux (J.MT.).

Il faut écrire *Gymnetron* et non *Gymnaetron* !

G. pascuorum (Gyllenhal, 1813). - Vernoux (J.MT.).

G. rostellum (Herbst, 1795). - Privat. Vacheresse (J.MT.).

(*) *G. seriatum* Jacquet, 1888. - Vernoux (J.MT.).

(*) *G. latiusculum* Jacquelin-Duval, 1855. - Vernoux (J.MT.).

G. netum (Germar, 1821). - Vernoux (J.MT.).

(*) *Miarus micros* (Germar, 1821). - Vernoux (J.MT.).

(*) *M. meridionalis* (Brisout, 1862). - Privat. Vacheresse (J.MT.).

(*) *M. plantarum* (Germar, 1824). - Vernoux. Privat. Vacheresse (J.MT.).

Page 302 :

Acalles roboris Curtis, 1834. - Vernoux (J.MT.).

(*) *A. lemur* (Germar, 1824). - Vernoux (J.MT.).

Ajouter le genre *Echinodera* Wollaston, 1864 (après *Acalles*) :

(*) *E. (Rutera) hypocrita* (Boheman, 1837). - Lac d'Issarlès (P.P.).

(*) *Smicronyx coecus* (Reich, 1797). - Mézilhac (J.MT.).

Pachytychius haematocephalus (Gyllenhal, 1835). - Vernoux. Mont Mézenc (J.MT.).

APIONIDAE

EHRET (1989) a publié l'inventaire des Apions connus d'Arèche et dressé la liste des espèces dont la présence y est très probable. Il ne serait guère utile de recopier ces données *in extenso* : nous ne citerons donc ici que les taxons nouveaux pour notre faune, ces données étant reprises d'après EHRET (1990, 1992).

Pages 303 à 307 :

Ajouter le genre *Perapion* Wagner, 1907 :

(*) *P. (Pseudostenapion) simum* (Germar, 1817). - Le Crouzet, sur Millepertuis (EHRET, 1989).

P. (s. str.) sedi (Germar, 1818). - Vernoux (J.MT.).

(***) *P. (P.) affine* (Kirby, 1808). - Vernoux (J.MT.).

Ajouter le genre *Exapion* Bedel, 1887 :

(*) *E. genistae* (Kirby, 1811). - Gerbier de Jonc (EHRET, 1989).

Ajouter le genre *Diplapion* Reitter, 1916 :

(***) *D. confluens* (Kirby, 1808). - Vernoux (J.MT.).

Ajouter le genre *Ceratapion* Schilsky, 1901 :

(*) *C. carduorum* (Kirby, 1808). - Le Crouzet (EHRET, 1989). Saint-Clément (J.MT.).

(*) *C. penetrans* (Germar, 1817). - Le Crouzet, en nombre sur *Centaurea pectinata* (EHRET, 1989).

Ajouter le genre *Omphalapion* Schilsky, 1901 :

(***) *O. hookeri* (Kirby, 1808). - Saint-Clément (J.MT.).

Apion (Aspidapion) radiolus (Marsham, 1802 et non Kirby). Détermination vérifiée par dissection (J.B.).

Apion (Rhopalapion) longirostre Olivier, 1807. - Saint-André-de-Cruzières, le 18 juin 1888. Sanilhac, en juillet 1988 (J.B.). Mézilhac : le Crouzet (950 m), le 10 août 1991 (P.Z.).

Le genre *Squamapion* Bokor, 1923 remplace le sous-genre *Thymapion*. Consulter EHRET, 1992, p. 184 :

(*) *S. hoffmanni* (Wagner, 1930). - La Prade (800 m), sur *Eryngium campestre*, une femelle. Vernoux, trois exemplaires (J.MT. leg., J.M.E. det.).

(***) *S. oblivium* Schilsky, 1902. - Vernoux (J.MT.).

Le genre *Ischnopteration* Bokor, 1923 remplace une partie du sous-genre *Leptapion*. Consulter EHRET, 1992, p. 185 :

(*) *I. (s. str.) fallens* Marseul, 1888. - Vernoux, un exemplaire (J.MT. leg., J.M.E. det.).

(*) *I. (s. str.) modestum* Germar, 1817. - Sur *Lotus uliginosus* dans les lieux humides (EHRET, 1989).

(*) *Apion (Pirapion) atratulum* Germar, 1817. - Vernoux (J.MT.).

Le sous-genre *Eutrichapion* Reitter, 1916 éclate et passe en partie au rang de genre. Consulter EHRET, 1992, p. 189 :

(*) *E. (s. str.) ervi* Kirby, 1808. - Mézilhac : le Crouzet (J.M.E.). Vernoux (EHRET, 1989).

Ajouter le genre *Hemitrichapion* Voss, 1959, qui remplace une partie du sous-genre *Eutrichapion*. Consulter EHRET, 1992, p. 189 :

(***) *H. (Tinocyba) reflexum* Gyllenhal, 1833. - Vernoux (J.MT.).

(—) Le prétendu *Apion (Coelorhinapion) platalea* cité de Saint-Désirat dans le *Premier supplément* est en fait l'*A. (C.) afer* cité à la ligne suivante (J.M.) !

(***) *A. (Oxystoma) cerdo* Gerstäcker, 1854. - Vernoux (J.MT.).

(*) *A. (Pseudotrichapion) punctigerum* (Paykull, 1792). - Mézilhac : le Crouzet, Orgnac (EHRET, 1989).

(*) *A. (Protapion) ononidis* Gyllenhal, 1827 remplace *A. ononicola*. - Orgnac (J.M.E.).

(*) *A. (P.) ruficroides* Schatzmayr, 1926. - Vernoux, une femelle (J.MT., cité par EHRET, 1992, p.190).

(***) *A. (P.) difforme* Germar, 1818. - Vernoux (J.MT.).

(***) *A. (P.) varipes* Germar, 1817. - Vernoux (J.MT.).

(***) *A. (P.) interjectum* Desbrochers, 1895. - Vernoux (J.MT.).

Page 308 :

(*) *Lasiorhynchites praeustus* (Boheman, 1845). - Aubenas, en juillet 1987 (G.L. leg., F.V. det.).

IPIDAE (= SCOLYTIDAE)

Page 309 :

Genre *Dendroctonus* Erichson, 1836 nec 1846.

D. micans (Kugelmann, 1794). - Forêt de Borée. Suc de l'Areilladou. Sagnes et Goudoulet. Forêts de Chap del Bosc. Forêt des Chambons. Forêt de Mazan. Forêt de Bonnefoy. Suc du Pradou (consulter LEMPÉRIERE, 1984 ; 1992 ; 1994 ; LEMPÉRIERE *et al.*, 1988).

Page 310 :

Ajouter le genre *Dryocoetinus* Balachowsky, 1949 (avant *Taphrorychus*) :

(*) *D. villosus* (F., 1792). - Vernoux (J.MT.).

(*) *Xyleborus monographus* (F., 1792). - Forêt de Bonnefoy, le 8 juillet 1985 (H.J.C.).

(*) *Ips typographus* (L., 1758). - Forêt de Bonnefoy, sur *Picea excelsa*, le 21 mai 1988 (G.L.E. et J.J.).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES I : INSECTES FOSSILES

- BALAZUC J., 1989. - Quelques insectes fossiles des diatomites de Saint-Bauzile (Ardèche). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 58 (8) : 240-245, 12 fig.
- BOULARD M. et RIOU B., 1988. - *Tibicina gigantea* n. sp., Cigale fossile de la Montagne d'Andance (Homoptera, Tibicinidae). *Nouv. Revue Ent. (N.S.)*, 5 (4) : 349-351, 3 fig.
- MEIN P., MÉON H., ROMAGGI J.-P. et SAMUEL E., 1983. - La vie en Ardèche au Miocène supérieur, d'après les documents trouvés dans la carrière de la Montagne d'Andance. *Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. Lyon*, 21 : 37-44, 2 fig., 1 pl.
- NEL A., 1993. - Nouveaux Raphidioptères fossiles du Cénozoïque de France et d'Espagne (Raphidioptera, Raphidiidae, Inocelliidae). *E.P.H.E., Biol. Evol. Insectes*, 6 : 99-108, 13 fig.
- NEL A. et BRISAC P., 1994. - Découverte du premier *Calopteryx* fossile du Miocène de l'Ardèche (Odonata, Calopterygidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 99 (1) : 27-30, 1 fig.
- NEL A. et ESCULLÉ F., 1993. - Découverte d'un nouveau genre de Sieblosiidae dans le Miocène supérieur de l'Ardèche (France) [Odonata, Zygoptera, Lestoidea, Sieblosiidae]. *Nouv. Revue Ent. (N.S.)*, 10 (3) : 233-242, 5 fig.
- RIOU B., 1988. - *Les insectes du Miocène supérieur de la montagne d'Andance (Ardèche). Implications paléoclimatiques et paléogéographiques*. Thèse E.P.H.E. Sciences de la Terre, Dijon, 280 pp.
- RIOU B., 1992. - Première découverte de *Cimbex* fossiles dans les terrains du Miocène ardéchois (Hym. Cimbicidae). *E.P.H.E., Biol. Evol. Insectes*, 5 : 115-120, 4 fig.
- VOISIN J.-F. et NEL A., 1993. - Un *Lixus* fossile du Miocène français (Coleoptera, Curculionidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 98 (1) : 19-21, 2 fig.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES II : INSECTES ACTUELS

- ABERLENC H.-P., 1987. - Coléoptères de l'Ardèche. Premier supplément à l'inventaire de J. Balazuc (1984). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 56 (10) : 320-349
- ABERLENC H.-P., 1994. - Jean BALAZUC *in memoriam* (30 janvier 1914-12 janvier 1994). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 63 (10) : 313-316, 1 photo.
- ABERLENC H.-P., 1995. - L'œuvre scientifique du Dr. Jean BALAZUC. *L'Entomologiste*, 51 (2) : 49-66, 1 photo.
- ALLEMAND R., 1989. - Variabilité morphologique et répartition des espèces françaises de *Byrrhus* (Col. Byrrhidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 94 (5-6) : 169-180, 10 fig.
- BALAZUC J., 1984. - *Coléoptères de l'Ardèche*. Supplément au *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 53, 336 pp., 47 fig., 1 carte.

- BELIN D., 1991. - Capture de *Lytta vesicatoria* L. en Ardèche (Col. Meloidae). *L'Entomologiste*, 47 (6) : 306.
- BONNEAU P., 1985. - Quelques bonnes captures à Païolive. *L'Entomologiste*, 41 (2) : 88.
- BONTEMS C., 1981. - Les espèces de Linné et Fabricius du genre *Oreina* Chevrolat, 1837 (Col., Chrysomelidae, Chrysomelinae). *Nouv. Rev. Ent.*, 11 (1) : 93-109, 6 fig.
- BOURDONNÉ J.-C. et MALDES J.-M., 1995. - *Galeruca (Eumarhopa) rufa* Germar et *Galeruca (Haptocelis) melanocephala* Ponza, espèces rares en France (Coleoptera Chrysomelidae Galerucinae). *Bull. ACOREP*, 21 : 11-18, 5 fig., 1 carte.
- BOUYON C., 1989. - Note sur les Donaciinae du Sud-Est du Massif Central (Col. Chrysomelidae). *L'Entomologiste*, 45 (1) : 43-44.
- BOUYON C., 1991. - Sur quelques *Aphodius* du Sud-Est du Massif Central (Col. Scarabaeidae). *L'Entomologiste*, 47 (3) : 171-172.
- CHAMPANHET J.-M., 1987. - Nouvelle présence de *Diaprysius gezei* Jeannel (Col. Bathysciinae) dans le sous-sol ardéchois. *L'Entomologiste*, 43 (6) : 309-312, 4 fig.
- CHAMPANHET J.-M., 1988. - *Ovalisia* (= *Scintillatrix* = *Lampra*) *dives* Guillebeau, 1889 (Col. Buprestidae) dans le département de l'Ardèche. *L'Entomologiste*, 44 (1) : 49, 1 carte.
- CHASSAIN J., 1992a. - Captures intéressantes de Coléoptères (Lycidae, Elateridae, Serropalpidae, Eucnemidae). *L'Entomologiste*, 48 (5) : 284.
- CHASSAIN J., 1992b. - Contribution à la connaissance du sous-genre *Brachygonus* Buysson 1912 avec description d'une espèce nouvelle (Col. Elateridae). *L'Entomologiste*, 48 (6) : 323-335, 12 fig.
- COULON J., 1992. - Les *Asaphidion* du groupe *flavipes* : critères d'identification et répartition dans la région Rhône-Alpes. Présence en France d'*Asaphidion austriacum* Schweiger (Coleoptera Trechidae). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 61 (7) : 221-232, 4 fig.
- CROWSON R.A., 1955. - *The natural classification of the families of Coleoptera*. E.W. Classey, Hampton, 214 pp.
- DAUPHIN P., 1991. - Notes sur les *Stenus* français (Coleoptera Staphylinidae). 1. Le sous-genre *Stenus*. *L'Entomologiste*, 47 (6) : 277-291, fig. A à E.
- EHRET J.-M., 1989. - Les Apions de l'Ardèche (Coleoptera Curculionidae Apioninae). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 58 (8) : 246-250.
- EHRET J.-M., 1990. - Les Apions de France : clés d'identification commentées (Coleoptera Curculionidae Apioninae). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 59 (7) : 209-292, 146 fig.
- EHRET J.-M., 1992. - Les Apions de France (Coleoptera, Curculionidae) : Notes complémentaires et corrigenda. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 61 (6) : 180-192, 13 fig.
- GOMY Y., 1992. - Contribution à l'établissement des catalogues régionaux : Histeridae (Coleoptera). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 61 (7) : 209-220.

- JEANNE C., 1988. - Carabiques nouveaux ou remarquables (9e note). *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 16 (2) : 69-87, 4 fig.
- JEANNE C., 1989. - Les *Steropus* Dej. du sous-genre *Steropidius* nov. (Col. Pterostichidae). *L'Entomologiste*, 45 (3) : 141-151, 9 fig.
- LEMPÉRIERE G., 1984. - Early investigations on the potential of alternative prey for the rearing of *Rhizophagus grandis*, predatory beetle of *Dendroctonus micans* (Col. Scolytidae), the great spruce bark beetle. In : *Proceedings of a Seminar organized by the Commission of the European Communities and the Université Libre de Bruxelles (Eds.)*, 3 & 4 october 1984, Biological control of Bark Beetles (*Dendroctonus micans*), Bruxelles : 128-133.
- LEMPÉRIERE G., BOUCHY J.M. et BOURDIN P., 1988. - Infestation des peuplements de *Picea* par *Dendroctonus micans* Kug. (Coleoptera : Scolytidae) en Limousin (France) et essais de lutte biologique avec le prédateur *Rhizophagus grandis* Gyll. (Coleoptera : Rhizophagidae). *Naturaliste can. (Rev. Ecol. Syst.)*, 115 : 235-243, 4 fig., 2 tabl.
- LEMPÉRIERE G., 1992. - Ecologie d'un ravageur forestier *Dendroctonus micans* (Kug.) (Col. Scolytidae), l'Hylésine géant de l'Epicéa. Thèse de Doctorat, Université Paris 7, 183 pp., 48 fig., 2 pl., 28 tabl.
- LEMPÉRIERE G., 1994. - Ecologie d'un ravageur forestier *Dendroctonus micans* (Kug.) (Col. Scolytidae), l'Hylésine géant de l'Epicéa. Première partie : Biologie et biogéographie. *Ecologie*, 25 (1) : 31-38, 4 fig.
- MARTINEZ M., 1996. - A propos du nombre d'espèces d'insectes en France. *Bull. Soc. ent. Fr.*, à paraître.
- OROUSSET J., 1994. - Le genre *Leptotyphlus* Fauvel, nouvelle acquisition pour la faune de l'Ardèche. (Col. Staphylinidae). *Bull. ACOREP*, 20 : 25
- PAULIAN A. et CHAMINADE A., 1985. - Répartition et considérations écologiques sur l'*Acmaeodera prunneri* Gené et sa variété *18-punctata* Gory en France continentale (Col. Buprestidae). *L'Entomologiste*, 41 (6) : 289-295, 1 carte, 4 photos.
- QUENEY P., 1988. - Nouvelles localités pour quelques Coléoptères (Carabidae, Scarabaeidae, Chrysomelidae). *L'Entomologiste*, 44 (1) : 51.
- RICHOUX P. et DOLÉDEC S., 1987. - *Hydroscapha granulum* (Motschulsky, 1855). Description of the larva and ecological notes. *Aquatic insects*, 9 (3) : 137-144, 2 fig.
- SECQ M. et B., 1991. - Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française (Col.), (1ère note). *L'Entomologiste*, 47 (2) : 113-116.
- SECQ M. et B., 1994. - Les *Hister* de la faune de France (Col. Histeridae). *L'Entomologiste*, 50 (2) : 113-127, 20 fig.
- TAUZIN P., 1991. - Précision sur la répartition de quelques espèces de Cetoninae paléarctiques. Première note : les *Eupotosia* Miksic, 1954. *L'Entomologiste*, 47 (6) : 293-305, 2 fig., 2 cartes.

- TAUZIN P., 1994a. - Le genre *Osmoderma* Le Peletier et Audinet-Serville 1828 (Coleopt., Cetoniidae, Trichiinae, Osmodermatini). Systématique, biologie et distribution (deuxième partie). *L'Entomologiste*, 50 (4) : 217-242, fig 36-62.
- TAUZIN P., 1994b. - Compléments à l'étude des genres *Cetonischema* Reitter 1898 et *Eupotosia* Miksic 1954 (Col., Cetoniidae, Cetoniinae, Cetoniini). *Bull. ACOREP*, 20 : 21-23.
- VINCENT R., 1990. - Contribution à l'étude de quelques espèces françaises du genre *Dienerella* Reitter, 1911 [Coleoptera, Lathridiidae]. *Revue fr. Ent. (N.S.)*, 12 (1) : 29-36, 19 fig.
- VINCENT R., 1991. - Nouveau statut de *Dienerella separanda* (Reitter) 1887 et description d'une espèce nouvelle d'Espagne, *D. huguettae* n. sp. (Coleoptera, Lathridiidae). *L'Entomologiste*, 47 (5) : 241-248, 5 fig.

1994a
1994b
1990
1991

(The following text is extremely faint and largely illegible, appearing to be a list of references or a detailed index. It contains several lines of text, some of which are partially recognizable as titles or journal names, but the majority is too light to transcribe accurately.)