

# ANNALES

DE LA

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

---

*Année 1870-71.*

—  
(NOUVELLE SÉRIE)  
—

TOME DIX-HUITIÈME

---

PARIS

F. SAVY, LIBRAIRE

Rue Hautefeuille, 24

---

31 Janvier 1872

# DESCRIPTION

DE

## DEUX NOUVEAUX SCYMNIENS

(TRIBU DES COCCINELLIDES)

Par E. MULSANT et GODART

(Présentée à la Société linnéenne de Lyon, le 9 mai 1870)

---

### **Pharus bardus? MULSANT ET GODART.**

*Brièvement ovale ; pubescent. Tête et prothorax noirs, ponctués. Elytres ornées chacune d'une bordure suturale noire, et d'un réseau noir, laissant le côté externe d'un flave testacé, et divisant le reste de leur surface en cinq taches de même couleur, disposées sur deux rangées longitudinales : la rangée interne formée de deux taches, souvent unies : l'externe de trois. Dessous du corps brun sur sa ligne médiane, d'un flave testacé sur les côtés.*

Long. 0<sup>m</sup>,0020 (9/10 l.). — Larg. 0<sup>m</sup>,015 (2/3 l.).

*Corps brièvement ovale ; convexe ; pubescent. Tête noire ; ponctuée. Epistome relevé en rebord, arrondi à ses angles. Antennes d'un flave testacé. Prothorax arqué en arrière à la base ; noir, ponctué. Elytres parées chacune d'une bordure suturale noire ; d'un flave roussâtre à leur côté externe, formées sur le reste de leur surface de cinq taches d'un flave roussâtre, divisées par un réseau noir : ces taches disposées sur deux rangées longitudinales : la rangée juxta-suturale, formée de deux taches : la 1<sup>re</sup>, allongée, prolongée depuis la base jusqu'au tiers, souvent unie à la suivante, ou incomplètement séparée de celle-ci : cette dernière en losange ou subarrondie : l'autre rangée, séparée par*

une bande noire de la partie d'un flave roussâtre qui joint le bord externe, composée de trois taches d'un flave roussâtre : l'antérieure presque en triangle oblique, séparée de sa base par un espace égal à sa longueur : la 3<sup>e</sup>, orbiculaire, située sur la même ligne transversale que la 2<sup>e</sup> de la rangée interne : la dernière, située un peu après les trois quarts des étuis. *Repli* non creusé de fossettes. *Dessous du corps* brun sur sa partie médiane, d'un flave testacé sur les côtés. *Plaques* incomplètes, en arc de cercle, atteignant vers le quart externe de sa largeur le bord postérieur de l'arceau, avec lequel elles se confondent ensuite jusqu'au bord latéral. *Pieds* bruns ou obscurs.

Patrie : les environs de Bône (Algérie).

***Scymnus bicinctus.*** MULSANT ET GODART.

*Brièvement ovale; pubescent. Tête d'un flave-testacé, obscure dans sa périphérie. Prothorax d'un rouge ferrugineux. Flytres noires, parées chacune de deux bandes d'un flave rouge : l'antérieure naissant de l'épaule, arquée d'abord en arrière, puis, transversalement dirigée vers le tiers de la suture qu'elle n'atteint pas : l'autre, naissant du bord externe, vers les deux tiers des étuis, transversalement dirigée vers la suture qu'elle n'atteint pas. Pieds d'un roux fauve-testacé.*

Long. 0<sup>m</sup>,0022 (1 l.). — Larg. 0<sup>m</sup>,0014 (2/3 l.).

*Corps* brièvement ovale, convexe, pubescent. *Tête* d'un flave testacé, obscure dans sa périphérie. *Prothorax* arqué en arrière, obtus au devant de l'écusson, et sinueux de chaque côté de cette partie médiane, à la base; finement ponctué; d'un rouge ferrugineux. *Elytres* noires, parées chacune de deux bandes d'un flave rouge : la 1<sup>re</sup>, naissant de l'épaule, arquée d'abord en arrière, puis subtransversalement dirigée vers le tiers de la suture qu'elle n'atteint pas, formant avec sa pareille une sorte de demi-cercle dirigé en arrière et interrompu sur la suture : la seconde, subtransversale, naissant du bord externe vers les deux tiers des étuis, subtransversalement dirigée vers la suture qu'elle laisse noire. *Dessous du corps* noir, avec les côtés d'un rouge roux. *Plaques pec-*

*tora'es* en demi-cercle. *Plaques abdominales* en demi-cercle, atteignant le bord postérieur de l'arceau et un peu obliquées à leur côté externe. *Pieds* d'un rouge ou fauve testacé.

Patrie : les environs de Bône (Algérie).

Cette espèce appartient au S. G. *Pullus*, et doit trouver place près du *S. Castroemi*.

Scymnus bicinctus. Mulsant et Guérin



Long. 0m,005 (4-1). — Larg. 0m,0015 (2/3 l.).