



# DESCRIPTION

DE

## QUELQUES COCCINELLIDES NOUVELLES

PAR

**E. MULSANT**

Présentées à la Société linnéenne le 13 juin 1870

### **Cleothera Brucki**, MULSANT.

Brièvement et obtusément ovale, prothorax et élytres flaves ; le premier paré de cinq taches noires, constituant souvent une bordure basilaire et un réseau sur sa région médiane, enclosant deux taches arrondies, flaves, avec les côtés de même couleur : les élytres parées d'une bordure suturale offrant une dilatation carrée du sixième à la moitié de leur longueur, et chacune d'une bordure basilaire et externe, étroites et de trois taches noires : la 1<sup>re</sup> sur le calus, arrondie, prolongée jusqu'au tiers : les 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup> constituant par leur réunion un angle dirigé en avant uni à la 1<sup>re</sup> tache : la 2<sup>o</sup> postérieurement unie aux trois quarts de la bordure suturale ; la 3<sup>o</sup> aboutissant presque aux deux tiers de la bordure externe.

PATRIE : la Colombie. (E. de Bruck).

### **Cleothera pretiosa**, MULSANT.

Brièvement et obtusément ovale, prothorax et élytres flaves ; le prothorax orné d'une bordure basilaire tridentée et de deux taches antérieures, arquées, noires. Elytres parées d'une bordure suturale suborbiculairement renflée vers le quart, d'une bordure périphérique, réduite au rebord et chacune des deux taches noires : l'antérieure, naissant sur le calus, étendue vers le quart de la bordure suturale qu'elle n'atteint pas, entaillée à son

bord postérieur : la seconde sur le disque, couvrant des quatre septièmes aux cinq sixièmes de la longueur des étuis, irrégulièrement obtriangulaire, sinuée à son côté externe.

Long. 0,0030 à 0,0033. — Larg. 0,0025 (1 1/8)

PATRIE : la Colombie (E. de Bruck).

### **Cleothera ponderosa, MULSANT.**

Brièvement et obtusément ovale. Prothorax noir sur son disque, paré sur les côtés d'une bordure d'un rouge jaune, étendue sur le bord antérieur, jusqu'au côté interne et sur chaque tiers externe de sa base : les élytres d'un rouge jaune, parées d'une bordure suturale une fois plus large que l'écusson dans sa première moitié, rétrécie dans sa seconde et postérieurement, brièvement dilatée ou unie à une petite tache transverse, et chacune d'une bande basilaire et d'une grosse tache, noires : les bandes unies à la moitié interne de la base, dont elle se détache ensuite en s'incombant à son extrémité, sans atteindre le bord externe : la tache, grosse, subarrondie, plus rapprochée du bord externe que de la bordure suturale, liée à celle-ci par un trait, vers la moitié de cette dernière, et à la bande par sa partie antéro-externe.

Long. 0,0033 (1 1/3). — Larg. 0,0033 (1 1/2).

PATRIE : Colombie (E. de Bruck).

### **Cleothera venalis, MULSANT.**

Brièvement et obtusément ovale. Prothorax et élytres flaves ; le premier paré de deux taches basilaires noires, liées chacune par leur angle de devant à une tache arquée antérieure ; les secondes ornées d'une bordure suturale, d'une bordure périphérique étroite, et chacune de quatre taches noires : la 1<sup>re</sup>, grosse, arrondie sur le calus et avancée jusqu'à sa base ; la 2<sup>e</sup> en forme d'équerre, liée par l'angle à la bordure suturale, vers le quart

de la longueur de celle-ci ; la 3<sup>e</sup> arrondie, liée à la bordure suturale, vers les deux tiers ; la 4<sup>e</sup> en parallélogramme allongé un peu plus avancée que la précédente, *justa-marginale*.

Long. 0,0030 à 0,0033 (1 2/5 à 1 1/3). — Larg. 0,0036 (1 2/3).

Nous avons vu dans la collection de M. de Bruck une Cléothère qui semblerait à première vue constituer une espèce particulière, (*C. Compilata*), mais qui n'est peut-être qu'une variété de la précédente, n'ayant pas acquis sa coloration parfaite et ayant le dessin d'un rouge fauve au lieu de l'avoir noir, seulement la troisième tache, au lieu d'être arrondie, a la forme d'une virgule sur l'élytre droite.

PATRIE : la Colombie (E. de Bruck).

### **Cleothera Proserpinæ, MULSANT.**

*Brièvement et obtusément ovale. Dessus du corps entièrement noir, avec les côtés du prothorax parés d'une étroite bordure d'un rouge jaune, poitrine nébuleuse : antennes, ventre et pieds d'un rouge jaune.*

PATRIE : la Colombie (E. de Bruck).

### **Cleothera pedicata, MULSANT.**

*Brièvement et obtusément ovale, prothorax et élytres flaves ; le prothorax paré d'une bordure basilaire, grêle, un peu anguleusement relevée à ses extrémités, et d'un dessin en parallélogramme allongé, enclosant une tache d'une couleur foncière en ovale allongé ; ce dessin et la base d'un rouge brunâtre ; les élytres parées d'une bordure suturale, d'une bordure externe réduite au rebord, et chacune d'un réseau d'un rouge brunâtre ; celui-ci divisant la surface de chacune en cinq aréoles ; la 1<sup>re</sup> subbasilaire, suborbiculaire ; la 2<sup>e</sup> presque en parallélogramme, plus étroite et plus allongée, en dehors du calus ; les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> en rangée transversale ; la *juxta-suturale* plus grosse, subarrondie ; la 4<sup>e</sup> *juxta-marginale*, irrégulière, anguleuse-*

ment avancée sur sa moitié interne ; la 5<sup>e</sup> presque en ovale, transversale, non échancrée en devant.

Long. 0,0030 (1 2/5). — Larg. 0,0040 (1 3/4).

PATRIE : la Colombie (E. de Bruck).

**Cleothera flavida**, MULSANT.

Brièvement et obtusément ovale, tête et prothorax noirs, élytres flaves, parées d'une bordure ovalairement élargie de l'extrémité de l'écusson à la moitié des élytres, égale vers le quart de la suture, presque au tiers de la largeur de l'élytre, graduellement et faiblement rétrécie de la moitié à l'extrémité, d'une bordure périphérique une fois plus large que le rebord et d'un point sur le calus, noirs.

PATRIE : La Colombie (E. de Bruck.)

**Cleothera gemellata**, MULSANT.

Obtusément et brièvement ovale, prothorax et élytres flaves : le premier parcé de cinq taches noires : trois basilaires, deux antérieures arquées ; les élytres ornées d'une bordure suturale ovalairement renflée depuis l'écusson jusqu'à la moitié, puis moins large et parallèle, et chacun d'une bordure externe réduite au rebord, et de quatre taches d'un rouge brunâtre, disposées sur deux rangées ; les deux subbasilaires, une fois plus longues que large ; la 2<sup>e</sup> sur le calus, souvent unie par son angle antéro-interne à la 1<sup>re</sup> ; celle-ci entre la 2<sup>e</sup> et la bordure suturale ; les deux autres ovalaires : la 3<sup>e</sup> plus grosse et un peu plus avancée, près de la bordure suturale.

PATRIE : La Colombie (E. de Bruck).

**Cleothera septenaria**, MULSANT.

Brièvement et obtusément ovale, prothorax et élytres flaves ; le protho-

*rax* paré de trois taches fauves en parallélogramme allongé ; une vers chaque quart externe de la base : une plus antérieure sur la ligne médiane ; les élytres ornées chacune de sept taches d'un rouge rosat ; une presque carrée, au côté interne du calus huméral, liée à une autre subponctiforme plus extérieure ; la 3<sup>e</sup> juxta suturale, moins avancée, prolongée jusqu'aux deux cinquièmes ; les 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> en rangée transverse, vers la moitié ; la 4<sup>e</sup> presque liée à triangle postéro-externe de la 3<sup>e</sup> : la 5<sup>e</sup> juxta-marginale : les 6<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> formait avec leur pareilles une rangée faiblement arquée au devant : la 6<sup>e</sup> juxta-suturale, aux trois quarts ou un peu plus : la 7<sup>e</sup> juxta-marginale.

PATRIE : La Colombie (E. de Bruck).

### **Cleothera vatleina, MULSANT,**

Brièvement et obtusément ovale, prothorax et élytres flaves ; le prothorax paré de cinq taches d'un rouge carminé, trois basilaires, deux antérieures, unies de manière à constituer deux aréoles ; les élytres ornées chacune d'un réseau de même couleur, uni à la base au quart de la largeur et au calus : au bord externe, au cinquième, aux trois septièmes et aux deux tiers ; offrant trois bandes transverses anguleuses : 1<sup>o</sup> au niveau du calus ; 2<sup>o</sup> aux deux cinquièmes ou trois septièmes : 3<sup>o</sup> vers les deux tiers : une bande longitudinale prolongée des trois septièmes de la largeur de la première bande aux deux tiers de la 3<sup>e</sup> ; un réseau divisant la surface de chacune en 9 aréoles : les deux juxta-suturales presque divisées chacune en deux.

PATRIE : La Colombie. (E. de Bruck).

### **Cleothera circea, MULSANT.**

Brièvement et obtusément ovale, prothorax et élytres flaves ; le prothorax paré sur les trois cinquièmes médiaires de sa largeur, de cinq taches constituant souvent un réseau noir, laissant de couleur flave une tache arrondie de chaque côté de la ligne médiane, et une ovallaire plus grande, juxta-marginale : les élytres parées d'une bordure suturale assez large, élargie au tiers et aux trois quarts, et chacune d'une bordure basilaire et

*d'un réseau, noirs : le réseau partageant la surface de chacun en cinq aréoles : la 1<sup>re</sup> juxta-scutellaire et subbasilaire, en ovale transverse : la 2<sup>e</sup> en ovale allongé, en dehors du calus : les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> formant avec leurs pareilles une rangée transversale arquée en arrière : la 3<sup>e</sup> voisine de la bordure, ovale : la 4<sup>e</sup> juxta-marginale, carrée : la postérieure subapicale transverse, échancrée en devant.*

PATRIE : La Colombie. (E. de Bruck).

### **Cleothera laqueata, MULSANT.**

*Brièvement et obtusément ovale, prothorax et élytres flaves : le premier paré de quatre ou cinq taches roses ; trois basilaires, deux au tiers de sa longueur : les secondes, avec la suture et le bord externe noirâtres, parées d'un réseau rose divisant la surface de chacun en cinq aréoles : deux basilaires, deux vers la moitié, la 5<sup>e</sup> postérieure, échancrée dans le milieu de son bord antérieur.*

PATRIE : La Colombie. (E. de Bruck).

### **Cleothera Maison, MULSANT.**

*Brièvement et obtusément ovale, prothorax et élytres jaunes : le prothorax paré d'une bordure basilaire non étendue jusqu'aux angles postérieurs, et d'une ligne médiane avancée jusqu'au quart antérieur, noires : les élytres parées d'une large bordure suturale, et chacune d'un réseau divisant leur surface en cinq aréoles, deux à sa base, deux au milieu, une apicale : le réseau ne joignant pas le bord externe.*

PATRIE : La Colombie (E. de Bruck). Dédiée à M. Maison.

### **Cleothera subparallela, MULSANT.**

*Ovale, subparallèle ; prothorax flave, paré d'une bordure basilaire couvrant les deux tiers médiaux de sa base, et imitant au devant deux courtes lignes longitudinales. Elytres noires, ornées chacune de cinq taches flaves : les deux premières liées à la base : la 1<sup>re</sup> semi-hémisphérique, joi-*

