

**ANNALES**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE**  
DE LYON

---

*Année 1872.*

—  
(NOUVELLE SÉRIE)  
—

TOME DIX-NEUVIÈME

---

PARIS  
F. SAVY, LIBRAIRE  
Rue Hautefeuille, 24

—  
31 Décembre 1872

# DESCRIPTION

D'UNE

## ESPÈCE NOUVELLE DE COLÉOPTÈRES

par E. MULSANT et CL. REY

Présenté à la Société Linnéenne le 15 juillet 1872

---

### **Heterocerus pictus**, REICHE.

*Oblong ; médiocrement convexe et garni d'un duvet grisâtre en dessus. Tête et prothorax d'un brun noir : celui-ci moins large aux angles de devant qu'aux postérieurs : rebordé à ceux-ci et à la base, paré d'une tache flave aux angles de devant. Elytres d'un brun rouge, ornées chacune de trois taches flaves : les deux premières arrondtes, punctiformes : la 1<sup>re</sup> près du bord externe, vers les deux neuvièmes : la 2<sup>e</sup> sur le disque : la 3<sup>e</sup> liée au bord externe et à une courte bordure marginale flave, vers les deux tiers.*

Long. 0,0051 (2/4 l.)— Larg. 0,0020 (9/10 l.)

*Corps oblong ; médiocrement convexe et garni d'un duvet grisâtre, en dessus. Antennes d'un rouge testacé, brunâtre. Tête d'un brun noir. Prothorax arqué sur les côtés ; plus étroit aux angles de devant qu'aux angles postérieurs ; rebordé à ceux-ci et à la base ; cilié latéralement ; une fois au moins plus large dans son diamètre transversal le plus grand que long sur sa ligne médiane ; assez finement ponctué ; pubescent ; d'un brun noir , avec une tache d'un flave testacé aux angles de devant. Ecusson noir ; en triangle de moitié plus long que large. Elytres un peu plus larges à la base que le prothorax ; trois fois au moins aussi longues que lui ; rebordées à la base et sur les côtés ; peu ciliées latéralement ; subparallèles jusqu'aux trois cinquièmes environ de leur longueur, en ogive ou subarrondies postérieurement ; médiocrement con-*

vexes; presque sans fossette humérale; aussi finement ponctuées que le prothorax; garnies d'un duvet grisâtre, mi-couché; brunes ou d'un brun rougeâtre; parées chacune de trois taches flaves: la 1<sup>re</sup> arrondie, ponctiforme, située près du bord externe, aux deux neuvièmes de leur longueur: la 2<sup>e</sup> de même forme et à peu près de même grandeur que la précédente, située sur la disque, vers la moitié de leur longueur: la 3<sup>e</sup> subarrondie, liée au bord interne, vers les deux tiers de leur longueur ou un peu moins, souvent déformée et unie à une étroite bordure externe avancée presque jusqu'à la première tache. *Dessous du corps* brièvement pubescent; d'un rouge brun. *Plaques du 1<sup>er</sup> arceau ventral* naissant à l'angle antéro-externe de celui-ci, dirigées en ligne droite vers le bord postérieur de cet arceau où elles se terminent. *Pieds*: Cuisses d'un flave testacé, au moins dans leur seconde moitié: jambes et tarses d'un rouge testacé.

**PATRIE**: la Sicile (Reiche).