

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

1873

Année 1873

(NOUVELLE SÉRIE)

TOME VINGTIÈME

LYON

H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

65, RUE DE LYON

MÊME MAISON A GENÈVE ET A BALE

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEURS

19, RUE HAUTEFEUILLE

1874

DESCRIPTION

DE DIVERS

COLÉOPTÈRES BRÉVIPENNES

NOUVEAUX OU PEU CONNUS

PAR

E. MULSANT ET CL. REY

Présentée à la Société Linnéenne de Lyon le 30 mars 1873.

Myllaena incisa

Suballongée, peu convexe, finement duveteuse, très-finement et très-densément chagrinée; d'un noir mat, avec le premier article des antennes, la bouche et les pieds d'un testacé obscur. Antennes grêles, faiblement épaissies vers leur extrémité; à penultièmes articles (8-10) plus longs que larges. Prothorax subtransverse, beaucoup plus étroit en avant, assez fortement arqué sur les côtés, aussi large postérieurement que les élytres; à angles postérieurs obtus, non recourbés en arrière. Élytres assez courtes, un peu moins longues que le prothorax, à peine convexes. Abdomen assez fortement convexe à son extrémité. Distinctement sétosellé. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0029 (1 1/3 l.); — larg., 0^m,0010 (1/2 l.).

PATRIE : midi de la France, au bord des eaux saumâtres.

SOC. LINN. T. XX.

Oligota (Logiota) piecscens

Oblongue, assez large, peu convexe, très-finement et subéparsement pubescente, très-finement pointillée, d'un noir brillant avec les élytres brunâtres, la bouche, la base des antennes et les pieds d'un testacé de poix. Antennes à massue très-allongée, graduée, de cinq articles. Prothorax fortement transverse, rétréci en avant, subarqué sur les côtés, un peu moins large en arrière que les élytres, nullement bissinué à la base. Élytres transverses, beaucoup plus longues que le prothorax. Abdomen subatténué seulement vers son extrémité, à cinquième segment beaucoup plus long que le quatrième, moins densément pointillé que les précédents.

Long., 0^m,0014 (2/3 l.).

PATRIE : le Beaujolais, dans les caves.

Oligota picipennis

Suballongé, assez étroite, subparallèle, subconvexe, très-finement et densément pubescente, très-finement et densément pointillée, d'un noir assez brillant, avec les élytres d'un brun châtain, le sommet de l'abdomen couleur de poix, la base des antennes et les pieds, d'un roux ferrugineux. Antennes à massue graduée de quatre articles. Prothorax très-fortement rétréci en avant, subarqué sur les côtés, aussi large en arrière que les élytres, à peine bissinué à sa base. Élytres fortement transverses, beaucoup plus longues que le prothorax. Abdomen subparallèle, densément et uniformément pointillé, à cinquième segment sensiblement plus grand que le quatrième.

Long., 0,0012 (1/2 l.).

PATRIE : le Beaujolais.

Oligota aliena

*Allongée, étroite, sublinéaire, assez convexe, très-finement et subépar-
sement pubescente, très-finement et densément pointillée, d'un noir de poix
brillant, avec les élytres et le prothorax moins foncés, les côtés de celui-ci,
le dessous des épaules et l'extrémité de l'abdomen largement d'un roux
plus ou moins vif, la bouche, la base des antennes et les pieds testacés.
Antennes à massue assez brusque de trois articles. Prothorax assez forte-
ment transverse, sensiblement rétréci en avant, à peine arqué sur les côtés,
aussi large en arrière que les élytres, non bissinué vers sa base. Élytres
assez fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax. Abdo-
men subparallèle, uniformément pointillé, à cinquième segment beaucoup
plus grand que le quatrième.*

Long., 0^m,0011 (1/2 l.).

Cette espèce a été trouvée à Cette par M. Valéry Mayet, parmi les ara-
chides venant du Sénégal.

Oligota convexa

*Suballongée, assez étroite, subparallèle, fortement convexe, très-fine-
ment et densément pointillée, d'un noir brillant, avec les antennes obscures
et les pieds roux. Antennes à massue graduée de quatre article. Prothorax
fortement transverse, un peu rétréci en avant, subarqué sur les côtés,
aussi large en arrière que les élytres, faiblement bissinué à la base. Élytres
fortement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, plus
fortement ponctuées que celui-ci. Abdomen subparallèle, convexe, dense-
ment pointillé, à troisième segment subégal au quatrième.*

Long., 0^m,0011 (1/2 l.).

PATRIE : la Provence.

Oligota australis

Suballongée, assez étroite, subparallèle, subconvexe, très-finement et assez densément pubescente, très-finement et densément pointillée, d'un brun de poix châtain, avec la tête et l'abdomen noirs, l'extrémité de celui-ci d'un roux de poix, la bouche, les antennes, et les pieds roux. Antennes à massue graduée de quatre articles. Prothorax fortement transverse, sensiblement rétréci en avant, subarqué sur les côtés, à peine moins large en arrière que les élytres, légèrement bissinué à la base. Élytres assez fortement transverses, beaucoup plus longues que le prothorax. Abdomen subparallèle, finement pointillé, moins densément vers le sommet du cinquième segment : celui-ci subégal au quatrième.

Long., 0^m,0012 (1/2 l.).

PATRIE : la Provence.

Oligota fuscipes

Allongée, étroite, sublinéaire, assez convexe, finement et assez densément pointillée, d'un noir brillant, avec les pieds et les antennes obscures ; la base de celles-ci d'un roux de poix. Antennes à massue assez brusque, de trois articles. Prothorax très-fortement transverse, un peu rétréci en avant, arqué sur les côtés, aussi large en arrière que les élytres, à peine bissinué à sa base. Élytres très-courtes, un peu plus longues que le prothorax. Abdomen subparallèle, uniformément pointillé, à cinquième segment subégal au quatrième.

Long., 0^m,0011 (1/2 l.).

PATRIE : la France orientale, les environs de Lyon ; elle vit en compagnie de la *Formica rufa*.

Oligota pillosa

*Suballongée, assez étroite, subparallèle, subconvexe, finement, subépar-
sement et assez longuement pubescente, très-finement et densément poin-
tillée, d'un brun de poix châtain et brillant, avec la bouche, les antennes,
les pieds et le sommet de l'abdomen roux. Antennes à massue suballongée
de trois articles. Prothorax fortement transverse, un peu rétréci en avant,
subarqué sur les côtés, aussi large en arrière que les élytres, à peine bis-
sinué à sa base. Élytres assez fortement transverses, sensiblement plus
longues que le prothorax. Abdomen subparallèle, uniformément pointillé,
à cinquième segment subégal au quatrième.*

Long., 0^m,0010 (1/2 l. à peine).

PATRIE : le Beaujolais, dans le nid de la *Formica rufa*.

Oligota misella

*Allongée, étroite, sublinéaire, assez convexe, très-finement et subépar-
sement pubescente, très-finement et très-densément pointillée, d'un noir
brillant, avec la bouche, la base des antennes et les pieds d'un roux tes-
tacé. Antennes à massue brusque de trois articles. Prothorax fortement
transverse, un peu rétréci en avant, subarqué sur les côtés, aussi large en
arrière que les élytres, faiblement bissinué à sa base, presque lisse sur son
milieu. Élytres médiocrement transverses, sensiblement plus longues que le
prothorax. Abdomen atténué vers son sommet, uniformément pointillé à
cinquième segment subégal au quatrième.*

Long., 0^m,0010 (1/2 l. à peine).

PATRIE : les environs de Lyon.

Myrmedonia (Myrmella) excepta

Assez allongée, légèrement convexe, à peine pubescente, d'un noir très-brillant, avec la bouche, les antennes et les pieds roux. Tête transverse, un peu moins large que le prothorax, presque lisse. Antennes assez légèrement épaissies, à troisième article à peine plus long que le deuxième, les cinquième à septième assez légèrement, les huitième à dixième assez fortement transverses, le dernier oblong. Prothorax fortement transverse, à peine rétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, subdéprimé ou à peine silloné sur son milieu, presque lisse. Élytres fortement transverses, à peine plus longues que le prothorax, finement et assez densément ponctuées. Abdomen obsolètement et peu ponctué.

Long., 0^m,0043 (2 l.); — larg., 0^m,0010 (1/2 l.).

PATRIE. Cette espèce remarquable a été prise, dans le mois de mai, au pied d'un arbre, en compagnie de fourmis, aux environs de Marseille, entre la station du Pas-des-Lanciers et Marignane.

Kraatzia laevicollis

Suballongée, assez large, subfusiforme, subdéprimée ou peu convexe, finement et parcimonieusement pubescente, d'un noir très-brillant avec le disque des élytres d'un testacé de poix, le sommet de l'abdomen d'un brun roussâtre, les antennes d'un roux ferrugineux, la base de celles-ci, la bouche et les pieds testacés. Tête moins large que le prothorax, presque lisse. Antennes à troisième article plus long que le deuxième, le quatrième oblong, les cinquième à dixième graduellement plus courts avec celui-ci subtransverse. Prothorax assez fortement transverse, subrétréci en arrière, sensiblement moins large que les élytres, presque lisse. Élytres fortement transverses, à peine aussi longues que le prothorax, légèrement et assez densément ponctuées. Abdomen subatténué en arrière, fortement sétosé, légèrement et lâchement ponctué vers sa base, lisse postérieurement.

Long., 0^m,0032 (1 1/2 l.); — larg., 0^m,0010 (1/2 l.).

PATRIE. Cette espèce est rare. On la rencontre dans la France méridionale, en mars et avril, sous les pierres, en compagnie de fourmis du genre *Atta*, et principalement de l'*Atta capitata*, Latreille.

Thamiarcea australis

Assez allongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et densément pubescente, d'un roux obscur et peu brillant, avec le disque du prothorax un peu rembruni, la tête et l'abdomen d'un noir de poix brillant, le sommet et les intersections de celui-ci roussâtres, la bouche, la base des antennes et les pieds d'un roux testacé. Tête moins large que le prothorax, finement et assez densément ponctuée, presque lisse sur son milieu. Antennes légèrement épaissies faiblement pilosellées, à troisième article un peu plus long que les deuxième le quatrième légèrement, le cinquième sensiblement, les sixième, à dixième médiocrement ou assez fortement transverses. Prothorax fortement transverse, à peine plus étroit en avant, un peu ou à peine moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, à peine sillonné vers sa base, finement et densément ponctué. Élytres assez fortement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et densément ponctuées. Abdomen graduellement atténué en arrière, distinctement sétosellé vers son sommet, finement et assez densément ponctué vers sa bases presque lisse postérieurement.

Long., 0^m,0038 (1 3/4 l.); — larg., 0^m,0012 (1/2 l.).

PATRIE. Cette espèce se trouve dans les plaies des arbres, dans les montagnes de la Provence, où elle est assez rare.

Colpodota parens

Suballongé, assez large, fusiforme, assez convexe, très-finement et densément pubescente, d'un noir de poix peu brillant, avec les élytres et les

antennes brunâtres, la base de celles-ci, la bouche et les pieds testacés, et l'extrémité de l'abdomen d'un roux testacé. Tête très-finement et densément pointillée. Antennes visiblement épaissies vers leur extrémité, assez brièvement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième à peine, les sixième à dixième fortement transverses. Prothorax fortement transverse, assez convexe, un peu rétréci en avant, aussi large en arrière que les élytres, modérément arqué latéralement, légèrement sinué sur les côtés de sa base, très-finement et très-densément pointillé. Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement, densément et subruguleusement pointillées. Abdomen assez fortement atténué vers son extrémité, à pubescence longue et subégalement serrée, fortement sétosellé, finement et densément pointillé vers sa base, un peu moins densément en arrière. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

Long., 0,0022 (1 l.); — larg., 0,0005 (1/4 l.).

PATRIE. Cette espèce se prend en automne, parmi les mousses et les vieux fagots. Elle est assez rare et se rencontre dans les environs de Lyon ainsi que dans le Beaujolais.

Colpodota piccorufa

Allongée, assez étroite, subfusiforme, légèrement convexe, très-finement et densément pubescente, d'un roux de poix un peu brillant, avec la tête rembrunie, les antennes ferrugineuses, la base de celles-ci, la bouche et les pieds testacés, et l'extrémité de l'abdomen d'un roux testacé. Tête obsolètement pointillée sur ses côtés, presque lisse sur son milieu. Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, avec le troisième article à peine moins long que le deuxième, le quatrième à peine, les cinquième à dixième fortement transverses. Prothorax fortement transverse, assez convexe, un peu rétréci en avant, aussi large en arrière que les élytres, modérément arqué latéralement, faiblement sinué sur les côtés de sa base, très-finement et densément pointillé. Élytres très-fortement transverses, de la longueur du prothorax, subdéprimées, finement, dense-

ment et subruguleusement pointillées. Abdomen assez fortement atténué en arrière, longuement et subégalement pubescent, assez fortement sétosellé, finement et densément pointillé vers sa base, plus parcimonieusement vers son extrémité. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0020 (1 l. à peine); — larg., 0^m,0004 (1/5 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été capturée dans les environs de Lyon.

Colpodota subgrisescens

Allongée, subfusiforme, peu convexe, très-finement et densément pubescente, d'un noir peu brillant, avec la bouche, la base des antennes et le sommet de l'abdomen d'un brun de poix un peu roussâtre, et les pieds testacés. Tête finement et modérément ponctuée, plus parcimonieusement sur son milieu. Antennes sensiblement épaissies vers son extrémité, légèrement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième légèrement, le cinquième sensiblement, les sixième à dixième assez fortement transverses. Prothorax assez fortement transverse, subconvexe, un peu rétréci en avant, médiocrement arqué latéralement, aussi large en arrière que les élytres, sensiblement sinué de chaque côté de sa base, très-finement et densément pointillé. Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement, densément et subruguleusement ponctuées. Abdomen assez fortement atténué vers son extrémité, subégalement pubescent, fortement sétosellé, finement et densément ponctué vers sa base, un peu moins densément en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0,0023 (1 l.); — larg., 0,0006 (1/4 l. à peine).

PATRIE. Cette espèce est rare. Elle a été prise en août, dans le Beaujolais, à la racine des champignons, surtout de l'*Agaricus aurantiacus* Dc.

Colpodota lacertosa

Suballongée, fusiforme, légèrement convexe, très-finement et assez densément pubescente, d'un noir assez brillant, avec la bouche, la base des antennes, les élytres et le sommet de l'abdomen d'un brun de poix, et les pieds testacés. Tête très-finement et densément pointillée. Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, brièvement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième à peine, les cinquième à dixième assez fortement transverses. Prothorax assez fortement transverse, assez convexe, sensiblement rétréci en avant, médiocrement arqué sur les côtés, aussi large en arrière que les élytres, à peine sinué de chaque côté de sa base, très-finement et densément pointillé. Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, très-faiblement convexes, finement et densément pointillées. Abdomen fortement atténué vers son extrémité, longuement et subégalement pubescent, fortement sétosellé, finement et densément ponctué vers sa base, plus parcimonieusement en arrière. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0017 (3/4 l.); — larg., 0^m,0004 (1/5 l.).

PATRIE. Cette espèce a été trouvée, en juin, dans la basse Bourgogne, aux environs de Cluny, sous les mousses humides.

Colpodota (Acrotona) negligens

Suballongée, fusiforme, subconvexe, finement et modérément pubescente, d'un noir brillant, avec les côtés du prothorax d'un roux de poix, les élytres châtaines, la bouche, les antennes et les pieds d'un roux testacé clair. Tête finement et subéparsément ponctuée. Antennes assez courtes, légèrement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, les quatrième et cinquième presque carrés, les sixième et septième à peine, les huitième à dixième visiblement transverses. Prothorax assez fortement transverse, assez convexe, un peu plus étroit en avant, sensiblement arqué latéralement, aussi large que les élytres, à peine sinué sur les côtés de sa base, souvent fovéolé au devant de l'écus-

son, finement, assez densément et subobsolement pointillé. Élytres fortement transverses, subdéprimées, un peu plus longues que le prothorax, finement, densément et subruguleusement ponctuées. Abdomen sensiblement atténué vers son extrémité, à peine pubescent en arrière, éparsément sétosellé, finement et densément ponctué vers la base, parcimonieusement sur le quatrième segment, très-peu sur le cinquième, assez densément sur le sixième. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0026 (à peine 1 1/4 l.); — long., 0^m,0007 (1/3 l.).

PATRIE : Cette espèce se trouve, parmi les détritus végétaux, dans la Provence, et quelquefois aussi dans les environs de Lyon. Elle est assez rare.

Colpodota (Acrotona) laeticornis

Suballongée, subfusiforme, subconvexe, finement et subéparsément pubescente, avec les élytres d'un brun de poix, la bouche, les antennes et les pieds testacés. Tête finement et parcimonieusement ponctuée. Antennes assez courtes, légèrement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées, à troisième article à peine moins long que le deuxième, les quatrième et cinquième suboblongs, les sixième et septième à peine, les huitième à dixième légèrement transverses. Prothorax fortement transverse, subconvexe, un peu rétréci en avant, fortement arqué sur les côtés, aussi large que les élytres, très-faiblement sinué de chaque côté de sa base, finement et assez densément ponctué. Élytres très-fortement transverses, à peine plus longues que le prothorax, subdéprimées, assez finement, assez densément et râpeusement ponctuées. Abdomen sensiblement atténué vers son extrémité, presque glabre en arrière, éparsément sétosellé sur les côtés, finement et assez densément ponctué vers sa base, parcimonieusement ponctué ou presque lisse postérieurement. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0026 (à peine 1 1/4 l.); — larg., 0^m,0007 (1/3 l.).

PATRIE. Cette espèce est rare en France. Elle a été prise au mont Dore (Auvergne), parmi les lichens des sapins, dans les forêts des environs de

Cluny (Saône-et-Loire), dans les environs du Hâvre et dans d'autres localités froides ou boisées.

Colpodota (Acrotona) navicula

Suballongée, fusiforme, subdéprimée, très-finement et assez densément pubescente, d'un noir assez brillant, avec la base des antennes, la bouche et les élytres brunâtres, et les pieds testacés. Tête finement et assez densément pointillée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, à premier article médiocrement renflé, les deuxième et troisième subégaux, le quatrième légèrement, les cinquième à dixième assez fortement transverses. Prothorax assez fortement transverse, légèrement convexe, un peu rétréci en avant, médiocrement arqué sur les côtés, aussi large que les élytres, subsinué de chaque côté de sa base, subfovéolé et subsilloné au devant de l'écusson, finement et densément pointillé. Élytres fortement transverses, à peine plus longues que le prothorax, subdéprimées, assez finement et densément pointillées. Abdomen assez sensiblement atténué vers son extrémité, parcimonieusement pilosellé, à pubescence moins serrée en arrière, finement et densément ponctué vers sa base, peu sur le quatrième segment, presque lisse sur le cinquième. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0021 (1 l.); — larg., 0^m,0005 (1/4 l.).

PATRIE. Cette espèce est rare. Elle se trouve, parmi les feuilles mortes, dans les environs de Lyon et dans le Beaujolais.

Colpodota (Solenia) simulans

Suballongée, subfusiforme, assez convexe, finement et modérément pubescente, d'un noir brillant, avec le sommet de l'abdomen couleur de poix, la bouche, les antennes et les pieds d'un roux ferrugineux. Tête finement et éparsément ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, les quatrième et cinquième suboblongs, les sixième à dixième aussi

longs que larges. Prothorax assez fortement transverse, sensiblement convexe, fortement rétréci en avant, médiocrement arqué latéralement, aussi large en arrière que les élytres, non visiblement sinué sur les côtés de sa base, légèrement canaliculé sur sa ligne médiane, finement et densément ponctué. Élytres assez fortement transverses, à peine plus longues que le prothorax, légèrement convexes, finement et densément ponctuées. Abdomen subatténué vers son extrémité, éparsément sétosellé sur les côtés, finement et modérément ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0029 (1 1/3 l.); — larg., 0^m,0008 (un peu plus de 1/3 l.).

PATRIE. Cette espèce a été prise dans les grottes crayeuses des environs de Dieppe (Normandie).

Ebadura nudicornis

Suballongée, subfusiforme, peu convexe, très-finement et densément pubescentes, distinctement sétosellées sur les côtés, d'un noir peu brillant, avec les élytres d'un brun roussâtre, les antennes brunâtres, la bouche et les pieds d'un roux de poix. Tête finement et densément ponctuée. Antennes allongées, grêles, faiblement épaissies vers leur extrémité, à peine pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième presque carré, les cinquième à dixième à peine transverses. Prothorax légèrement transverse, un peu moins large que les élytres, faiblement arqué sur les côtés, obsolètement sillonné-caniculé sur sa ligne médiane, finement et très-densément ponctué. Élytres assez fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement, très-densément et subrugueusement ponctuées. Abdomen sensiblement atténué vers son extrémité, fortement sétosellé, finement et densément ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs assez allongés, un peu moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0027 (1 1/4 l.); — larg., 0^m,0005 (1/4 l.).

PATRIE. Cette espèce a été prise dans les environs de Lyon, parmi les détritux végétaux charriés par le Rhône. Elle est très-rare.

Microdota (Hilara) fulva

Allongée, sublinéaire, légèrement convexe, très-finement et peu pubescente, d'un roux ferrugineux brillant, avec la tête, la poitrine et une large ceinture abdominale d'un noir de poix, la base des antennes, la bouche et les pieds testacés. Tête à peine pointillée ou presque lisse. Antennes suballongées, sensiblement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, à troisième article un peu plus court que le deuxième, le quatrième médiocrement, les cinquième à dixième fortement transverses. Prothorax sensiblement transverse, plus étroit en avant, un peu moins large que les élytres, visiblement arqué sur les côtés, très-finement et subéparsément pointillé. Élytres assez fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, à peine convexes, finement et densément pointillées. Abdomen subparallèle, obsolètement sétosellé, finement et parcimonieusement pointillé vers sa base, très-peu en arrière. Tarses postérieurs peu allongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0017 (4/5 l.); — larg., 0^m,00037 (1/6 l.).

PATRIE : Cette espèce est très-rare. Elle a été prise à la Grande-Char treuse.

Microdota (Philhygra) perdubia

Allongée, linéaire, subdéprimée, très-finement et densément pubescente, d'un noir brillant, avec les antennes obscures, la bouche d'un roux de poix et les pieds testacés. Tête légèrement ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, à peine pilosellées, à troisième article un peu moins long que le deuxième, les quatrième et cinquième sensiblement, les sixième à dixième fortement transverses. Prothorax assez fortement transverse, presque aussi large que les élytres, presque droit sur les côtés, subfovéolé vers sa base, obsolètement et densément pointillé. Élytres presque carrées, beaucoup plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et très-densément pointillées. Abdomen subparallèle, à peine sétosellé,

finement et densément pointillé vers sa base, presque lisse en arrière, à cinquième segment sensiblement plus long que les précédents. Tarses postérieurs suballongés, moins longs que les tibias.

Long.: 0^m,0027 (1 1/4 l.); — larg., 0^m,0005 (1/4 l.):

PATRIE. Cette espèce a été trouvée parmi les débris charriés par le Rhône, aux environs de Lyon. Elle est très-rare.

Microdota (Philhygra) obscura

Allongée, linéaire, subdéprimée, finement et modérément pubescente, d'un noir brillant, avec la bouche et les antennes d'un roux brunâtre, et les pieds testacés. Tête lisse ou presque lisse. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, obsolètement pilosellées, avec le troisième article un peu moins long que le deuxième, le quatrième à peine, les cinquième à dixième sensiblement transverses. Prothorax assez fortement transverse, presque aussi large que les élytres, subarqué sur les côtés, obsolètement fovéolé vers sa base, très-finement, obsolètement et densément pointillé. Élytres à peine transverses, beaucoup plus longues que le prothorax, déprimées, très-finement, légèrement et densément pointillées. Abdomen subparallèle, à peine sétosellé, finement et densément ponctué vers sa base, presque lisse en arrière, à cinquième segment sensiblement plus long que les précédents. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0026 (1 1/5 l.); — larg., 0^m,0005 (1/4 l.).

PATRIE : Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les environs de Lyon, parmi les feuilles mortes et mouillées.

Microdota brunnipes

Assez allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et peu densément pubescente, d'un noir de poix brillant, avec l'extrémité des élytres et les pieds brunâtres, et les tarses testacés. Tête obsolètement et subéparsément

ponctuée. Antennes à peine épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées, à troisième article assez allongé, un peu moins long et plus grêle que le deuxième, le quatrième suboblong, les cinquième à dixième médiocrement transverses. Prothorax assez fortement transverse, un peu moins large que les élytres, légèrement arqué sur les côtés, obsolètement fovéolé vers sa base, très-finement et assez densément ponctué. Élytres assez fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, très-finement chagrinées et en outre finement et assez densément ponctuées. Abdomen à peine atténué vers son extrémité, légèrement sétosellé, finement et très-parcimonieusement ponctué ou presque lisse, à cinquième segment subégal aux précédents. Tarses postérieurs assez allongés, un peu moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0027 (1 1/4 l.); — larg., 0^m,0007 (1/3 l.).

PATRIE : Cette espèce est très-rare. Elle se trouve dans les environs de Lyon.

Microdota parvicornis

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et subéparsement pubescente, d'un noir de poix assez brillant, avec la bouche, la base des antennes et les pieds testacés. Tête très-finement et éparsement ponctuée sur les côtés, lisse et impressionnée sur son milieu. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, à troisième article oblong, obconique, sensiblement plus court et plus grêle que le deuxième, le quatrième légèrement, les sixième à dixième fortement transverses. Prothorax assez fortement transverse, un peu moins large que les élytres, subrétréci en arrière, sensiblement arqué sur les côtés, à peine impressionné vers sa base, finement et densément ponctué. Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et densément ponctuées. Abdomen subparallèle, légèrement pilosellé, finement et assez densément ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0016 (3/4 l.); — larg., 0^m,00035 (1/6 l.).

PATRIE. Cette espèce est rare. Elle se prend dans les champignons et sous les mousses décomposées, dans les environs de Lyon, le Beaujolais et la Bourgogne.

Microdota asperana

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et assez densément pubescente, d'un noir de poix brillant avec les élytres brunes, la bouche et les antennes obscures, et les pieds testacés. Tête finement et assez densément ponctuée, subfovéolée sur son milieu. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, à troisième article oblong, un peu moins long que le deuxième, le quatrième légèrement, les sixième à dixième fortement transverses. Prothorax médiocrement transverse, un peu moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, subimpressionné vers sa base, finement canaliculé sur sa ligne médiane, assez finement, densément et subaspèremment ponctué. Élytres à peine transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, déprimées, assez finement, densément et subaspèremment ponctuées. Abdomen à peine atténué vers son extrémité, distinctement sétosellé, finement et parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0028 (1 1/4 l.); — larg., 0^m,0004 (1/5 l.).

PATRIE. Cette espèce a été prise sous les mousses, dans les collines des environs de Lyon.

Microdota sericea

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et peu densément pubescente, d'un noir brillant, avec les élytres d'un brun de poix, la bouche d'un roux obscur et les pieds d'un testacé clair. Tête très-finement et éparsément pointillée sur les côtés, lisse et souvent subfovéolée sur son milieu. Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées, à troisième article à peine oblong, sensiblement plus court que le deuxième,

le quatrième sensiblement, les sixième à dixième fortement transverses. Prothorax assez fortement transversé, un peu moins large que les élytres, faiblement arqué sur les côtés, obsolètement fovéolé vers sa base, parfois finement canaliculé sur sa ligne médiane, très-finement et assez densément pointillé. Élytres assez fortement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et assez densément pointillées. Abdomen à peine atténué vers son extrémité, faiblement sétosellé, finement et parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0017 (4/5 l.); — larg., 0^m,00035 (1/6 l.).

PATRIE. Cette espèce est commune, au printemps et à l'automne, sous les détritux végétaux, dans presque toute la France : les environs de Paris et de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, la Provence, etc.

Ceritaxa spissata

Allongée, sublinéaire, subconvexe, finement et peu densément pubescente, d'un noir de poix brillant, avec la bouche et la base des antennes d'un roux de poix, et les pieds testacés. Tête obsolètement pointillée. Antennes fortement et brusquement épaissies dès le cinquième article en massue subcylindrique, distinctement pilosellées, à troisième article à peine oblong, sensiblement moins long que le deuxième, le quatrième fortement, les cinquième à dixième très-fortement transverses, presque perfoliés. Prothorax assez fortement transverse, un peu moins largé que les élytres, à peine rétréci en avant, à peine arqué sur les côtés, peu convexe, subfovéolé vers sa base, obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane, finement, très-légalement et assez densément pointillé. Élytres médiocrement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subconvexes intérieurement, finement et densément pointillées. Abdomen à peine atténué vers son extrémité, éparcement sétosellé, finement et assez parcimonieusement pointillé vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0020 (1 l. à peine); — larg., 0^m,0004 (1/5 l.).

PATRIE. Cette espèce se trouve dans les forêts, dans le pédoncule des champignons. Elle est peu commune. Elle se rencontre dans la Bourgogne et le Beaujolais.

Homalota (Dimetrota) Lactipes

Allongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et densément pubescente, d'un noir peu brillant, avec le prothorax moins foncé, les élytres et la base de l'abdomen d'un roux brunâtre, la bouche et la base des antennes testacés et les pieds pâles. Tête finement et légèrement pointillée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, obsolètement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième transverse, le cinquième carré, les sixième à dixième légèrement transverses. Prothorax subtransverse, évidemment moins large que les élytres, à peine arqué sur les côtés, subfovolé vers sa base, finement et densément pointillé. Élytres transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et densément ponctuées. Abdomen subatténué vers son extrémité, à peine sétosellé vers son sommet, finement et assez densément ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0030 (1 1/3 l.); — larg., 0^m,0006 (1/4 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été trouvée en Provence, sous les détritits marins.

Homalota (Dimetrota) tristricula

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et peu densément pubescente, d'un noir assez brillant, avec la bouche, les antennes et les élytres brunâtres, et les pieds d'un testacé de poix. Tête finement et subéparcement ponctuée. Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, les quatrième

et cinquième presque carrés, les sixième à dixième à peine transverses. Prothorax fortement transverse, à peine moins large que les élytres, sensiblement arqué sur les côtés, finement et obsolètement sillonné sur son milieu, finement et assez densément ponctué. Élytres assez fortement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement, subrugueusement et densément ponctuées. Abdomen subatténué vers son extrémité, assez fortement sétosellé, assez parcimonieusement ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs assez allongés, un peu moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0034 (1 1/2 l.); — larg., 0^m,00075 (1/3 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été recueillie dans le Beaujolais, sous les feuilles mortes.

Homalota (Alaobia) nutans

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et densément pubescente, d'un noir assez brillant, avec le prothorax brunâtre, les élytres et le sommet de l'abdomen d'un brun roussâtre, les antennes rousses, la base de celles-ci et la bouche d'un roux testacé, et les pieds testacés. Tête finement et densément pointillée. Antennes sensiblement et également épaissies dès le cinquième article, légèrement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième fortement, les cinquième à dixième très-fortement transverses. Prothorax court, fortement transverse, subrétréci en arrière, à peine moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, à peine impressionné vers sa base, très-finement et densément pointillé. Élytres fortement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, déprimées, finement, densément et ruguleusement ponctuées. Abdomen à peine atténué vers son extrémité, légèrement sétosellé vers son sommet, finement et densément pointillé sur les trois premiers segments, distinctement sur les quatrième et sixième, presque lisse sur le cinquième. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0025 (1 1/7 l.); — larg., 0^m,0004 (1/5 l.).

PATRIE. Cette espèce a été prise parmi les mousses, dans les collines du Lyonnais, où elle est très-rare.

Homalota (Alaobia) taedula

Suballongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et densément pubescente, d'un noir un peu brillant, avec les élytres brunâtres, la bouche et les pieds d'un testacé de poix. Tête finement et assez densément pointillée. Antennes assez sensiblement et subégalelement épaissies dès leur cinquième article, distinctement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles oblongs, subégaux, le quatrième fortement, les cinquième à neuvième très-fortement transverses, le dixième à peine moins court. Prothorax fortement transverse, non rétréci en avant, un peu moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, obsolètement sillonné vers sa base, finement et densément ponctué. Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et densément ponctuées. Abdomen subatténué vers son extrémité, éparsément sétosellé, finement et densément pointillé sur les trois premiers segments, éparsément sur le quatrième, presque lisse sur le cinquième. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0,0018 (4/5 l.); — larg., 0,0004 (1/5 l.).

PATRIE. Cette espèce est assez rare. Elle a été capturée dans les environs de Lyon et dans le Beaujolais, parmi les détritux végétiaux.

Homalota (Atheta) decepta

Suballongée, peu convexe, finement et densément pubescente, d'un noir assez brillant, avec les élytres d'un testacé obscur, la bouche, la base des antennes et les pieds testacés. Tête finement et assez densément ponctuée. Antennes peu robustes, sensiblement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, à troisième article évidemment plus long que le deuxième, le quatrième légèrement, les cinquième à neuvième fortement, le dixième

moins fortement transverses. Prothorax assez fortement transverse, à peine moins large que les élytres, faiblement arqué sur les côtés, à peine impressionné vers sa base, finement et densément ponctué. Élytres assez fortement transverses, évidemment plus longues que le prothorax, très-faiblement convexes, assez finement et densément ponctuées. Abdomen subatténué en arrière, légèrement sétosellé, finement et assez densément ponctué sur les quatre premiers segments, parcimonieusement mais distinctement sur le cinquième, celui-ci subégal au précédent. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0,0034 (1 1/2 l.); — larg., 0,0008 (1/3 l. fort).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été prise, en mai, à Lons-le-Saunier, sous les pierres, avec les fourmis, et aussi à Izeron (Rhône), dans les mêmes circonstances.

Homalota (Atheta) fulvipennis

Suballongée, sublinéaire, peu convexe, finement et légèrement pubescente, d'un noir brillant, avec les élytres d'un roux fauve, la bouche, la base des antennes et les pieds testacés. Tête à peine ponctuée. Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, médiocrement pilosellées, avec le troisième article subégal au deuxième, les quatrième à peine, les cinquième à dixième sensiblement transverses. Prothorax fortement transverse, à peine moins large que les élytres, presque droit sur les côtés, subimpressionné vers sa base, finement et densément pointillé. Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, faiblement convexes intérieurement, finement, densément et subrugueusement ponctuées. Abdomen subparallèle ou à peine atténué vers son extrémité, légèrement sétosellé vers son sommet, finement et assez densément ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés.

Long., 0^m,0029 (1 1/3 l.); — larg., 0^m,0007 (1/3 l.).

PATRIE Cette espèce a été prise en Angleterre, dans les environs de Londres.

Homalota ebenina

Allongée, assez étroite, sublinéaire, peu convexe, finement et assez densément pubescente, d'un noir brillant, avec les élytres à peine moins foncées, la bouche et la base des antennes d'un roux de poix, et les pieds d'un roux testacé. Tête finement et subéparsément ponctuée. Antennes assez robustes, assez fortement épaissies vers leur extrémité dès le cinquième article, sensiblement pilosellées, à troisième article un peu plus long que le deuxième, le quatrième subtransverse, les cinquième à dixième assez fortement transverses, le dernier ovalaire-oblong ou conique. Prothorax transverse, non rétréci en arrière, à peine moins large que les élytres, à peine arqué sur les côtés, subimpressionné vers sa base, finement et assez densément ponctué. Élytres médiocrement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, très-faiblement convexes, assez finement et densément ponctuées. Abdomen subparallèle, à peine sétosellé, finement et parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, un peu moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0037 (1 3/4 l.) ; — larg., 0^m,0007 (1/3 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été prise à la Grande-Chartreuse, dans le voisinage d'un nid de *formica rufa*.

Homalota interrupta

Allongée, assez large, subfusiforme, subdéprimée, finement et peu densément pubescente, d'un noir brillant et submétallique, avec le disque des élytres d'un testacé obscur, la base des antennes et les pieds testacés. Tête finement et éparsément ponctuée. Antennes assez robustes, assez fortement épaissies vers leur extrémité dès le cinquième article, assez fortement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le qua-

trième subtransverse, les cinquième à dixième assez fortement transverses, le dernier suballongé. Prothorax assez fortement transverse, non rétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, transversalement impressionné vers son tiers postérieur, finement et assez densément ponctué. Élytres médiocrement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, déprimées, assez finement et densément ponctuées. Abdomen subatténué postérieurement, éparsément sétosellé, parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0035 (1 2/3 l.); — larg., 0^m,0008 (1/3 l. fort).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les environs de Lyon dans une souche cariée, en compagnie de la *Myrmica caespitum*. Latreille.

Homalota foliorum

Allongée, peu convexe, finement et assez densément pubescente, d'un noir brillant submétallique, avec le premier article des antennes, les pieds et les élytres d'un testacé de poix, celles-ci largement rembrunies vers l'écusson et vers les angles postérieurs. Tête finement et modérément ponctuée, presque lisse sur son milieu. Antennes peu robustes, légèrement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, avec le troisième article à peine plus long que le deuxième, les quatrième et cinquième presque carrés, les sixième et septième légèrement, les huitième à dixième sensiblement transverses. Prothorax transverse, non rétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, légèrement arqué sur les côtés, légèrement foveolé vers sa base, finement et assez densément ponctué. Élytres sensiblement transverses, évidemment plus longues que le prothorax, subdéprimées, assez finement et densément ponctuées. Abdomen subatténué postérieurement, distinctement sétosellé, finement et assez parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0037 (1 2/3 l.); — larg., 0^m,0009 (1/2 l. à peine).

PATRIE. Cette espèce est médiocrement commune. Elle se prend sous les feuilles mortes, dans les bois des environs de Lyon et du Beaujolais.

Homalota robusta

Allongée, peu convexe, finement et assez densément pubescente, d'un noir brillant, avec les élytres et le sommet de l'abdomen brunâtres, la base des antennes d'un roux de poix, et les pieds testacés. Tête finement et modérément ponctuée sur ses côtés, presque lisse sur son milieu. Antennes assez robustes, assez sensiblement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, avec le troisième article un peu plus long que le deuxième, le quatrième presque carré, le cinquième à peine plus long que large, un peu plus épais que le suivant, les sixième à dixième à peine ou légèrement transverses. Prothorax transverse, à peine rétréci en arrière, sensiblement moins large que les élytres, faiblement arqué sur les côtés, distinctement fovéolé vers sa base, finement et assez densément ponctué. Élytres sensiblement transverses, évidemment plus longues que le prothorax, subdéprimées, assez finement, densément et subruguleusement ponctuées. Abdomen subatténué postérieurement, distinctement sétosellé, finement et très-parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Lane mésosternale sans rudiment de carène à sa base. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0043 (2 l.); — larg., 0^m,0011 (1/2 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les collines du Lyonnais, en compagnie de la *formica fuliginosa*.

Dinaraea (Aglypha) melanocornis

Allongée, linéaire, déprimée, finement et modérément pubescente, d'un noir assez brillant, avec la bouche brunâtre, et les pieds d'un roux de poix. Tête finement et médiocrement ponctuée, subsillonnée sur son milieu. Antennes visiblement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosel-

lées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, les quatrième et cinquième médiocrement, les septième à dixième fortement transverses. Prothorax transverse, à peine rétréci en arrière, un peu moins large à sa base que les élytres, assez largement sillonné sur sa ligne médiane, finement et assez densément ponctué. Élytres assez fortement transverses, à peine plus longues que le prothorax, déprimées, assez finement, subaspèremment et densément ponctuées. Abdomen subparallèle, fortement pilosellé vers son extrémité, finement et modérément ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, à dernier article deux fois aussi long que le premier.

Long., 0^m,0033 (1 1/2 l.); — larg., 0^m,0007 (1/3 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans le tronc caverneux d'un vieux chêne, dans les collines des environs de Lyon.

Dinaraea (Glaphya) pubes

Allongée, linéaire, subdéprimée, finement, assez longuement et peu densément pubescente, d'un noir brillant, avec le sommet de l'abdomen d'un roux de poix, la bouche, les antennes et les pieds d'un roux testacé. Tête assez fortement ponctuée, subconvexe, unie. Antennes visiblement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, à deuxième et troisième articles subégaux, les cinquième et sixième à peine, les septième à dixième fortement transverses. Prothorax transverse, visiblement rétréci en arrière, à peine moins large en avant que les élytres, à peine fovéolé vers sa base, finement, obsolètement et assez densément pointillé. Élytres assez fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, assez finement et assez densément ponctuées. Abdomen subparallèle, légèrement sétosellé sur les côtés, finement et assez parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, à dernier article deux fois aussi long que le premier.

Long., 0^m,0030 (1 1/3 l.); — larg., 0^m,00055 (1/4 l.).

PATRIE. Cette espèce habite la Normandie, sur les bords de la mer.

Plataraca geniculata

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et peu densément pubescente, d'un noir assez brillant, avec les genoux et les tarses roussâtres. Tête légèrement et obsolètement ponctuée sur les côtés, subfovéolée sur son milieu. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, avec les deuxième et troisième articles subégaux, les quatrième et cinquième non, les sixième à dixième légèrement ou médiocrement transverses. Prothorax transverse, à peine rétréci en arrière, évidemment moins large que les élytres, à peine sur les côtés, transversalement impressionné vers sa base, obsolètement et assez densément ponctué. Élytres transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement, densément et subaspèremment pointillées. Abdomen subparallèle, obsolètement sétosellé, presque lisse ou à peine et subaspèremment ponctué. Tarses postérieurs assez allongés.

Long., 0^m,0038 (1 3/4 l.); — larg., 0^m,0010 (1/2 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les environs d'Izeron (montagnes du Lyonnais).

Halobrechtia halensis

Allongée, subinéaire, peu convexe, finement et modérément pubescente, avec la pubescence d'un blond cendré, d'un noir brillant, avec les élytres et le sommet de l'abdomen d'un roux de poix, la bouche, la base des antennes et les pieds testacés. Tête fovéolée sur son milieu, fortement et assez densément ponctuée. Antennes assez fortement épaissies vers leur extrémité, fortement pilosellées, avec le troisième article à peine moins long que le deuxième, les septième à dixième fortement transverses. Prothorax transverse, évidemment moins large que les élytres, obsolètement bissilloné à sa base, finement, assez densément et obsolètement pointillé. Élytres subtransverses, un peu plus longues que le prothorax, très-faiblement convexes, assez finement et densément ponctuées. Abdomen subparal-

lèle, parcimonieusement ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0032 (1 1/2 l.); — larg., 0^m,0007 (1/3 l.).

PATRIE. Cette espèce se trouve dans le Languedoc, sous les détritux du bord de la mer. Elle est rare.

Ouralia picicornis

Allongée, assez étroite, sublinéaire, subdéprimée, très-finement mais peu pubescente, d'un noir brillant, avec la bouche et les antennes d'une couleur de poix subtestacée, et les pieds plus pâles. Tête presque lisse. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellés, à troisième article sensiblement plus court que le deuxième, les sixième à dixième courts, fortement transverses. Prothorax transverse, subrétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, à peine impressionné vers sa base, à peine ponctué ou presque lisse. Élytres presque carrées, sensiblement plus longues que le prothorax, très-finement, peu densément et obsolètement pointillées. Abdomen subparallèle, presque lisse ou à peine pointillé.

Long., 0^m,0016 (3/4 l.); — larg., 0^m,00035 (1/6 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les environs de Lyon, parmi les détritux végétaux en décomposition.

Meotica parasita

Allongée, étroite, linéaire, subdéprimée, très-finement et assez densément pubescente, d'un brun de poix assez brillant, avec le sommet de l'abdomen d'un roux testacé, la bouche, les antennes et les pieds testacés. Tête très-finement et densément pointillée. Yeux médiocres. Antennes assez fortement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées, à troisième article petit, beaucoup plus court et plus grêle que le deuxième : les sixième

à dixième très-courts, très-fortement transverses. Prothorax légèrement transverse, à peine rétréci en arrière, à peine moins large que les élytres, presque droit sur les côtés, à peine convexe, très-finement et obsolètement pointillé. Élytres presque carrées, un peu plus longues que le prothorax, déprimées, finement et très-densement pointillées. Abdomen subparallèle, à peine moins large que les élytres, très-finement et densement pointillé vers sa base, lisse ou presque lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, moins longs que les tibias.

Long., 0,0016 (3/4 l.); — larg., 0,0003 (1/6 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été trouvée en juin, dans le Bugey, dans le voisinage d'une fourmilière.

Meotica parilis

Allongée, linéaire, subdéprimée, très-finement et modérément pubescente, d'un noir ou d'un brun de poix brillant, avec les élytres châtaines, l'extrémité de l'abdomen et les antennes roussâtres, la base de celles-ci, la bouche et les pieds testacés. Tête très-finement et densement pointillée. Yeux médiocres. Antennes assez fortement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, à troisième article petit, beaucoup plus court et plus grêle que le deuxième, les cinquième à dixième très-courts, très-fortement transverses. Prothorax légèrement transverse, à peine rétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, à peine arqué sur les côtés, faiblement convexe, très-finement et densement pointillé. Élytres sensiblement transverses, à peine plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et densement pointillées. Abdomen à peine élargi postérieurement, à peine moins large que les élytres, très-finement et assez densement pointillé vers sa base, à peine pointillé ou presque lisse en arrière.

Long., 0^m,0016 (3/4 l.); — larg., 0^m,00035 (1/6 l.).

PATRIE. Cette espèce est peu commune. Elle se rencontre dans les

mousses et quelquefois dans les nids de la *formica rufa*, dans les environs de Lyon, dans la Bourgogne, à la Grande-Chartreuse.

Meotica misera

Allongée, linéaire, subdéprimée, très-finement et assez densément pubescente, d'un roux brunâtre ou châtain assez brillant, avec la tête et une ceinture abdominale rembrunies, la bouche, les antennes, les pieds et l'extrémité de l'abdomen testacés. Tête très-finement et densément pointillée. Yeux médiocres. Antennes assez fortement épaissies vers leur extrémité, très-légèrement pilosellées, avec le troisième article beaucoup plus court et plus grêle que le deuxième, les cinquième à dixième très-courts, très-fortement transverses. Prothorax assez fortement transverse, un peu rétréci en arrière, de la largeur des élytres, légèrement arqué sur les côtés, à peine convexe, très-finement et densément pointillé. Élytres assez fortement transverses, de la longueur du prothorax, déprimées, finement et densément pointillées. Abdomen parallèle, à peine moins large que les élytres, très-finement et densément pointillé vers sa base, presque lisse postérieurement. Tarses postérieurs suballongés, moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0012 (1/2 l.) ; — larg., 0^m,0003 (1/7 l.).

PATRIE. Cette espèce est rare. On la trouve aux environs de Lyon et dans le Beaujolais, sur les bords de la Saône.

Meotica (Cryptusa) capitalis

Allongée, linéaire, faiblement convexe, très-finement et assez densément pubescente, d'un noir de poix assez brillant, avec les élytres brunâtres, l'extrémité et les intersections de l'abdomen d'un roux testacé, la bouche, les antennes et les pieds testacés. Tête transverse, large, distinctement sillonnée sur son milieu, densément et obsolètement pointillée. Yeux petits, obsolètes. Antennes courtes, fortement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées, à troisième article ablong, plus court

que le deuxième, les cinquième à dixième courts, fortement transverses. Prothorax subtransverse, non ou à peine rétréci en arrière, à peine moins large que les élytres, à peine arqué sur les côtés, faiblement convexe, sans impression basilaire sensible, très-finement, densément et obsolètement pointillé. Élytres sensiblement transverses, de la longueur du prothorax, à peine convexes, très-finement et densément pointillées. Abdomen subparallèle, un peu moins large que les élytres, finement et assez densément pointillé vers sa base, presque lisse vers son extrémité. Tarses postérieurs suballongés, moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0014 (2/3 l.) ; — larg., 0^m,0003 (1/7 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été capturée dans les environs de Lyon, dans la terre, sous un fagotier.

Amischa arata

Allongée, sublinéaire, subconvexe, très-finement et assez densément pubescente, d'un noir brillant, avec les antennes d'un roux obscur, la base de celles-ci, la bouche, les pieds et l'extrémité de l'abdomen d'un roux testacé. Tête finement et assez densément pointillée. Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, à peine pilosellées, à troisième article évidemment moins long que le deuxième, les cinquième à dixième médiocrement transverses. Prothorax médiocrement transverse, un peu moins large que les élytres, légèrement arqué sur les côtés, assez convexe, fovéolé vers sa base et en outre finement canaliculé sur sa ligne médiane, finement et densément pointillé. Élytres assez fortement transverses, de la longueur du prothorax, faiblement convexes, assez finement et densément pointillées. Abdomen subparallèle, un peu moins large que les élytres, légèrement sétosellé vers son sommet, finement et densément ponctué, à peine moins en arrière. Tarses postérieurs suballongés, moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0025 (1 1/7 l.) ; — larg., 0^m,0005 (1/4 l.).

PATRIE. Cette espèce est rare. Elle a été trouvée dans les environs de Lyon, parmi les débris charriés par la Saône débordée.

Amischa forcipata

Allongée, sublinéaire, peu convexe, très-finement et assez densément pubescente, d'un noir brillant, avec les élytres à peine moins foncées, le sommet de l'abdomen d'un roux de poix, les antennes obscures, la base de celles-ci, la bouche et les pieds testacés. Tête très-finement, obsolètement et assez densément pointillée. Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées, à troisième article un peu moins long que le deuxième, les cinquième à dixième médiocrement transverses. Prothorax sensiblement transverse, à peine moins large que les élytres, assez arqué sur les côtés, peu convexe, subfovéolé vers sa base, très-finement et densément pointillé. Élytres fortement transverses, à peine aussi longues que le prothorax, très-faiblement convexes, finement et densément pointillées. Abdomen subparallèle, un peu moins large que les élytres, sétosellé vers son sommet, très-finement, densément et uniformément pointillé. Tarses postérieurs suballongés, moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0022 (1 l.); — larg., 0^m,0004 (1/5 l.).

PATRIE. Cette espèce se prend, mais rarement, parmi les mousses, les feuilles mortes, et parfois avec les fourmis, dans les environs de Lyon et dans le Beaujolais.

Amischa filum

Allongée, linéaire, subfiliforme, subdéprimée, finement et assez densément pubescente, d'un noir de poix assez brillant, avec le sommet de l'abdomen moins foncé, la bouche, les antennes et les pieds d'un testacé obscur. Tête subimpressionnée sur son milieu, obsolètement pointillée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, à peine pilosellées, à troisième article un peu plus court que le deuxième, les cinquième à dixième sensiblement

ou assez fortement transverses. Prothorax médiocrement transverse, à peine moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, peu convexe, assez fortement impressionné sur la dernière moitié de sa ligne médiane très-finement et très-densement pointillé. Élytres assez fortement transverses, de la longueur du prothorax, subdéprimées, finement et densement pointillées. Abdomen subparallèle, un peu moins large que les élytres, légèrement sétosellé vers son sommet, très-finement, densement et uniformément pointillé. Tarses postérieurs suballongés, moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0022 (1 l.); — larg., 0^m,0004 (1/3 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle se prend au printemps, sous les plantes marines, dans les environs d'Aiguemortes (Languedoc) et d'Hyères (Provence).

Amtscha minima

Allongée, linéaire, subconvexe, très-finement et assez densement pubescente, d'un noir de poix brillant, avec les élytres un peu moins foncées, l'extrémité de l'abdomen, la bouche et les antennes d'un roux de poix, la base de celles-ci et les pieds d'un testacé pâle. Tête très-finement et assez densement pointillée. Antennes très-faiblement épaissies vers leur extrémité, à peine pilosellées, à troisième article évidemment moins long que le deuxième, les cinquième à dixième sensiblement transverses. Prothorax assez fortement transverse, aussi large que les élytres, sensiblement arqué sur les côtés, assez convexe, légèrement fovéolé vers sa base, légèrement et densement pointillé. Élytres fortement transverses, à peine aussi longues que le prothorax, faiblement convexes, finement et densement pointillées. Abdomen subparallèle, aussi large que les élytres, légèrement sétosellé vers son sommet, très-finement et densement pointillé, à peine moins densement en arrière. Tarses postérieurs suballongés, moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0015 (3/4 l.); — larg., 0^m,00035 (1/6 l.).

PATRIE. Cette espèce se trouve, parmi les mousses et en fauchant les
SOC. LINN. — T. XX.

herbes sèches, dans les environs de Paris et de Lyon. Elle est bien moins commune que l'*Amischa analis*.

Bessobia nebulosa

Allongée, sublinéaire, peu convexe, finement et peu densément pubescente, d'un noir assez brillant, avec les élytres d'un brun un peu roussâtre, les antennes obscures, la bouche et les pieds d'un roux de poix. Tête fovéolée sur son milieu, obsolètement et éparsement ponctuée. Antennes assez légèrement épaissies vers leur extrémité, à peine pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, les sixième à dixième légèrement transverses. Prothorax sensiblement transverse, un peu moins large que les élytres, subimpressionné vers sa base, obsolètement sillonné en arrière sur sa ligne médiane, légèrement et assez densément pointillé. Élytres à peine transverses ou presque carrées, beaucoup plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et densément ponctuées. Abdomen subparallèle, obsolètement sétosellé vers son sommet, éparsement ponctué vers sa base, lisse ou presque lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0032 (1 1/2 l.) ; — larg., 0^m,0006 (1/3 l.).

PATRIE. Cette espèce a été prise sur le bord de la mer, dans les environs de Marseille où elle est assez rare.

Bessobia (Thrichiota) gibbera

Allongée, sublinéaire, peu convexe, finement et peu densément pubescente, d'un noir assez brillant et subplombé, avec les élytres et le sommet de l'abdomen brunâtres, la bouche et les pieds d'un roux de poix. Tête excavée ou sillonnée sur son milieu, éparsement ponctuée. Antennes assez robustes, assez fortement verticillées pilosellées, avec les deuxième et troisième articles oblongs, subégaux, les sixième et septième à peine, les huitième à dixième sensiblement transverses. Prothorax transverse, subré-

tréci en arrière, sensiblement moins large que les élytres, plus ou moins impressionné vers sa base, avec une légère bosse de chaque côté de l'impression, parfois distinctement sillonné sur sa ligne médiane, finement et densément ponctué. Élytres à peine transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées, obliquement subimpressionnées sur leur disque, finement et densément ponctuées. Abdomen subparallèle, éparquement sétosellé, très-parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs allongés, sensiblement moins longs que les tibias.*

Long., 0^m,0033 (1 1/2 l.); — larg., 0^m,00065 (1/3 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans le Beaujolais, parmi les détritux végétaux. M. Villard, entomologiste zélé de Lyon, nous en a communiqué un exemplaire que lui avait confié M. Muhlenbeck, naturaliste distingué de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin).

Metaxyia apricans

Allongée, assez large, sublinéaire, subdéprimée, finement et assez densément pubescente, d'un noir assez brillant, avec les élytres d'un brun roussâtre, la bouche, la base des antennes, les pieds et le sommet de l'abdomen d'un roux de poix testacé. Tête obsolètement fovéolée sur son milieu, à peine pointillée. Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, obsolètement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, les cinquième à neuvième à peine plus longs que larges, le dixième aussi large que long. Prothorax sensiblement transverse, à peine moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, fovéolé vers sa base, très-finement, très-légalement et densément pointillé. Élytres subtransverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et densément pointillées. Abdomen subparallèle, finement et densément pointillé, à peine moins densément en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0029 (1 1/3 l.); — larg., 0^m,0006 (1/3 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été capturée dans les environs d'Hyères (Provence).

Metaxya marina

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et assez densément pubescente, d'un noir assez brillant, avec les élytres d'un brun roussâtre, la bouche, les antennes, l'extrémité de l'abdomen et du ventre et les pieds d'un roux testacé. Tête à peine fovéolée sur son milieu, très-finement et densément ponctuée. Antennes à peine épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, les septième à dixième subtransverses. Prothorax subtransverse, à peine moins large que les élytres, impressionné vers sa base, obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane, très-finement et densément ponctué. Élytres sensiblement transverses, un peu plus longues que le prothorax, déprimées, très-finement et densément ponctuées. Abdomen subparallèle ou un peu atténué postérieurement, fortement sétosellé, finement et densément ponctué, avec la ponctuation graduellement un peu moins serrée en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0023 (1 l.); — larg., 0^m,0004 (1/5 l.).

PATRIE. Cette espèce est marine, de même que la précédente. Elle se prend en Provence et en Languedoc, sur les côtes de la Méditerranée, et dans la Flandre et la Normandie, sur les côtes de la Manche.

Disopora immatura

Allongée, sublinéaire, déprimée, finement et densément pubescente, d'un noir de poix brillant, avec les antennes et les élytres d'un testacé obscur, la bouche et les pieds plus pâles. Tête subimpressionnée sur son milieu, obsolètement et densément pointillée. Antennes sensiblement pilosellées, légèrement épaissies vers leur extrémité, à troisième article un peu moins long que le deuxième, les quatrième à sixième subcarrés, les septième à dixième visiblement transverses. Prothorax presque carré, subrétréci en

arrière, moins large que les élytres, absolument sillonné sur son milieu, très-finement et densément pointillé. Élytres presque carrées, évidemment plus longues que le prothorax, déprimées, très-finement et très-densément pointillées. Abdomen subparallèle, très-finement et assez densément pointillé, avec le cinquième segment lisse. Tarses postérieurs suballongés, beaucoup moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0027 (1 1/4 l.); — larg., 0^m,0005 (1/4 l.).

PATRIE. Cette espèce est rare. Elle se trouve parmi les mousses humides, dans les environs de Lyon et dans le Beaujolais.

Disopora (Aloconota) latesulcata

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et densément pubescente, d'un noir brillant, avec les élytres et le sommet de l'abdomen d'un brun de poix, les antennes d'un roux obscur, la bouche et les pieds testacés. Tête finement et densément pointillée, parfois (♂) subsillonnée sur son milieu ainsi que sur le vertex. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, à troisième article un peu moins long que le deuxième, les cinquième et sixième aussi larges que longs, les septième à dixième légèrement transverses. Prothorax subtransverse, visiblement rétréci en arrière, sensiblement moins large que les élytres, plus ou moins largement sillonné sur sa ligne médiane, très-finement et densément pointillé. Élytres légèrement transverses, évidemment plus longues que le prothorax, déprimées, finement et densément ponctuées. Abdomen subparallèle, éparsément sétosellé, finement et assez densément ponctué sur les trois premiers segments et sur le sixième, parcimonieusement sur le quatrième, très-peu sur le cinquième. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0032 (1 1/3 l.); — larg., 0^m,0006 (1/3 l.).

PATRIE. Cette espèce se prend, mais très-rarement, aux environs de Lyon, sur le bord des rivières.

Thinoecia libitina

Allongée, sublinéaire, déprimée, très-finement et densément pubescente, d'un noir brillant, avec les élytres un peu moins foncées, les antennes et les palpes maxillaires obscurs, et les pieds d'un testacé de poix. Tête très-finement et densément pointillée, presque plane. Antennes grêles, avec les deuxième et troisième articles suballongés, subégaux, le quatrième à peine moins long que le suivant, et les cinquième à dixième oblongs, subégaux. Prothorax subtransverse, plus étroit que les élytres, impressionné à sa base, très-finement et densément pointillé. Élytres subtransverses, un peu plus longues que le prothorax, déprimées, très-finement et très-densément pointillées. Abdomen subparallèle, très-finement et assez densément pointillé, à peine moins densément en arrière. Tarses postérieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0033 (1 1/2 l.); — larg., 0^m,00055 (1/4 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle se trouve dans les montagnes de la Provence.

Thinoecia haesitans

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et densément duveteuse, d'un noir assez brillant, avec les élytres brunâtres, les antennes, la bouche et l'extrémité de l'abdomen d'un roux testacé, et les pieds pâles. Tête subexcavée (♂) sur son milieu, très-obsolètement pointillée ou presque lisse. Antennes subfiliformes, avec les deuxième et troisième articles suballongés, subégaux, le quatrième plus court que le cinquième, les sixième à dixième oblongs, subégaux. Prothorax transverse, un peu rétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, subimpressionné vers sa base, longitudinalement déprimé sur son milieu, très-finement, très-densément et obsolètement pointillé. Élytres presque carrées, évidemment plus longues que le prothorax, subdéprimées, à ponctuation excessivement fine et excessivement serrée. Abdomen subparallèle ou un peu atténué vers son sommet, légère-

ment et densément pointillé vers sa base, obsolètement ou presque lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés.

Long., 0^m,0023 (1 l.); — larg., 0^m,00035 (1/6 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été trouvée dans les environs d'Hyères (Provence), dans le sable du bord de la mer.

Thinoecia merita

Allongée, sublinéaire, déprimée, très-finement et densément pubescente, d'un brun de poix un peu brillant, avec la bouche, les antennes, les pieds et l'extrémité de l'abdomen testacés. Tête subsillonée sur son milieu, très-finement et densément pointillée. Antennes grêles, avec les deuxième et troisième articles suballongés, subégaux, le quatrième suboblong, évidemment plus court que le cinquième, les cinquième à dixième oblongs, subégaux. Prothorax subtransverse, subrétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, fovéolé vers sa base, largement sillonné sur sa ligne médiane, très-finement et densément pointillé. Élytres presque carrées, évidemment plus longues que le prothorax, déprimées, très-finement et densément pointillées. Abdomen subparallèle, très-finement et assez densément pointillé, assez fortement sétosellé vers son sommet. Tarses postérieurs peu allongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0022 (1 l.); — larg., 0^m,0004 (1/5 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les environs de Lyon, sous les pierres du bord de la Saône.

Thinoecia (Hydrosmecta) callida

Allongée, sublinéaire, déprimée, très-finement et très-densément duveteuse, d'un noir peu brillant, avec la bouche, la base des antennes et le sommet de l'abdomen d'un roux de poix, et les pieds testacés. Tête obsolètement fovéolée sur son milieu, finement et très-densément ponctuée.

Antennes assez grêles vers leur base, à troisième article évidemment moins long que le deuxième et visiblement plus long que le quatrième, les quatrième à dixième subégaux, à peine plus longs que larges. Prothorax presque carré, subrétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, presque droit sur les côtés, subimpressionné vers sa base, finement canaliculé sur sa ligne médiane, très-finement et très-densement pointillé. Élytres presque carrées, évidemment plus longues que le prothorax, déprimées, très-finement et très-densement pointillées. Abdomen subparallèle, très-finement et très-densement pointillé. Tarses postérieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0023 (1 l.); — larg., 0^m,00035 (1/6 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle se trouve aux environs de Lyon, dans la vase des rivières.

Thinoecia (Hydrosmecta) amara

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et très-densement duveteuse, d'un noir un peu brillant, avec la bouche et la base des antennes d'un roux de poix, et les pieds d'un roux testacé. Tête très-finement et très-densement pointillée. Antennes assez grêles, avec le troisième article sensiblement plus court que le deuxième et évidemment plus long que le quatrième : celui-ci subcarré, visiblement plus court que le cinquième, les cinquième à dixième subégaux, à peine plus longs que larges. Prothorax subtransverse, à peine rétréci en arrière, presque droit sur les côtés, à peine impressionné vers sa base, obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane, très-finement et très-densement pointillé. Élytres presque carrées, évidemment plus longues que le prothorax, déprimées, très-finement et très-densement pointillées. Abdomen subparallèle, très-finement et très-densement pointillé. Tarses postérieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0023 (1 l.); — larg., 0^m,00035 (1/6 l.).

PATRIE. Cette espèce se trouve, mais rarement, en Provence, dans les environs d'Hyères, au bord de la mer, sous les détritux végétaux.

Thinoecia simillima

Allongée, linéaire, déprimée, très-finement et densément duveteuse, d'un noir de poix assez brillant, avec les élytres brunâtres, la bouche, les antennes, les pieds et le sommet de l'abdomen d'un testacé de poix. Tête subfovéolée sur son milieu, très-finement et densément pointillée. Antennes à peine épaissies, à troisième article sensiblement plus court que le deuxième, subégal au quatrième, les quatrième à dixième à peine oblongs, subégaux. Prothorax subtransverse, sensiblement rétréci en arrière, à peine plus étroit en avant que les élytres, très-finement et densément pointillé. Élytres oblongues, beaucoup plus longues que le prothorax, déprimées, très-finement et très-densément pointillées ou comme finement chagrinées. Abdomen subparallèle, très-finement et densément pointillé, à peine moins densément en arrière. Tarses postérieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias.

Long., 0^m,0016 (3/4 l.); — larg., 0^m,00035 (1/6 l.).

PATRIE. La Prusse rhénane.

Hygroecia parca

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et densément pubescente, d'un noir de poix brillant avec les élytres brunâtres, la bouche, la base des antennes et le sommet de l'abdomen d'un roux ferrugineux, et les pieds testacés. Tête finement et densément ponctuée, avec une ligne longitudinale lisse. Antennes verticillées-pilosellées, légèrement épaissies vers leur extrémité, avec le troisième article un peu moins long que le deuxième, les septième à dixième sensiblement transverses. Prothorax subtransverse, subrétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, très-finement et densément ponctué, sensiblement impressionné et légèrement sillonné vers sa base. Élytres visiblement transverses, un peu plus longues que le

prothorax, déprimées, finement et densément ponctuées. Abdomen subparallèle, distinctement et éparsement sétosellé, finement et assez densément ponctué sur les trois premiers segments et sur le sixième, parcimonieusement sur les quatrième et cinquième. Tarses postérieurs suballongés, beaucoup moins longs que les tibias.

Long., 0,0031 (1 1/3 l.); — larg., 0,0006 (1/3 l.).

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été trouvée, en juillet, dans les environs de Lyon, parmi les feuilles mortes, dans les bois.

Taxicera perfoliata

Allongée, sublinéaire, déprimée, finement et peu pubescente, d'un noir brillant, avec les élytres d'un brun de poix parfois un peu roussâtre ou châtain, la bouche et les antennes d'un roux obscur, la base de celles-ci et les pieds testacés. Tête lisse sur son milieu, assez fortement et éparsement ponctuée sur les côtés. Antennes médiocrement pilosellées, assez fortement épaissies dès leur cinquième article, avec le troisième sensiblement plus court et plus grêle que le deuxième, les cinquième à dixième très-courts, très-fortement transverses. Prothorax fortement transverse, à peine moins large que les élytres, à peine arqué sur les côtés, obsolètement et parcimonieusement ponctué, subfovéolé vers sa base. Élytres médiocrement transverses, évidemment plus longues que le prothorax, déprimées, obsolètement et assez peu ponctuées. Abdomen subparallèle, presque lisse.

Long., 0^m,0022 (1 l.); — larg., 0^m,00050 (à peine 1/4 l.).

PATRIE. Cette espèce se prend sur les cadavres de rats, de musaraignes et autres petits quadrupèdes. Elle est assez commune dans presque toute la France : les environs de Paris et de Lyon, l'Auvergne, le Beaujolais, la Provence, etc.

Taxicera indigna

Allongée, sublinéaire, déprimée, finement et éparsement pubescente, d'un noir brillant, avec les élytres à peine moins foncées et les pieds testacés. Tête lisse sur son milieu, assez fortement et parcimonieusement ponctuée sur les côtés. Antennes légèrement pilosellées, sensiblement épaissies dès le cinquième article, avec le troisième beaucoup plus court et plus grêle que le deuxième, les cinquième à dixième très-courts, très-fortement transverses. Prothorax fortement transverse, à peine moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, distinctement et subéparsement ponctué, impressionné vers sa base, souvent obsolètement sillonné sur sa ligne médiane. Élytres sensiblement transverses, évidemment plus longues que le prothorax, déprimées, assez distinctement et modérément ponctuées. Abdomen subparallèle, presque lisse.

Long., 0^m,0023 (1 l.); — larg., 0^m,00050 (à peine 1/4 l.).

PATRIE. Cette espèce se rencontre dans les environs de Lyon et dans le Beaujolais. Elle est assez commune sous les cadavres des crapaux, lézards et autres reptiles, parfois aussi sous les excréments et les champignons desséchés.