

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON

Année 1875

(NOUVELLE SÉRIE)

TOME VINGT-DEUXIÈME

LYON
H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR
65, RUE DE LYON
MÊME MAISON A GENÈVE ET A BALE

PARIS
J. B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEURS
19, RUE HAUTEFEUILLE

1876



DESCRIPTION

D'UNE

ESPÈCE NOUVELLE DE BRÉVIPENNES

PAR

MM. E. MULSANT ET CL. REY

Présentée à la Société linnéenne de Lyon, le 11 janvier 1875.

Cylindrogaster exilis, MULSANT et REY.

Allongé, très-étroit, linéaire, d'un roux testacé brillant. Tête subcarrée, avec deux sillons arqués. Prothorax brusquement rétréci en arrière, longitudinalement bissillonné. Élytres très-courtes. Abdomen convexe, sub-cylindrique.

Long., 0^m,001.

Corps allongé, très-étroit, linéaire, assez convexe, d'un roux testacé brillant, glabre.

Tête grande, subcarrée, de la largeur du prothorax, glabre, lisse, d'un roux testacé brillant. Front faiblement convexe, très-large, creusé sur son milieu de deux sillons arqués en dehors, en forme de C se regardant. Parties de la bouche d'un roux de poix testacé.

Yeux lisses ou nuls.

Antennes très-courtes, de la longueur de la tête, testacées : à premier article renflé, suboblong : le deuxième à peine moins épais, mais plus court, subglobuleux : les suivants très-petits : les quatre ou cinq derniers formant ensemble une massue oblongue, graduée quoique assez épaisse :

le dernier mousse au bout, un peu plus grand que les pénultièmes : ceux-ci lenticulaires.

Prothorax oblong, largement tronqué au sommet, étroitement à la base ; subparallèle sur ses côtés, mais subitement rétréci en arrière dans son tiers ou quart postérieur ; aussi large en avant que la partie postérieure des élytres ; subconvexe ; d'un roux testacé brillant ; lisse ; creusé postérieurement, sur son disque, de deux sillons longitudinaux, profonds, subparallèles, remontant jusqu'au tiers antérieur.

Écusson à peine apparent.

Élytres très-courtes, de la longueur de la moitié du prothorax ; plus larges en arrière qu'en avant ; assez convexes, à suture peu distincte ; presque lisses ; d'un roux testacé brillant.

Abdomen très-allongé, de la largeur des élytres, sept fois plus prolongé que celles-ci ; sublinéaire, subcylindrique ; finement rebordé sur les côtés ; convexe sur le dos ; presque lisse ; d'un roux testacé brillant ; à cinq premiers segments subégaux, un peu plus longs, chacun, que les élytres : le sixième deux fois aussi long que le précédent, à peine atténué en arrière,

Dessous du corps convexe, d'un roux testacé brillant.

Pieds courts, grêles, testacés. *Cuisses*, surtout les antérieures, un peu renflées.

PATRIE. Cette espèce a été capturée sous les pierres enfoncées, dans les environs de Massane (Pyrénées-Orientales) par M. Mayet à qui la science doit déjà tant de découvertes microscopiques.

OBS. Elle est encore plus petite et plus grêle que le *Cylindrogaster Corsicus*, auquel elle ressemble un peu.