

УДК 599.322.2

СУРКИ ПАЛЕАРКТИКИ: БИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ – Тез. докл. III Международного (VII) Совещания по суркам стран СНГ (Россия, г.Бузулук, 6-10 сентября 1999 г.). – М.: 1999, с.

В сборнике публикуются материалы, представленные на III Международном (VII) Совещании по суркам стран СНГ по различным аспектам биологии, охраны и рационального использования сурков Палеарктики. Рассматриваются вопросы экологии, этологии, систематики, дается оценка состояния популяций и ресурсов сурков. Обсуждается биоценотическая и этносоциальная роль сурков.

Сборник предназначен для широкого круга зоологов, специалистов по охране и рациональному использованию ресурсов животного мира, студентов биологических специальностей и т.п.

Редакционная коллегия:

О.В.Брандлер (ответственный редактор)
В.Ю.Румянцев

Корректор - И.Р.Ахундова

Издание осуществлено с оригинала, подготовленного Комиссией по изучению сурков ТО РАН. В оформлении сборника использована эмблема Комиссии (автор – В.В.Колесников). Иллюстрации к статьям представлены авторами.

Literature:

Bibikov D.I., Dimitriev A.V., Abrakhina I.B., Barmin N.A. About studying the marmots' genofund motion during their reacclimatization and acclimatization // Holarctic Marmots as a factor of biodiversity. Abstracts of the 3d International Conference on Marmots (Cheboksary, Russia, 25-30 august 1997). Moscow: Publishing house ABF. 1997. P. 126-127.

Dimitriev A.V. Some shortcomings while reacclimatization of the marmots in Povolzhye // Revival of the steppe marmot. Report's abstracts of the International seminar about marmots in the countries of FSU (village Gaydary, Kharjkovsky region, the Ukraine, 26-30 of may 1997). Moscow: Publishing house ABF. 1997. P.14-15.

**О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВОГО ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОГО
РАССЕЛЕНИЯ СУРКОВ В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

А.В.Димитриев

Государственный природный заповедник "Присурский"

В дополнение к ранее опубликованным материалам (Димитриев и др., 1994; 1995; 1997; Димитриев, 1997) продолжаем описание сурковых колоний Чувашской Республики.

Урмарская колония сурков появилась в результате первых внутри-республиканских акклиматизационных работ, проведенных работниками Управления охотничьего хозяйства Чувашской Республики. Последние наблюдения и анализ имеющихся учетных данных (таблица) свидетельствует о том, что колония большими темпами не растет. Браконьерство в этих местах не отмечено, бродячих собак в окрестностях колонии нет, фактор беспокойства отсутствует. В районе расположения колонии пасется сельское стадо, имеется место для отстоя стада в дневное время. А также отмечено 2 семьи лис, которые, на мой взгляд, не дают возможности прогрессивного роста поголовью сурков.

Данные о численности сурков в Урмарской колонии

Год проведения учета	Число семей	Число зверьков, экз.	
	Всего экз.	Всего, экз.	Сеголеток, экз.
1996	2	7	3
1999	6	16	3

20.06.99 г. при обследовании бассейна р.Аря в районе выпуска сурков установлено, что колония находится в стабильном состоянии. Мармотобиогеоценоз формируется. Значительного роста поголовья сурков не наблюдается, хотя за 3 года поголовье возросло в 2 раза. Были попытки самостоятельного расселения сурков в соседние участки. В 4-5 км от места выпуска в двух местах обнаружены пустующие норы, где было 3 и 2 основных семейных нор. Причины исчезновения этих дочерних выселков (колоний) не известны. Предположительно - пресс лис.

На основной колонии обнаружено 6 небольших семей, из них только 2 семьи имеют старые норы, остальные построили новые 2-3 года назад и продолжают рыть новые. Семьи имеют следующее количество нор: 2 жилых и 1 защитная; 1 жилая и 1 защитная; 1 жилая и 3 защитных; 3 жилых и 1 защитная; 1 жилая, 1 защитная и 1 в стадии строительства; 1 жилая, 1 защитная, 1 в стадии строительства. Ориентировочно в колонии в 1999 году обитало не более 16 сурков.

Перспектива расселения в данном районе хорошая. В бассейне р.Ари может существовать несколько стабильных колоний площадью по 300-500 га. Кормовая база стабильная. Есть значительные площади склоновых целинных земель с большим перепадом высот, обращенных на юг, юго-восток и юго-запад, которые занимают луговые степи с типчаком, шалфеем и другими степными растениями, но без ковыля. Почва дерново-подзолистая. Имеется красная глина. Подпочва - известняк. На дне оврагов текут ручьи. В сильную жару склоны частично выгорают, но вся растительность не погибает из-за наличия разнообразных местообитаний. В окрестностях колонии сурков имеются многочисленные колонии сусликов и достаточно много мышей, что привлекает в эти места лис и хищных птиц.

Для укрепления Урмарской основной колонии сурков и ускорения прохождения первой стадии акклиматизации предлагается организовать дополнительный выпуск сурков из близлежащих колоний и объявить эту местность республиканским сурковым заказником.