

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XX (1895)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES




SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1895



ROSES DE LA VALLÉE DE CHAMONIX

ET DE

QUELQUES AUTRES PARTIES DE LA HAUTE-SAVOIE

PAR

Venance PAYOT

Ayant depuis longtemps récolté des Roses dans la vallée de Chamonix et dans les vallées voisines, ayant aussi reçu des spécimens de celles qui ont été cueillies en diverses parties du Chablais et du pays d'Annecy par l'abbé Puget, j'ai pensé que la liste de ces Roses pourrait intéresser les botanistes désireux de visiter les susdites parties de la Haute-Savoie et qu'elle recevrait un favorable accueil de la part des membres de la Société botanique de Lyon, qui se sont donné la tâche d'établir la statistique des richesses végétales du Bassin du Rhône.

Le lecteur est prévenu que, voulant le laisser libre de choisir la hiérarchie qu'il croira la meilleure, je n'ai établi aucune distinction entre les espèces de premier ordre, de second ordre, les hybrides et métis.

A cette liste j'ai joint l'indication de localités nouvelles en ce qui concerne plusieurs espèces mentionnées dans ma *Florule du Mont-Blanc*.

GROUPE SYSTYLÆ.

arvensis, stylosa ou systyla. — Pringy.

GROUPE CANINÆ.

lutetiana. — Chamonix à la Coudraz,
Servoz.

glaucescens. — Pringy.
nitens. — Pringy.

senticosa. — Habère-Lullin.
sphærica. — Chamonix, Bellevaux.
montivaga. — Habère-Poche.
spuria. — Annecy-le-Vieux.
dumalis. — Habère-Lullin.
rubescens. — Brenthomme.
malmundariensis. — Thonon.
biserrata. — Annecy.
squarrosa. — Pringy, Habère-Lullin.
microcarpa. — Pringy.
andegavensis. — Annecy.
Chavini. — Chamonix.
psilophylla. — Annecy.

dumetorum. — Bellevaux, Habère-Lullin, Pringy, Courmayeur.
urbica. — Habère-Lullin.
platyphylla. — Chamonix aux Gail-lands.
platyphylloides. — Habère-Lullin.
coriifolia. — Chamonix aux Paquis, chalets de Balme, Lanchy, Layoux, Hortaz, Coudraz.
Deseglisei. — Pringy au bois de Barioz collina. — Chamonix.
bellavallis. — Bellevaux.

GROUPE RUBIGINOSÆ.

rubiginosa. — Chamonix aux Gail-lands, Lanchis, chemin de la Flé-gère; — Courmayeur.
Jundzilliana. — Chamonix.
Pugeti. — Ibid.
agrestis. — Courmayeur.

Jordani. — Chamonix.
micrantha. — Chamonix.
septicola. — Ibid.
comosa. — Ibid.
umbellata. — Ibid.

GROUPE PIMPINELLIFOLIÆ

spreta. — Veyrier.

lutea. — Pringy.

GROUPE TOMENTOSÆ

tomentosa. — Chamonix aux Lanchis, Coudraz.
cuspidata. — Chamonix.
omissa. — Pringy.
resinosa. — Chamonix.

mollissima. — Chamonix, Pringy.
pomifera. — Chamonix.
sabauda. — Ibid.
coronata. — Ibid.

GROUPE ALPINÆ.

alpina. — Chamonix.

pyrenaica. — Chamonix.

GROUPE MONTANÆ.

rubrifolia. — Commun dans toutes les vallées.
glauca. — Commun. Ibid.
montana. — Chamonix.

caballicensis. — Chamonix.
Chavini. — Ibid.
Reuteri. — Ibid.

Espèces de second ordre, variétés, hybrides ou métis, cueillis dans la Haute-Savoie et le Valais.

- similata. — Arenthon, le Clou sous Bovernier.
scabrata. — Fins-Hauts.
semiglandulosa. — Les Iles, chemin du Clou.
pinguicula. — Ibid, ibid.
Blondæana. — Habère-Poche.
contingens. — Annecy-le-Vieux.
finitima. — Ibid.
fallens. — Habère-Lullin, la Roche.
aciphylla. — Martigny.
condensata. — Habère-Poche.
Gandogeri. — Chemin de Bovernier.
cladoleia. — Entre Martigny et Bovernier.
medioxima. — Ibid.
villosiuscula. — Les Marques de Martigny.
viridicata. — Vallée de la Menoge, Habère-Lullin.
Chaboissæi. — Les Ussets à la Caille.
Roussellii. — Sambrancher au Biolley.
hirtella. — Entre le Brocard et Bovernier.
firma. — Bellevaux.
limitanea. — Batiaz.
Acharii. — Crettaz d'Entremont.
tenuicarpa. — Thonon.
glabrata. — Annecy-le-Vieux
caballicensis. — Abondance, Bellevaux, Bovernier.
falcata. — Habère-Lullin, Bellevaux.
De la Soiei. — Bovernier, Sembrancher.
complicata. — Salvan, Fins-Haut, Bovernier.
haberiana. — Habère-Lullin, Habère-Poche, Bovernier.
Rionii. — Clou sur Bovernier.
pennina. — Ibid.
sembrancheriana. — Ibid.
vallesiaca. — Ibid.
salvanensis. — Ibid.
Lusseri. — Ban de Bovernier.
Lemanii. — Ibid.
serrata. — Mont Clou.
Malaberti. — Ravoire sur Martigny.
arvatica. — Margéraz, Bovernier.
virgultorum. — Iles sous Bovernier.
Vaillantiana. — Ibid.
Kluckii. — Pringy.
tomentella. — Les Bormes, Bovernier.
intercalaris. — Habère-Lullin.
intricata. — Ibid.
recondita. — Mont Charvin, les Valettes.
spinosissima. — Bonneville, Cramont.
Grenieri. — Clou de Bovernier.
spinulifolia. — Savoie.
subglobosa. — Morzine, les Mouilles, Habère-Lullin.
Tunoniensis. — Reivroz, Vailly, Ripaille.
vestita. — Reivroz.
echinocarpa. — Bovernier.
rotundifolia. — Ravoire de Martigny.
Bourdini. — Le Clou de Bovernier.
leptopoda. — Ibid.
pervaga. — Ravoire de Martigny.
permixta. — Iles sous Bovernier.

ADDITIONS A LA FLORULE DU MONT-BLANC.

Thalictrum foetidum, *Aquilegia alpina* et *Sisymbrium tanacetifolium*. — La Saxe près Courmayeur (Italie).

Ranunculus platanifolius et *Arabis bellidifolia*. — Choucry près Courmayeur.

Ranunculus glacialis. — Montée du Buet.

Cardamine impatiens. — Entre-les-Eaux près Valorsine.

Draba carinthiaca. — Allée Blanche. — *Hutchinsia affinis*.
— Vallon de la Floriaz.

Hypericum quadrangulum. — Col de Tricot. — *H. fimbria-*
tum. — Mont Lachat.

Oxytropis cyanea. — Mont Jovet près du Bonhomme.

Onothera biennis. — Montée des Tines. — *Galium mon-*
tanum. — Taconnaz.

Leontopodium alpinum. — Le Bonhomme.

Stachys alpinus, *Thymus pannonicus*, *Calamintha grandi-*
flora, *Galeopsis angustifolia*. — Les Gaillands.

Polygonum alpinum. — Chamonix.

Setaria italica. — Naturalisé à l'Argentière.