

**ANNALES**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE**  
**DE LYON**

---

*Année 1875*

(NOUVELLE SÉRIE)

TOME VINGT-DEUXIÈME

---

**LYON**  
**H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR**  
65, RUE DE LYON  
MÊME MAISON A GENÈVE ET A BALE

**PARIS**  
**J. B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEURS**  
19, RUE HAUTEFEUILLE

1876



DESCRIPTION  
D'UNE  
ESPÈCE D'ALTISIDE

NOUVELLE OU PEU CONNUE

PAR  
MM. E. MULSANT ET CL. REY

Présentée à la Société linnéenne de Lyon, le 12 juillet 1875.

**Thyamis breviscula**, MULSANT et REY.

*Breviter ovata, convexa, subnitida, pallens, oculis nigris, antennis apice subinfuscatis; his elongatis; thorace brevi, elytris amplis, obsolete rugoso-punctulatis.*

Long., 0<sup>m</sup>,002 (3/4 l.).

*Corps* courtement ovalaire, convexe, assez brillant, presque glabre, d'un testacé pâle, avec les yeux noirs.

*Tête* verticale, fortement engagée dans le prothorax, assez brillante, testacée. *Vertex* subconvexe, finement rugueux. *Festons* déprimés, transversalement obliques. *Carène faciale* assez saillante, oblongo-elliptique. *Parties de la bouche* d'un testacé pâle, avec la pointe des *mandibules* rembrunie.

*Yeux* gros, arrondis, noirs, à facettes grossières.

*Antennes* allongées, atteignant les trois quarts de la longueur du corps, subfiliformes, finement pubescentes, pâles, avec les cinq ou six derniers articles un peu rembrunis, surtout au sommet de chacun d'eux; le premier en massue allongée, subcylindrique et subarquée: les deuxième et troisième

beaucoup plus courts et un peu plus grêles, oblongs, obconiques, sub-égaux : les suivants allongés, linéaires, subégaux, avec les trois derniers à peine plus épais, subrétrécis vers leur base : le dernier, de plus, sub-acuminé au sommet.

*Prothorax* court, deux fois aussi large que long ; tronqué au sommet, subarqué sur les côtés, très-largement arrondi à la base ; transversalement convexe ; obsolètement et rugueusement pointillé ; d'un testacé pâle et assez brillant.

*Écusson* petit, assez large, subogival, lisse, d'un testacé brillant.

*Élytres* grandes, de quatre à cinq fois plus longues que le prothorax, sensiblement plus larges à leur base que celui-ci ; ovalièrement arrondies sur les côtés ; convexes, plus fortement en arrière où elles sont largement et simultanément arrondies au sommet ; obsolètement et rugueusement pointillées ; presque glabres ; d'un testacé pâle et assez brillant. *Épaules* assez saillantes, subarrondies.

*Dessous du corps* assez brillant, obsolètement pointillé, d'un testacé moins pâle que la page supérieure.

*Pieds* légèrement pubescents, d'un testacé pâle, avec le sommet des cuisses postérieures parfois un peu rembruni. *Celles-ci* fortement élargies, subcomprimées. *Tibias postérieurs* légèrement ciliés sur l'arête externe de leur surface dorsale, et, de plus, finement denticulés sur les deux tiers et finement pectinés sur le troisième tiers de cette même arête.

**PATRIE.** Cette espèce a été trouvée aux environs de Collioure, par M. Valéry Mayet, à la fin de mai, sur la *Passerina hirsuta*.

**OBS.** Cette espèce ressemble aux *Thyamis pallens*, *crassicornis* et *canescens* ; mais elle est d'une forme plus courte, plus ramassée et plus convexe. Les élytres sont plus brusquement déclives et plus largement arrondies à leur sommet. Les festons sont plus développés transversalement et la carène faciale est moins linéaire et moins tranchante, etc.