

**ANNALES**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE**  
**DE LYON**

---

*Année 1875*

(NOUVELLE SÉRIE)

TOME VINGT-DEUXIÈME

---

**LYON**  
**H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR**  
65, RUE DE LYON  
MÊME MAISON A GENÈVE ET A BALE

**PARIS**  
**J. B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEURS**  
19, RUE HAUTEFEUILLE

1876



DESCRIPTION  
D'UNE  
NOUVELLE ESPÈCE DE BRACHÉLYTRE

DE LA TRIBU DES ALÉOCHARINI

PAR

MM. E. MULSANT ET CL. REY

Présentée à la Société linnéenne de Lyon le 10 mai 1875.

***Liota hypogaea*, MULSANT et REY.**

*Elongata, sublinearis, parum convexa, parce pubescens, nitida, rufobrunnea, antennis, ano pedibusque testaceis, capite abdominisque cingulo lato nigris. Capite, elytris abdomineque sublaevigatis, thorace vix punctulato.*

Long., 0<sup>m</sup>,0025 (1 1/6 l.).

*Corps* allongé, sublinéaire, peu convexe, brillant, d'un roux obscur, avec la tête et les troisième et quatrième segments de l'abdomen noirs et l'extrémité de celui-ci largement testacée; recouvert d'une fine pubescence blonde et très-peu serrée.

*Tête* en carré subtransverse, à peine moins large que le prothorax, subconvexe, à peine pubescente, lisse, d'un noir brillant. *Parties de la bouche* testacées.

*Yeux* petits, irrégulièrement arrondis, noirs.

*Antennes* de la longueur de la tête et du prothorax réunis; graduellement et assez fortement épaissies; distinctement pilosellées; entièrement

d'un flave testacé ; à premier article suballongé, à peine renflé en massue : le deuxième oblong, à peine plus grêle, mais un peu moins long que le premier : le troisième obconique, plus court que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement plus épais, fortement transverses, avec les pénultièmes encore plus fortement et très-courts : le dernier grand, plus long que les deux précédents réunis, en ovale acuminé au bout.

*Prothorax* en carré subtransverse ; un peu moins large que les élytres ; tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis et fortement arrondis ; presque droit et subparallèle sur les côtés ; largement arrondi à sa base, avec les angles postérieurs obtus ; faiblement convexe ; éparsément pubescent ; paré en outre sur les côtés de deux ou trois légères soies redressées ; à peine ou obsolètement pointillé ; d'un brun de poix brillant, à peine roussâtre. *Repli* lisse, moins foncé.

*Écusson* lisse, brillant, noir, glabre.

*Elytres* en carré transverse, à peine plus longues que le prothorax ; simultanément et à peine échancrées à leur bord apical, avec l'angle sutural émoussé ; subdéprimées ; longitudinalement impressionnées sur la suture ; éparsément pubescentes, avec une légère soie redressée sur le côté des épaules ; presque lisses ; d'un brun de poix roussâtre et brillant, la suture un peu plus rembrunie derrière l'écusson. *Épaules* étroitement arrondies.

*Abdomen* allongé, un peu moins large que les élytres, cinq fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ; subconvexe sur le dos ; peu pubescent ; très-éparsément et légèrement ponctué sur les côtés ; presque lisse ; d'un brun brillant, plus ou moins roussâtre sur les premiers segments, presque noir sur les troisième et quatrième, testacé sur la dernière moitié du cinquième et sur le sixième entièrement. Les *trois premiers* étroitement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons encore plus lisse : le cinquième subégal au précédent, largement tronqué ou à peine échancré à son bord apical : le sixième assez saillant, étroit, subogival, à peine pointillé.

*Dessous du corps* à peine pubescent, presque lisse, d'un brun de poix brillant, avec l'extrémité du ventre testacée, et le troisième et quatrième arceaux plus ou moins rembrunis. *Ventre* convexe, éparsément sétosellé vers son sommet,

Pieds peu allongés, légèrement pubescents, à peine pointillés, testacés.  
Cuisses subélargies. Tibias assez grêles. Tarses courts.

PATRIE. Cette espèce se tient cachée sous les pierres enfoncées. Elle a été capturée en mai, à la Massane (Pyrénées-Orientales), par M. Valéry Mayet.

OBS. Elle ressemble beaucoup à la *L. rufotestacea* Kr. (*atricapilla* Mulsant et Rey). La taille est moindre et la couleur généralement plus obscure. Les antennes, proportionnellement plus longues, sont plus grêles à leur base, d'un testacé plus pâle, avec leur dernier article plus grand et plus acuminé. La tête est plus convexe et plus brillante. Le prothorax, moins visiblement pointillé, n'offre aucune trace de sillon canaliculé. Les élytres sont plus lisses, etc.