

HISTOIRE ET DESCRIPTION  
DU  
**MUSÉUM ROYAL**  
D'HISTOIRE NATURELLE,

OUVRAGE RÉDIGÉ D'APRÈS LES ORDRES DE L'ADMINISTRATION  
DU MUSÉUM,

PAR M. DELEUZE,

Avec trois plans et quatorze vues des Jardins, des Galeries  
et de la Ménagerie.



---

A PARIS,

CHEZ M. A. ROYER, AU JARDIN DU ROI.

DE L'IMPRIMERIE DE L. T. CELLOT, RUE DU COLOMBIER, N° 30.

M. DCCC. XXIII.



autre local, où ils seront beaucoup mieux placés qu'ils ne l'étaient précédemment.

Un grand nombre de singes ont paru à la ménagerie : plusieurs y ont fait des petits. Les plus remarquables de ceux qu'on y voit aujourd'hui sont le drill, nouvelle espèce de cynocéphale, le rhésus, le papion, le bonnet chinois, l'ouandérou de Ceylan, et le macaque.

De l'autre côté du chemin nouvellement construit, est une petite galerie fermée par des portes vitrées, qu'on ouvre lorsque le temps est beau. C'est là qu'on a rassemblé les petits quadrupèdes qui ont besoin de chaleur. On y voit en ce moment une mangouste de la presqu'île de Malaca, une d'Égypte ; deux écureuils d'Amérique, un dasyure, un phalanger de la Nouvelle-Hollande, une marmotte du Canada, deux espèces de tatou, etc., etc.

A la suite sont les cages des oiseaux de proie. On y voit plusieurs espèces de vautours, dont un, nommé le roi des vautours, nous a été donné par monseigneur le duc d'Orléans ; le gypaète des Alpes, qui est, après le condor, le plus grand des oiseaux de proie connus ; le bateleur du Sénégal ; l'aigle à tête blanche, et plusieurs chouettes et hiboux du Nouveau-Monde.

En tournant à gauche, on se trouve en face de la volière : c'est un enclos planté d'arbrisseaux.

même d'examiner chez eux le développement et la propagation de certaines qualités qui finissent par constituer des races particulières : et M. Frédéric Cuvier, qui a inséré dans nos Annales des mémoires sur quelques-uns de ces objets, n'aurait jamais pu recueillir et généraliser les observations dont ils se composent, s'il n'avait été chargé de la direction et de la surveillance de notre ménagerie.

Enfin cette même succession d'animaux a donné lieu à deux ouvrages de la plus haute importance. Le premier, qui a pour titre *La ménagerie du Muséum, ou Description des animaux qui y vivent et qui y ont vécu*, par MM. Lacépède, Cuvier et Geoffroy, avec des figures peintes d'après nature, par M. Maréchal, a été publié en 1804, in-folio, et in-12, par M. Miger, qui en a gravé les planches.

Le second, dont les auteurs sont MM. Geoffroy-Saint-Hilaire et Frédéric Cuvier, a été commencé en 1819 et se continuera tant qu'on aura l'occasion de voir des espèces nouvelles ou peu connues. Il en a déjà paru quarante cahiers in-folio, contenant deux cent quarante figures. Ces figures, lithographiées et coloriées d'après la nature vivante, font connaître tous les animaux qu'on a pu observer à la ménagerie, et l'on juge combien elles sont plus exactes que celles qu'on avait faites sur les animaux empaillés. Le texte offre non-

seulement une description de chaque animal, mais encore l'exposition de ce qu'on a pu remarquer relativement à ses habitudes pendant le temps qu'il a vécu à la ménagerie.

Pour donner une idée des services que la ménagerie du Muséum a rendus à l'histoire naturelle, nous croyons devoir joindre ici la liste des animaux remarquables qui y ont vécu, qui y ont été décrits et dessinés, et dont les dépouilles ont été ensuite placées dans les galeries de zoologie et dans celles d'anatomie comparée.

Nous distinguerons par un astérisque placé à la suite du nom ceux qui n'étaient pas bien connus, ou qui ne l'étaient pas du tout lorsqu'ils nous ont été envoyés ; et par la lettre v ceux qui sont vivans au moment où nous écrivons (1).

## MAMMIFÈRES.

- La mone, Buff., *simia mona*, Schr. (Afrique.)
- L'ascagne, *simia petaurista*, Gm. (Afrique.)
- V. Le moustac, Buff., *simia cephus*, Linn. (Afrique.)
- L'entelle, *simia entellus*, Dufresne. (Inde.) \*
- Le patas, *simia rubra*, Gmel. (Afrique.)
- V. Le mangabey, *simia fuliginosa*, Geoff. (Afrique.)
- V. Le mangabey à collier, *simia æthyops*, Linn. (Afrique.)
- V. Le malbrouck, *simia faunus*, Linn. (Afrique.)
- Le grivet, *simia griseus*, Fr.-Cuv. (Afrique.) \*
- Le vervet, *simia pygerythra*, Fr.-Cuv. (Afrique.) \*

(1) Nous aurions inutilement allongé cette liste en y joignant le nom des animaux connus de tout le monde, comme le loup et le renard parmi les mammifères ; le paon et le cygne parmi les oiseaux.

- V. Le callitriche, *simia sabæa*, Linn. (Afrique.)
- V. Le rhésus, *simia rhesus*, Geof. (Inde.) \*
- V. Le toque, *simia cynica*. (Inde.)
- V. Le macaque, *simia cynomolgus*. (Sumatra.)
- V. Le singe à queue de cochon, *simia nemestrina*, Linn. (Sumatra.) \*
- V. L'ouandérou, *simia silenus*, Linn. (Inde.)
- Le magot, *simia inuus*, Linn. (Afrique.)
- V. Le papion, *simia sphinx*. (Afrique.)
- Le babouin, *simia cynocephalus*, Fr.-Cuv. (Afrique.) \*
- Le tamarin, *simia hamadryas*, Linn. (Afrique.)
- Le chacma, *simia porcaria*, Bodd. (Afrique.) \*
- V. Le drill, *simia leucophaea*, Fr.-Cuv. (Afrique.) \*
- V. Le mandrill, *simia mormon*, Linn. (Afrique.)
- V. Le coaita, *simia paniscus*, Linn. (Amér. équat.)
- L'atèle noir ou cayou, *ateles niger*, Fr.-Cuv. (Amér. équat.) \*
- V. Le saï, *simia capucina*, Linn. (Amér. équat.)
- Le saïou brun, et le saïou gris, *simia apella*, Linn. (Amér. équat.)
- V. Le saïou cornu, *simia fatuellus*, Linn. (Amér. équat.) \*
- Le saï à gorge blanche, *cebus hypoleucus*, Geof. (Amér. équat.)
- Le saï à grosse tête, *cebus robustus*, New. (Amér. équat.) \*
- Le saïmiri, *simia sciurea*, Linn. (Amér. équat.)
- Le marikina, *simia rosalia*, Linn. (Amér. équat.)
- V. Le ouistiti, *simia jacchus*, Linn. (Amér. équat.)
- Le tamarin nègre, *midas ursulus*, Geof. (Amér. équat.)
- V. Le douroucouli, *simia trivirgata*, Humboldt. (Amér. équat.) \*
- Le maki rouge, *lemur ruber*, Péron. (Madagascar.) \*
- V. Le maki nain, *lemur murinus*. (Madagascar.) \*
- Le mangous, *lemur mongos*, Linn. (Madagascar.)
- V. Le maki à front blanc, mâle et femelle, *lemur albifrons*, Geof. (Madagascar.) \*
- V. Le maki à front noir, *lemur nigrifrons*, Geof. (Madagascar.) \*
- Le mococo, *lemur catta*, Linn. (Madagascar.)
- V. L'ours brun des Alpes, *ursus arctos*, Linn.
- V. L'ours noir d'Amérique, *ursus americanus*, Linn.
- L'ours polaire, *ursus maritimus*. Pall.
- V. Le raton, *ursus lotor*, Linn. (Amérique.)
- V. Le coati brun, *viverra nasua*, Linn. (Amér. équin.)
- V. Le coati roux, *viverra narica*, Linn. (Amér. équin.) \*

- V. Le kinkajou, *viverra caudivoluta*, Gm. (Amér. équin.) \*  
 Le grison, *viverra vittata*, Gm. (Amér. équin.) \*  
 V. L'ichneumon d'Égypte, *viverra ichneumon*, Linn.  
 V. La mangouste grise, *viverra mungos*, Linn. (Asie et Afrique.) \*  
 V. La mangouste de Java, *viverra javanica*, Desmarest. \*  
 La genette, *viverra genetta*. (Afrique.)  
 Le suricate, *viverra tetradaactyla*. (Afrique.) \*  
 Le pougoné ou marte des palmiers, *paradoxurus typus*, Fr. Cuv.  
 (Inde.) \*  
 V. La civette, *viverra civetta*. (Asie et Afrique.)  
 V. Le zibeth, *viverra zibetha*. (Asie.) \*  
 V. Le chacal du Bengale, *canis aureus*, Linn. \*  
 V. Le chacal du Sénégal, *canis anthus*, Fr. Cuv. \*  
 Le renard argenté, *canis argenteus*, Geof. (Amérique.) \*  
 Le renard tricolor, *canis cinereo argenteus*, Gm. (Amérique.) \*  
 V. Le lion, *felis leo*, Linn. (Afrique.)  
 Le tigre, *felis tigris*, Linn. (Inde.)  
 V. Le jaguar, *felis onca*, Linn. (Amér. équin.) \*  
 Le léopard, *felis leopardus*, Linn. (Afrique.) \*  
 V. Le guépard, *felis jubata*, Linn. (Afrique et Asie.) \*  
 La panthère, *felis pardus*, Linn. (Afrique.)  
 Le serval, *felis serval*. (Afrique.)  
 Le cougar, *felis discolor*, Linn. (Amér. équin.)  
 Le mélas, *felis melas*, Péron. (Java.)  
 Le chaty, *felis mitis*, Fr. Cuv. (Amér. équin.) \*  
 Le lynx du Canada, *felis canadensis*, Geof.  
 V. L'hyène rayée, *canis hyæna*. (Afrique.)  
 L'hyène tachetée, *canis crocuta*. (Cap de Bon.-Esp.)  
 Le phoque commun, *phoca vitulina*.  
 Le phoque fauve, espèce indéterminée. \*  
 Le dasyure de Mauge, *dasyurus Maugei*, Geof. (Nouv.-Hol.)  
 V. L'opossum, *didelphis virginiana*, Linn. (Amér. sept.)  
 Le crabier, *didelphis cancrivora*, Linn. (Amér. équin.) \*  
 Le phalanger de Cook, *phalangista Cookii*. (Nouv.-Hol.)  
 Le kangourou géant, *didelphis gigantea*, Gm. (Nouv.-Hol.)  
 Le phascolome, *phascolomis ursina*, Geof. (Nouv.-Hol.) \*  
 V. L'écureuil des Pyrénées, *sciurus alpinus*, Fr. Cuv. (Europe.) \*  
 V. L'écureuil de la Caroline, *sciurus cinereus*, Linn. (Amér. sept.)

- V. Le capistrate, *sciurus capistratus*, Bosc. (Amér. sept.)  
 L'assapan ou polatouche d'Amérique, *sciurus arobatis*, Linn.  
 (Amér. sept.) \*
- V. La marmotte du Canada, *arctomys empetra*, Pall. \*
- V. L'agouti, *cavia aguti*, Linn. (Amér. équinox.)
- V. Le paca brun, *cavia paca*, Linn. (Amér. équinox.)  
 Le paca fauve, *cavia paca*, Linn.  
 Le castor du Canada, *castor fiber*, Linn.  
 Le castor d'Europe.  
 Le hamster, *mus cricetus*, Linn. (Europe.)
- V. L'encoubert, *dasyus sex-cinctus*. (Amér. équinox.)
- V. Le tatou, espèce nouvelle. (Amérique équinox.) \*
- V. L'éléphant des Indes, *elephas indicus*, Linn.
- V. Le pécaré, *dicotyles torquatus*, G. Cuv. (Amér. équinox.)
- V. Le tajaçu, *dicotyles labiatus*, G. Cuv. (Amér. équinox.) \*  
 Le couagga, *equus quaccha*. (Cap de Bon-Esp.)  
 Le zèbre, *equus zebra* d'Afrique.  
 Mulet de zèbre et d'âne.  
 Le chameau, *camelus bactrianus*. (Asie.)
- V. Le dromadaire, *camelus dromedarius*. (Asie et Afrique.)  
 Le lama, *camelus llacma*. (Amér. équinox.)
- V. L'alpaca, *camelus alpaca*. (Amér. équinox.) \*
- V. Le wapiti, *cervus strongyloceros*, Schr. (Amér. sept.) \*  
 L'élan d'Amérique, *cervus alce*, Linn. (Amér. sept.) \*  
 Le cerf du Bengale, Fr. Cuv.  
 La biche de Malacca, Fr. Cuv. (Asie.)  
 L'axis, *cervus axis*, Linn. (Asie.)
- V. Le cerf de Virginie, *cervus virginianus*, Linn. \*  
 Le chevrotain napu, *moschus napu*. (Java.) \*  
 L'algazel, *antilope gazella*, Gm. (Afrique.) \*  
 Le kevel, *antilope kevella*, Gm. (Afrique.)  
 La corinne, *antilope corinna*, Linn. (Afrique.)  
 Le gnou, *antilope gnu*, Gm. (Afrique.)  
 Le bubale, *antilope bubalis*, Linn. (Afrique.)
- V. La grimme, *antilope grimmia*, Gm. (Afrique.) \*
- V. Le buffle, *bos bubalus*, Linn. (Italie.)
- V. Le bison d'Amérique, *bos bison*, Linn. (Amér. sept.) \*  
 Le zébu, *bos taurus varietas*. (Afrique et Asie.)