

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON

Année 1875

(NOUVELLE SÉRIE)

TOME VINGT-DEUXIÈME

LYON
H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

65, RUE DE LYON

MÊME MAISON A GENÈVE ET A BALE

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEURS

19, RUE HAUTEFEUILLE

1876



DESCRIPTION

D'UNE ESPÈCE NOUVELLE

DE

COLÉOPTÈRES LATIGÈNES

SERVANT A FORMER UN GENRE NOUVEAU

PAR

MM. E. MULSANT ET A. GODART

Présentée à la Société linnéenne de Lyon le 12 avril 1873.

Genre *Teles*, TÉLÈS, MULSANT et GODART.

CARACTÈRES. *Menton* rétréci d'avant en arrière; faiblement échancré en arc en devant. *Antennes* prolongées un peu moins que les angles postérieurs du prothorax; de onze articles: les cinq derniers moniliformes, grossissant graduellement vers l'extrémité. *Mandibules* peu saillantes dans l'état de repos; cornées, légèrement bifides à l'extrémité. *Mâchoires* à deux lobes: l'interne plus petit. *Palpes maxillaires* allongés, à dernier article cupiforme. *Palpes labiaux* courts. *Yeux* entamés par le canthus des joues, au moins jusqu'à la moitié. *Prothorax* tronqué en devant, aussi long qu'il est large en avant, un peu plus long qu'il est large en arrière. *Écusson* court, transverse. *Élytres* subparallèles sur la majeure partie médiale de leur longueur. *Repli du prothorax* à bord interne en ligne longitudinale droite jusques après les hanches de devant. *Repli des élytres* prolongé jusqu'à l'angle sutural. *Prosternum* saillant entre les hanches antérieures. *Mésosternum* tronqué en devant entre les hanches intermédiaires. *Partie antéro-médiale* du premier arceau ventral plus largement tronquée entre les hanches postérieures. *Ventre* de cinq arceaux: les trois premiers

presque soudés et graduellement moins longs : le quatrième le plus court. *Pieds* peu allongés. *Cuisses* épaissies ou renflées. *Tibias antérieurs* un peu incurbés : dernier article des tarsi postérieurs moins long que les trois précédents réunis.

Obs. Ce genre se rapproche de celui de *Calcar*. Il s'en distingue par les différences que présentent les articles de ses antennes ; par son labre court ; par le bord antérieur de sa tête échancré en cœur à son bord antérieur ; par ses yeux très-distants du bord antérieur du prothorax ; par le repli du prothorax prolongé en ligne longitudinale droite jusqu'après les hanches de devant ; par son métasternum tronqué en devant ; par le dernier article de ses tarsi postérieurs moins long que les trois précédents réunis.

Tales Eutymi, MULSANT et GODART.

Corps allongé, peu convexe, noir ou d'un noir brun, en dessus. *Tête* à peu près aussi large que longue, offrant au devant des yeux sa plus grande largeur, un peu rétrécie en ligne presque droite, après ces organes ; échancrée au milieu de son bord antérieur, avec les côtés de cette échancrure un peu arqués ; plus convexe en arrière qu'en avant ; offrant, au niveau du bord antérieur des yeux, les traces d'une dépression transversale ; un peu déclive à sa partie antérieure. *Yeux* noirs, en partie coupés par le canthus des joues. *Antennes* insérées sous le rebord des joues ; un peu moins longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; de onze articles : le premier à peine plus long que large : le deuxième un peu plus long que large, faiblement élargi d'arrière en avant : le troisième d'un tiers plus long que le deuxième et, comme celui-ci, faiblement élargi d'arrière en avant : le quatrième de forme analogue, plus long que le deuxième et moins que le troisième : le cinquième obconique, court : les sixième à dixième moniliformes : le onzième le plus gros, subglobuleux. *Prothorax* tronqué et sans rebord en devant ; élargi sur les côtés en ligne un peu courbe jusqu'au tiers de ceux-ci, puis un peu rétréci en ligne presque droite jusqu'aux angles postérieurs ; muni latéralement d'un rebord très-étroit et peu apparent ; tronqué en ligne presque droite à la base, mais un peu sinuée près des angles postérieurs ; à angle droit

à ces derniers ; à peu près aussi long qu'il est large en devant, paraissant au moins un peu plus long qu'il est large en arrière ; médiocrement convexe ; noir ou d'un noir brun ; glabre ; marqué de points rapprochés. *Écusson* très-court, arqué en arrière, une fois plus large que long. *Élytres* à peu près aussi larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; offrant en devant, aux extrémités de son bord antérieur, une courte rainure pour loger, dans le repos, les angles postérieurs du prothorax ; faiblement élargies sur les côtés jusqu'au sixième de leur longueur, subparallèles ensuite jusqu'aux trois quarts, arrondies, prises ensemble, à l'extrémité ; rebordées latéralement ; un peu plus convexes que le prothorax ; noires ou d'un noir brun ; glabres ; marquées chacune de neuf rangées longitudinales de points assez gros ou de grosseur médiocre. *Intervalles* presque plans, marqués de points plus petits. *Dessous du corps* noir, ponctué. *Prosternum* saillant entre les hanches antérieures. *Mésosternum* entaillé en devant. *Métasternum* tronqué en devant, séparant assez largement les hanches. *Ventre* de cinq arceaux : les deux ou trois premiers soudés ou peu mobiles : les premier à troisième graduellement moins longs : le quatrième le plus court : le cinquième arqué en arrière à son bord postérieur. *Pieds* peu allongés. *Cuisses* renflées, un peu épaisses, surtout les premières ; brunes ou d'un brun à teinte d'un rouge testacé : tibiais bruns : tarses d'un rouge testacé.

Cette espèce provient de l'Asie mineure.

Nous l'avons dédiée au frère Eutyme, adjoint au supérieur des Petits-Frères de Marie et bien connu dans la science par son goût éclairé pour l'histoire naturelle.