

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON

Année 1882

—
(NOUVELLE SÉRIE)
—

TOME VINGT-NEUVIÈME

LYON
H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR
68, RUE DE LA RÉPUBLIQUE
MÊME MAISON A GENÈVE ET A BALE

PARIS
J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEUR
19, RUE HAUTEFEUILLE

—
1883

CATALOGUE
DES
CHENILLES EUROPÉENNES
CONNUES
PAR
GEORGES ROÜAST

Présenté à la Société Linnéenne de Lyon

PRÉFACE

Le Catalogue des Chenilles européennes que je sou mets à l'appré-
ciation du public compétent avait été d'abord composé pour mon
usage personnel et n'était point destiné à la publicité. Cédant aux
conseils de mes amis qui ont jugé que ce travail pouvait être utile
aux lépidoptéristes en leur épargnant de longues recherches dans
une multitude de monographies et de recueils, je me suis décidé à
le publier.

Comme on le verra, j'ai placé en regard du nom de chaque
espèce les deux indications qu'il importe le plus de connaître, à
savoir l'habitat et l'époque. Du reste, dans l'énumération des
espèces, j'ai suivi l'ordre méthodique des familles et des genres
adopté par M. Staudinger dans son grand Catalogue, et par con-
séquent j'ai cru pouvoir supprimer la mention des noms d'auteurs.

L'ordre méthodique des familles, genres et espèces me paraît de
beaucoup préférable à celui du calendrier qu'ont suivi MM. Jour-
dheuille et Merrin, et même à celui des plantes adopté par M. Kal-
tenbach pour tous les insectes. En effet, d'une part, les différences

de température d'une contrée à l'autre peuvent faire varier de plusieurs mois l'époque d'apparition d'une espèce, et, d'autre part, il est des chenilles qui ont un habitat différent suivant les pays. C'est ainsi, par exemple, qu'en Espagne, c'est sur l'*Ulex* et le *Rosmarinus* que vit la chenille du *Lycæna bætica*, tandis qu'en France c'est sur les gousses du *Colutea arborescens*. En outre, ce Catalogue s'adressant aux lépidoptéristes et non aux botanistes doit présenter en premier lieu l'indication de l'animal qui est l'objet principal de l'étude, et en second lieu la plante.

Malgré tous les soins que j'ai mis pendant quatre années à réunir les matériaux de ce travail, je crains que quelques erreurs de détail s'y soient introduites à mon insu; aussi je prie mes collègues de vouloir bien me signaler les inexactitudes ou omissions qu'ils relèveront dans ce Catalogue afin de me mettre à même de publier les rectifications ou additions dans un supplément. Je ne veux point terminer cette courte préface sans exprimer ici tous mes remerciements à M. Ragonot, qui a bien voulu revoir la partie concernant les Micro-lépidoptères. Grâce à cet excellent et savant collègue, qui s'est adonné tout spécialement à l'éducation de ces petits êtres, la dernière partie de ce travail sera de beaucoup supérieure à la première.

OUVRAGES CONSULTÉS

- GODART ET DUPONCHEL. — Histoire naturelle des Lépidoptères.
DUPONCHEL. — Iconographie des Chenilles.
MILLIÈRE. — Iconographie et description de Chenilles et Lépidoptères inédits.
— Lépidoptérologie. Sept fascicules.
— Catalogue des Lépidoptères des Alpes-Maritimes.
DE RÉAUMUR. — Mémoires pour servir à l'histoire des insectes.
DE VILLERS. — Caroli Linnæi entomologia, faunæ Sueciæ descriptionibus aucta.
STANTON. — The natural history of the Tineina.
— Insecta Britannica. Lepidoptera (Tineina et Pterophorina).
STAUDINGER. — De Sesiis agri Berolinensis.
— Catalogue des Lépidoptères qui habitent le territoire de la faune européenne.
BÈRCE. — Faune entomologique française.
BOISDUVAL. — Monographie des Zygénides.
— Index methodicus.
BOISDUVAL ET GUÉNÉE. — Species général des Lépidoptères.
BOISDUVAL, RAMBUR ET GRASLIN. — Collection iconographique et historique des
Chenilles d'Europe.
BRUAND. — Monographie des Psychides.
H. FREY. — Die Tineen und Pterophoren der Schweiz.
— Die Lepidopteren der Schweiz.
RAMBUR. — Catalogue systématique des Lépidoptères de l'Andalousie.
— Catalogue de l'île de Corse.
— Notice sur plusieurs espèces de Lépidoptères nouveaux du midi de la
France.
HEINEMANN. — Faune des Lépidoptères d'Allemagne et de Suisse.
CH. OBERTHUR. — Faune des Lépidoptères d'Algérie.
O. HOFMANN. — Ueber die Naturgeschichte der Psychiden.
— Beitrage zur Naturgeschichte der Coleophoren.
HEYLAERTS. — Notice sur l'Epichnopteryx Tarnierella.
ZELLER. — Chilonidarum et Crambidarum genera et species.
— Die Gattungen der mit Augendeckeln versehenen blattminirenden Schaben.
— Die Arten der Blattminirergattung Lithocolletis.
— Beitrag zur Kenntniss der Coleophoren.

- ZELLER. — Revision der Pterophoriden.
 — Die Depressarien und einige ihnen nahe stehende Gattungen.
 — Die Schaben mit langen Kiefertastern.
 — Die Argyresthien.
- MENETRIÈS. — Enumeratio corporum animalium Musei imp. Petropoli.
 — Lépidoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour.
- J. LEDERER. — Contributions à la faune des Lépidoptères de la Transcaucasie.
- J. MERRIN. — The Lepidopterist's Calendar.
- JOURDHEUILLE. — Calendrier du Microlépidoptériste.
- DE PEYERIMHOFF. — Catalogue des Lépidoptères d'Alsace.
- CUNI Y MARTORELL. — Catalogue des Lépidoptères de Catalogne.
- FOUCART. — Catalogue des Lépidoptères des environs de Douai.
- G. LE ROI. — Catalogue des Lépidoptères du département du Nord.
- BRUAND. — Catalogue des Lépidoptères du Doubs.
- STEFANELLI. — Catalogo illustrativo di Lepidotteri Toscani.
- CONSTANT. — Catalogue des Lépidoptères du département de Saône-et-Loire.
- DUJARDIN. — Catalogue des environs d'Amiens.
- MAURICE SAND. — Catalogue des Lépidoptères du Berry et de l'Auvergne.
- DONZEL. — Notes relatives aux Lépidoptères, manuscrit.
 — Notice sur les environs de Digne et quelques points des Basses-Alpes.
- KEFERSTEIN ET WERNEBURG. Catalogue des Lépidoptères d'Erfurth.
- CH. ET ALP. DUBOIS. — Les Lépidoptères de l'Europe, leurs chenilles et leurs chysalides.
- CANTENER. — Catalogue des Lépidoptères du Var.
- ANNALES. — Société entomologique de France.
 — Société linnéenne de Lyon.
 — Société entomologique de Belgique.
 — Petites nouvelles entomologiques.
 — Petite feuille des jeunes naturalistes.

CATALOGUE
DES
CHENILLES EUROPÉENNES
CONNUES

RHOPALOCERA

PAPILIO

- Podalirius.** — Pommier, Pêcher, Amandier, *Berberis vulgaris*, *Prunus spinosa*, *Prunus communis*; juin, juillet, août et septembre.
(Var.) **Festhameli.** — *Prunus spinosa*; février et mars; MARTORELL.
Alexanor. — *Seseli montanum*; du 20 juillet au 15 août.
Machaon. — *Daucus carota*, *Peucedanum*, *Ferula*, *Anethum fœniculum*, *Seseli*, *Ruta graveolens*, etc.; juin à août; MERRIN. — Je l'ai trouvée jusqu'à fin octobre.
Hospiton. — *Ferula nodiflora* ?

THAIS

- polyxena.** — *Aristolochia pistolochia*; en mai; mais il ne faut la chercher que les premiers jours de juillet ou d'août. — *Aristolochia rotunda*; BOISDUVAL, RAMBUR et GRASLIN. — Variété *polymnia*, MILL.; *Aristolochia clematitis*; avril, mai.
rumina. — *Aristolochia pistolochia*; parvenue à toute sa taille, juillet et août; d'après BERCE, mai et juin. — Vit sur *A. bœtica* suivant RAMBUR.

DORITIS

- Apollina.** — *Aristolochia*; Herrich SCHOEFFER.

PARNASSIUS

- Apollo.** — Plusieurs espèces de *Sedum* et de *Saxifraga*; avril, mai et juin.
- Mnemosyne.** — *Corydalis Halleri*; H. SCHAEFFER; avril, mai et juin. — *Sedum* et *Saxifraga*; MARTORELL.
- Delius.** — La chenille vit sur le *Saxifraga aizoides*; Heinrich FREY.

APORIA

- cratægi.** — *Cratægus oxyacantha*, *Cerasus mahaleb*, *Prunus spinosa*; plusieurs arbres fruitiers, quelquefois sur le *Quercus robur*; mars, avril et mai.

PIERIS

- brassicæ.** — Toutes les Crucifères et notamment sur les différentes variétés du *Brassica oleracea*; depuis le commencement de l'été jusqu'à la fin de l'automne.
- rapæ.** — Crucifères, *Tropæolum majus*, *Reseda*, etc.; juin et septembre.
- napi.** — *Rapa*, *Reseda lutea* et *R. luteola*, la Capucine; dans les champs et les jardins; juin et septembre.
- Callidice.** — Crucifères près des neiges éternelles; août et septembre.
- Daplidice.** — *Reseda lutea*, *Turritis glabra*, *Sisymbrium erucastrum* et *S. sophia*, *Thlaspi arvense*, *Erysimum cheiranthoides*, *Brassica cheiranthus*; juin et septembre.

ANTHOCHARIS

- belia.** — *Sisymbrium erucastrum*, *Sinapis incana*; suivant M. CONSTANT elle doit vivre sur le *Barbarea vulgaris*; les derniers jours de juillet, elle a acquis toute sa taille.
- Tagis.** — *Iberis pinnata*; juin.
- cardamines.** — Sur plusieurs Crucifères principalement les *Cardamine impatiens* et *C. pratensis*; juin et juillet.
- Damone.** — *Isatis tinctoria*; Herrich SCHAEFFER.
- euphenoides.** — *Biscutella didyma*; milieu de l'été (en juillet).

ZEGRIS

- Eupheme.** — *Sisymbrium sophia*, *Lepidium perfoliatum*; EVERS-MANN. — *Sinapis incana*, *Rhaphanus*, *Brassica*; RAMBUR. — A toute sa taille en mai.

LEUCOPHASIA

sinapis. — *Lotus corniculatus*, *Vicia cracca*, les *Lathyrus* et les *Orobus*; juin et septembre.

COLIAS

Paleno. — *Vaccinium uliginosum*; en mai.

Hyale. — *Coronilla varia* et sur différentes Légumineuses du genre *Vicia*; Alp. DUBOIS. — *Trifolium*, *Medicago* et diverses Légumineuses herbacées; DONZEL. — Juin et septembre.

Edusa. — Plusieurs espèces de *Trifolium* et *Cytisus*; juin, août et septembre; CORONILLA; MARTORELL.

Aurorina. — *Astragalus caucasicus*; avril; HABERHAUER (LEDERER).

rhamni. — *Rhamnus cathartica* et *Rh. frangula*; plusieurs fois dans l'année, plus sûrement, en septembre. — *Rhamnus alaternus*; MARTORELL.

Cleopatra. — *Rhamnus alpina* et *Rh. alaternus*; juin et août.

THECLA

betulæ. — *Betula alba*, *Prunus domestica*, *P. spinosa*; juin et juillet, depuis avril jusqu'à la fin de juin; Alp. DUBOIS.

spini. — *Crataegus oxyacantha*, *Prunus spinosa*, et *Rhamnus cathartica*; Ch. DUBOIS; mai, juin et juillet. — DONZEL ne mentionne que mai.

w. album. — *Ulmus campestris*; fin mai-commencement de juin; *Crataegus oxyacantha*; BOISDUVAL, RAMBUR et GRASLIN.

ilicis. — *Ulmus campestris*, *Acacia*, *Quercus robur*, *Quercus ilex*; DONZEL. — *Quercus coccifera*; avril; MARTORELL. — A toute sa taille en juin ou en mai; BERCE, DONZEL.

acaciæ. — *Prunus spinosa*; DONZEL.

pruni. — *Prunus spinosa*, *Berberis vulgaris*, *Corylus avellana*, *Quercus robur*, *Betula alba* (*Prunus padus*, catalogue des Lépidoptères d'Alsace de PEYERIMHOFF); mai. — Mai et juin; Alph. DUBOIS.

roboris. — La chenille vit sur le *Fraxinus excelsior*; DONZEL.

quercus. — *Quercus robur*; courant de mai au 15 juin.

rubi. — *Rubus cæsius* et *R. fruticosus*, *Genista scoparia* et *G. tinctoria*, *Hedysarum onobrychis*; à toute sa croissance en juillet et août.

THESTOR

Ballus. — *Lotus hispidus*, Légumineuses herbacées ; les chenilles se mangent entre elles ; RAMBUR ; ont acquis toute leur taille à la fin de mai.

POLYOMMATUS

virgaureæ. — *Solidago virgaurea*, *Rumex acutus* ; juin et septembre. — Les *Rumex crispus*, *acetosa* et *acetosella* ; Ch. DUBOIS.

Hippochoë. — *Rumex acetosa* et *R. acetosella* ; fin mai et juin. — On la rencontre une deuxième fois en septembre ; Alph. DUBOIS.

Alciphron. — *Rumex acetosa* ; avril et mai.

Dorilis. — *Rumex acetosa*, *Genista scoparia* ; fin juin, courant de septembre.

Phlœas. — *Rumex acetosa* (et *R. obtusifolius*, *crispus*, *acetosella*, *scutatus* ; avril et mai ; Ch. DUBOIS) ; à différentes époques de l'année. — RAMBUR dit que la chenille vit surtout sur le *Rumex acetosella*.

Amphidamas. — Principalement *Polygonum bistorta* et aussi sur les *Rumex maritimus*, *crispus*, *obtusifolius*, *acetosa* ; juillet et août ; Ch. DUBOIS.

LYCÆNA

bætica. — Gousses du *Colutea arborescens*, *Lupinus mutabilis* ; on la nourrit en captivité, de pois verts ; fin juillet à septembre et octobre. — En Espagne, m'écrit M. MARTORELL, elle vit sur toutes les plantes, mais principalement sur les *Genista*, *Ulex* et *Rosmarinus*. — Selon RAMBUR, sur la plupart des Légumineuses.

Telicanus. — Est polyphage, quoique se trouvant surtout sur le *Lythrum salicaria* ; RAMBUR. — Les chenilles s'entre-dévorent. — *Calluna vulgaris* ; MILLIÈRE.

Argiades. — *Lotus corniculatus*, *Onobrychis sativa* et *Rhamnus frangula* ; juin, août et septembre ; Alph. DUBOIS. — *Trifolium pratense* et *T. arvense*, *Pisum sativum*, *Anthyllis vulneraria*, *Medicago falcata* et *M. lupulina* ; FREY.

Egon. — *Colutea arborescens*, *Genista scoparia* ; et aussi, dit Charles DUBOIS, sur *Genista germanica*, *Cytisus laburnum*, *Melilotus officinalis*, *Ulex europæus* ; mai.

Argus. — Les *Genista*, *Hedysarum*, *Onobrychis*, *Melilotus officinalis* et autres Légumineuses ; courant mai.

- Optilete.** — *Vaccinium uliginosum*, peut-être aussi sur les *V. myrtillus* et *V. oxycoccos*; FREY.
- Orion.** — *Sedum telephium*; juillet.
- Baton.** — *Thymus vulgaris* et probablement sur le *Thymus serpyllum*; éclôt vers le milieu et la fin d'avril; a son entier développement le 15 ou le 20 mai. — *Coronilla varia*; FREY.
- Astrarche.** — Vit, dit-on, sur les *Trifolium*; Alph. DUBOIS. — *Erodium cicutarium*; de septembre à avril; MERRIN, FREY.
- (Var.) **Artaxerces.** — *Helianthemum vulgare*; mai; MERRIN.
- Icarus.** — *Ononis spinosa*, *Medicago sativa*, *Fragaria vesca*, *Astragalus glycyphyllos*, les *Trifolium*, les *Onobrychis*; mai et fin juillet.
- Eumedon.** — Vit probablement des fruits du *Geranium sanguineum*; FREY.
- Escheri.** — Selon SAPORTA, la chenille doit vivre sur l'*Astragalus incanus*; sa nourriture consiste en *Plantago* selon HIMMIGHOFFEN et probablement aussi en *Cynoglossum*; mars et avril; MARTORELL. — *Astragalus monspessulanus*; DONZEL.
- Bellargus.** — *Hippocrepis comosa*, *Genista sagittalis*, les *Trifolium* et d'autres Légumineuses; avril et mai.
- Coridon.** — Les *Trifolium*, *Lotus*, *Hippocrepis* (*Plantago*; MARTORELL); mai et juin.
- Hylas.** — *Thymus vulgaris*, probablement *serpyllum*. — Le 15 ou le 20 mai, la chenille se métamorphose. — *Trifolium* et *Melilotus officinalis*; FREY.
- Meleager.** — *Thymus latifolius*, *Orobus niger*.
- Admetus.** — La variété *Ripparii* vit sur l'*Onobrychis saxatilis*; DONZEL.
- Dolus.** — *Onobrychis sativa*; mai.
- Damon.** — *Onobrychis sativa* et *O. supina*; fin mai.
- Argiolus.** — Les *Doryenium* (*Hedera helix*, *Rhamnus frangula*; OCHSENHEIMER); elle se transforme, fin mai, premiers jours de juin; puis en septembre.
- Sebrus.** — *Onobrychis montana*; la femelle dépose ses œufs sur les fleurs en boutons; DONZEL.
- minima.** — *Astragalus cicer* (*Onobrychis sativa*, *Melilotus arvensis* et *M. officinalis*, *Trifolium procumbens* et *T. campestre*, *Coronilla varia*; Alph. DUBOIS); mai et juillet.
- semiargus.** — *Melilotus officinalis* et *M. arvensis*, *Astragalus gly-*

cyphyllos; Alph. DUBOIS. — *Anthyllis vulneraria*, *Armeria vulgaris*; FREY.

Cyllarus. — Plusieurs *Astragalus*, *Medicago*, *Trifolium*, *Onobrychis*, *Melilotus officinalis*, *Genista sagittalis*; mai et août.

melanops. — Les *Dorycnium suffruticosum*, etc.; parvenue à toute sa grosseur fin mai, premiers jours de juin.

Jolas. — *Colutea arborescens* dans les capsules; BERCE; août et septembre.

Erebus. — *Sanguisorba officinalis*; FREY.

Arlon. — Sur les Papilionacées, selon QUÆDVLIËG. — *Thymus serpyllum*; mars; MERRIN.

Euphemus. — Extrémité des graines du *Sanguisorba officinalis*; A. SCHMID.

NEMEOBIUS

Lucina. — Différentes espèces de *Primula* et de *Rumex*; juin et septembre. — Juillet et août; Alph. DUBOIS, d'après FREYER.

LIBYTHEA

celtis. — *Celtis australis*; en captivité, on peut la nourrir avec le Cerisier; GODART; avril, mai et juillet.

CHARAXES

Jasius. — *Arbutus unedo*. Éclôt fin septembre, passe l'hiver et arrive à toute sa taille en mai, puis en juillet.

APATURA

Iris. — Le Tremble, les Peupliers noirs et blancs et les grands Chênes; se chrysalide vers le 15 mai. — Mai et juin, BERCE.

Illa. — *Populus tremula* et autres *Populus*, les *Salix*; mai et juin.

LIMENITIS

populi. — Les *Populus* et *Salix* (Charles DUBOIS: *Populus tremula* seulement); se chrysalide vers le 20 mai, après avoir passé l'hiver.

Camilla. Les *Lonicera*, principalement les *xylosteum* (et *periclymenum*; MARTORELL); passe l'hiver et arrive à toute sa taille en avril et courant de juillet.

Sibylla. — *Lonicera periclymenum* et *L. xylosteum*; mai. — *Lucilla neptis*, *Spiræa salicifolia*; FREY.

VANESSA

- Levana.** — *Urtica dioica*; septembre et juin.
- Egea.** — *Parietaria officinalis*; mai.
- G. album.** — *Ulmus campestris*, *Urtica dioica*, *Corylus avellana*, *Ribes rubrum*, *Lonicera xylosteum*, *Prunus spinosa*, *Humulus lupulus*; vit solitaire; juin et août.
- polychloros.** — Sur le Saule, l'Orme, l'Alisier, le Cerisier, le Chêne, en petite société; juin et août. — La larve mange souvent le *Celtis australis*; RAMBUR.
- xanthomelas.** — *Salix caprea* et *S. vitellina*; juin et juillet.
- L. album.** — *Salix helix*, *Hypophae rhamnoides*.
- urticæ.** — *Urtica dioica*, en famille; depuis fin avril jusqu'en septembre. (Var.) *Ichnusa*. — Même époque que le *V. urticæ*; la chenille, dit RAMBUR, vit sur l'*Urtica hispida*, en captivité; quoique préférant l'*hispida* elle s'accommode des *Urtica pilulifera*, *membra-nacea* et *dioica*.
- Jo.** — Plusieurs sortes d'*Urtica*, l'*Humulus lupulus*; vit en société; fin juin et commencement août.
- Antiopa.** — Les Saules, les Peupliers, les Bouleaux, l'Osier, l'Orme; vit en société; fin juin et fin août.
- Atalanta.** — Les *Urtica urens* et *U. dioica* (*Parietaria diffusa*; MARTORELL); juillet, août et septembre.
- Callirhoe.** — Vit sur les Orties; juillet, août et septembre.
- cardui.** — *Cirsium*, *Carduus*, *Malva*, *Urtica*, *Echium vulgare*; vit solitaire; juin, juillet à septembre.

MELITÆA

- Cynthia.** — *Plantago lanceolata*; en juin; est polyphage, d'après FREY.
- Materna.** — *Populus alba* et *P. tremula*, *Salix caprea*, *Fagus sylvatica*, *Scabiosa succisa*, les *Plantago*, *Fraxinus excelsior*; hiverne et se chrysalide en mai.
- Aurinia.** — Les *Plantago*, *Scabiosa*; vit en société dans le jeune âge, passe l'hiver sous une toile; avril, juillet et septembre.
- (Var.) *Merope.* — *Primula viscosa*; juin.
- (Var.) *Desfontainii.* — Chen. sur le Plantain; RAMBUR. — D'après LORQUIN, elles vivraient en société sur le *Lonicera*.

- Cinxia.** — Les *Plantago*, principalement le *P. lanceolata*, *Centaurea jacea*, *Veronica agrestis*, *Hieracium pilosella*; vit en famille; mars, avril, août et septembre.
- Phœbe.** — *Centaurea scabiosa*, *C. jacea*; mai, juin et septembre. — Je l'ai toujours trouvée sur la *Centaurea paniculata*, en société, au mois de juillet. — *Centaurea aspera*; MARTORELL.
- trivia.** — *Verbascum thapsus*; OCHSENHEIMER. — Se chrysalide vers la fin de mai.
- Didyma.** — Les *Veronica*, *Artemisia*, *Linaria vulgaris*, plusieurs espèces de *Plantago*; mai et juin.
- Dictynna.** — *Veronica agrestis*. — Les *Melampyrum pratense*, *sylvaticum*, *cristatum*, *nemorosum*, les *Plantago major*, *lanceolata*, *media*; Ch. DUBOIS. — A toute sa taille fin mai.
- Dejone.** — *Linaria monspeliensis*; BELLIER DE LA CHAVIGNERIE. — RAMBUR mentionne les *Linaria* en général.
- Athalia.** — Plusieurs sortes de *Plantago*, *Melampyrum pratense* et *M. sylvaticum*, *Centaurea nigra*, *Hieracium pilosella*, *Valeriana dioica*; mars, avril, mai et septembre.
- Parthenie.** — *Plantago lanceolata*, d'après OCHSENHEIMER; mai. — *Plantago major*; à la fin de juin, commencement juillet; RAMBUR. — Sur les Scabieuses; FREY.
- Aurelia.** — Sur le *Melampyrum* et le *Plantago*; FREY.

ARGYNNIS

- Aphirape.** — *Polygonum bistorta*; mai et juin; Alph. DUBOIS.
- Selene.** — Plusieurs espèces de *Viola*; avril et septembre. — Juin et septembre; DONZEL. — En juin seulement, suivant M. BERCE. — Depuis juillet à mars; M. MERRIN.
- Euphrosyne.** — Plusieurs espèces de *Viola*; juin et septembre. — Avril et mai; Ch. DUBOIS. — *Fragaria*; FREY.
- Pales.** — *Viola montana*; principalement en mai.
- Dia.** — Différentes espèces de *Viola*; juin, juillet et septembre.
- Amathusia.** — *Polygonum bistorta*; fin mai; OCHSENHEIMER.
- Daphne.** — *Rubus idæus*; mai et juin. — Framboisier commun; BERCE.
- Ino.** — *Rubus idæus* et l'*Urtica*; fin mai. — Ch. DUBOIS n'indique que la *Sanguisorba officinalis* et la *Spiræa aruncus*. — Sur le Framboisier; DONZEL.

- Lathonia.** — *Borrago officinalis*, *Viola tricolor*, *V. canina*, *Onobrychis sativa*; mai, juillet et août.
- Aglaia.** — *Viola canina* (Les *Viola odorata*, *palustris*, *sylvestris* et *tricolor*; Ch. DUBOIS); premiers jours de juin.
- Niobe.** — Les *Plantago*, les *Viola odorata* et *tricolor*; mai et juin.
- Adippe.** — Les *Viola tricolor* et *canina* (*V. odorata*, *arvensis*, *hirta*; Ch. DUBOIS); mai et juin.
- Paphia.** — *Viola canina*, *Rubus idæus*, *Cheiranthus tristis*, quelquefois l'*Urtica* (et aussi *Cratægus oxyacantha*, *Hesperis matronalis*, *Dentaria bulbifera*; Ch. DUBOIS); mai et juin.
- Pandora.** — *Viola tricolor*; FREYER.

DANAIS

- Chrysippus.** — Plusieurs *Asclepias*, principalement l'*Asclepias fruticosa*.

MELANARGIA

- Galathea.** — *Phleum pratense* et plusieurs autres Graminées; avril, mai et juin.
- Lachesis.** — *Lamarckia aurea* principalement, et diverses Graminées.
- Japygia.** — Diverses Graminées; semble préférer la *Lamarckia aurea*.
- Syllius.** — *Brachypodium pinnatum*; se chrysalide commencement mai. — Selon d'autres auteurs; elle vit sur diverses Graminées; s'enterre assez profondément pour se transformer.

EREBIA

- Epiphron.** — *Poa annua*, *Festuca ovina*; août; passe l'hiver, se chrysalide en mai; MERRIN.
- Medusa.** — *Panicum sanguinale*; arrive à toute sa taille à la fin de mai.
- Evias.** — DONZEL a vu la femelle déposant ses œufs sur une Graminée, très dure, en touffe.
- Æthiops.** — *Dactylis glomerata* et quelques autres Graminées; mai et juin; Alph. DUBOIS.
- Ligea.** — *Panicum sanguinale*; Alph. DUBOIS; a toute sa taille fin juin, après avoir passé l'hiver. — *Milium effusum*; FREY.

SATYRUS

- Hermione.** — Vit sur les Graminées, particulièrement l'*Holcus mollis*; mai et commencement juin. — *Holcus lanatus*; FREY.

- Alcyone.** — *Brachypodium pinnatum* exclusivement ; passé l'hiver, parvient à toute sa taille à la mi-mai.
- Circe.** — *Anthoxanthum odoratum*, *Lolium perenne* et plusieurs espèces de *Bromus* ; a toute sa taille à la fin de mai.
- Briseis.** — Sur les Graminées ; MARTORELL. — Se nourrit de racines de Graminées, principalement : *Sesleria cærulea*. — A toute sa taille mai et juin ; FREYER.
- Semele.** — Graminées, principalement : *Aira cæspitosa* et *A. montana* ; mai. — Avril et mai ; BERGE.
- Fidia.** — Vit sur diverses Graminées, sur le *Piptatherum multiflorum* ; éclôt du 10 au 15 juillet ; en mai suivant, parvient à toute sa taille.
- Dryas.** — *Avena elatior* ; et probablement, ajoute DONZEL sur plusieurs Graminées ; en juin.
- Climene.** — Vit uniquement de Graminées.
- Mæra.** — Les Graminées, notamment le *Poa annua*, *P. fluitans*, *Hordeum murinum* ; avril et juin.
- Megara.** — Se nourrit de Graminées, *Poa*, *Hordeum*, *Festuca* ; avril et juin.
- (Var.) **Tigelius.** — Vit de Graminées ; paraît presque toute l'année.
- Egeria.** — *Triticum repens* et d'autres Graminées, *Poa trivialis*, *P. nemoralis*, etc. ; fin de l'été, et en mai et juin. — Depuis septembre jusqu'en mars ; MERRIN.
- Achine.** — *Lolium perenne* ; avril et mai.

EPINEPHELE

- Lycæon.** — Les Graminées ; mai et juin.
- Janira.** — Plusieurs Graminées, particulièrement les *Poa pratensis*, *annua*, *trivialis* ; passe l'hiver et croît jusqu'à la fin de mai ou au commencement de juin.
- Ida.** — Les Graminées, principalement le *Triticum cæspitosum* ; avril et mai.
- Tithonus.** — Les Graminées, principalement les *Poa annua* et *trivialis* ; mai et juin.
- Pasiphae.** — Vit isolément sur les Graminées ; parvient à toute sa taille, fin avril commencement mai.
- Hyperanthus.** — Les Graminées, principalement le *Milium effusum*, *Poa annua*, *Carex sylvatica*, *C. cæspitosa* ; mai et juin.

CÆNONYMPHA

- Hero.** — *Elymus europæus* et plusieurs Graminées; FREY.
- Iphis.** — Les Graminées, principalement le *Melica ciliata*; avril et mai.
- Arcania.** — Les Graminées, surtout les *Melica ciliata* et *M. nutans*; vers le milieu de mai, elle se chrysalide.
- Corinna.** — *Carex gynomane*, *Triticum cæspitosum*; mai et juillet; BOISDUVAL, RAMBUR et GRASLIN. — Mai, juillet et août; DONZEL.
- Pamphilus.** — Les Graminées en particulier, Alph. DUBOIS. — *Cynosurus cristatus* et les *Poa*; avril, mai, août et septembre.
- Tiphon.** — *Rhynchospora alba*; août; se chrysalide en mai, après avoir passé l'hiver; MERRIN. — *Festuca elatior*; FREY.

SPILOTHYRUS

- Alcæ.** — Différentes espèces de *Malva*, l'*Althæa rosea*; juin et septembre.
- Althæa.** — *Marrubium vulgare*; MARTORELL. — Selon RAMBUR, *Marrubium hispanicum*. — Elle se rencontre dès la fin de l'hiver, au printemps et à la fin de l'été.
- Lavateræ.** — *Stachys recta*; entre les feuilles qu'elle lie; FREY.

SYRIGHTHUS

- Proto.** — *Phlomis lychnitis*; elle réunit les feuilles des extrémités pour s'y loger; mai; DONZEL.
- Sao.** — *Poterium sanguisorba*, le Framboisier.
- Alveus.** — Vit de Graminées et de Malvacées; MARTORELL. — *Rubus idæus*, RAMBUR. — *Potentilla incana*; ZELLER.
- malvæ.** — *Fragaria vesca*; avril. — *Rubus fruticosus* et *R. idæus*; MERRIN. — *Potentilla*, Fraisier des bois, *Comarum palustre*; ZELLER.

NISONIADES

- Tages.** — *Eryngium campestre*, *Lotus corniculatus*; mai, juin et septembre; OCHSENHEIMER.

HESPERIA

- thaumas.** — *Aira montana* et plusieurs Graminées; Juin, juillet, août et septembre. — Juin; BERCE. — En mai et juillet; Alph. DUBOIS.
- lineola.** — Les Graminées; dans les lieux secs et arides; juin.

Actæon. — *Calamagrostis epigeios* ; juin ; MERRIN.

sylvanus. — *Triticum repens* ; hiverne et se métamorphose en mai ;
FREYER. — *Festuca, Poa, Avena* et *Holeus* ; FREY.

Comma. — *Coronilla varia* ; à acquis toute sa taille vers le milieu de
juillet. — *Coronilla varia, Hippocrepis comosa* et sur diverses
Graminées ; mai et juillet ; Alph. DUBOIS.

CYCLOPIDES

Morpheus. — Graminées dans les bois ; mai et juin.

CARTEROCEPHALUS

Palæmon. — *Plantago major* ; passe l'hiver et se chrysalide, courant avril.

HETEROCERA

SPHINGES

ACHERONTIA

Atropos. — *Solanum tuberosum*, *S. dulcamara*, *Lycium barbarum*, *L. europæum*, *Amomum*, *Datura stramonium*, *Evonymus europæus*, *Pyrus malus*, *Jasminum fruticans*, *J. officinale*, *Cannabis sativa*, *Faba vulgaris*; mi-juillet jusqu'en octobre.

SPHINX

convolvuli. — Les *Convolvulus*, particulièrement l'*arvensis*, l'*Ipomea coccinea*, *Convolvulus tricolor*; juin, juillet, août et septembre.

ligustri. — *Ligustrum vulgare*, *Syringa vulgaris*, *Fraxinus excelsior*, *Viburnum tinus*, quelquefois *Nerium oleander*, *Sambucus nigra*, *Spiræa aruncus*; depuis fin juillet jusqu'en septembre.

pinastri. — Différentes espèces de *Pinus*; juin, juillet, août et septembre. — Seulement août et septembre; BERCE.

DEILEPHILA

vespertilio. — *Epilobium angustifolium*, *Galium verum*; juillet et fin septembre.

hippophæis. — *Hippophae rhamnoides*, *Epilobium angustifolium*; juin, juillet, août et septembre.

zygophylli. — *Zygophyllum fabago*.

galii. — *Rubia tinctorum*, *Galium verum*, *Epilobium palustre* et *E. hirsutum*, les *Escalonia*; en juin et en juillet. — Alph. DUBOIS, ajoute *Euphorbia cyparissias*; depuis juillet jusqu'en septembre.

tithymali. — *Euphorbia paralias*; en captivité *E. cyparissias*; pendant une grande partie de l'année.

euphorbia. — Les *Euphorbia Gerardiana*, *cyparissias*, *esula*, *paralias*; juin, juillet et août.

- Nicæa.** — Plusieurs *Euphorbia*, principalement l'*esula*, *characias* et *pinifolia*; juillet et septembre. — *Euphorbia peplis*, *pilosa*, *nicæensis* et *serrata*; BOISDUVAL et GUENÉE.
- Dahli.** — *Euphorbia paralias*, *E. myrsinites*, etc., au bord de la mer, jamais dans l'intérieur des terres ni dans les montagnes; mai et juin, septembre et octobre.
- Livornica.** — Polyphage, *Galium verum*, les *Rumex*, les *Linaria*, *Sonchus arvensis*, *Vitis vinifera*, les *Fuchsias*; se transforme vers la fin de juillet.
- celerio.** — *Vitis vinifera*, *Galium verum*, *Ampelopsis hederacea*, et aussi, selon FREYER, *Daucus carota*; juin, août et septembre.
- Alecto.** — Dans l'Inde, la chenille est commune sur différentes espèces de vignes.
- elpenor.** — *Epilobium palustre* et *E. hirsutum*, *Polygonum persicaria*, *Vitis vinifera*, *Galium verum* et *G. aparine*; fin juillet à mi-septembre.
- porcellus.** — *Galium verum*, *Epilobium angustifolium*; juillet et août.
— Je l'ai nourrie avec le *Galium mollugo*.
- nerii.** — *Nerium oleander*, *Vinca minor*; à la fin de l'été et à l'automne.

SMERINTHUS

- tiliæ.** — *Ulmus campestris*, *Tilia europæa*, quelquefois *Æsculus hippocastanum*; milieu août jusqu'à la fin de septembre.
- quercus.** — *Quercus ilex* (et aussi, selon BOISDUVAL et GUENÉE, *Quercus robur* et *Q. austriaca*;) est fort délicate; fin juillet jusqu'en septembre.
- ocellata.** — Les *Salix babylonica*, *alba*, *vitellina*, *Persica vulgaris*, *Amygdalus communis*, *Pyrus malus*, les *Populus nigra*, *tremula* et *fastigiata*, *Prunus spinosa*; se chrysalide courant juillet.
- populi.** — Différentes espèces de *Populus* et de *Salix*, *Betula alba*; juillet, septembre et octobre.
- tremulæ.** — *Populus tremula*, *Populus fastigiata*. — Selon FISCHER, vit exclusivement sur le *Populus tremulæ*.

PTEROGON

- œotheræ.** — Les *Epilobium rosmarinifolium*, *roseum* et *montanum*, *Enothera biennis*; se métamorphose en juillet et août.
- Gorgon.** — Plusieurs espèces de *Galium*.

MACROGLOSSA

- stellatarum.** — *Galium mollugo*; mai et août.
- croatica.** — *Asperula calabrica*; DAHL. — *Scabiosa cephalaria*; *S. centaureoides*, certaines *Centaurées*. — Commencement juillet à mi-août; MILLIÈRE.
- bombylifomis.** — Plusieurs *Lonicera*, *Galium verum*, *Scabiosa succisa*; juillet et août.
- fuciformis.** — Les *Scabiosa succisa*, *sylvatica*, *columbaria*, *arvensis*, *Lychnis dioica*; juin, juillet, septembre et octobre.

TROCHILIUM

- apiforme.** — Dans les tiges ou dans les racines des *Salix* et des *Populus*; mars et avril.
- craboniforme.** — Intérieur des *Saules*, *Salix caprea*, etc.; mars e avril.
- melanocephalum.** — Tronc du *Populus tremula*; vit deux ans, se transforme en avril ou mai.

SCIAPTERON

- tabaniforme.** — Tronc du *Betula alba*, *Populus nigra* et *P. tremula*, sous l'écorce et dans les racines; se transforme en mai ou au commencement de juin.
- (Var.) **rhingiiforme.** — Le papillon a été pris sur le *Sambucus ebulus*, STEFANELLI, ce qui fait croire que la chenille s'y trouverait.

SESIA

- scolliaformis.** — Troncs pourris du *Betula alba* et *Alnus viscosa*; BERCE; passe deux hivers, se transforme ordinairement en mai. — Juin; STAUDINGER.
- spheciformis.** — Troncs abattus de l'*Alnus incana* et *A. glutinosa* (peut-être même dans le *Betula alba*; STAUDINGER). — Avril; MERRIN. — Passe deux hivers.
- cephiformis.** — L'abbé FETTIG croit qu'elle doit vivre dans les tiges ou les racines des *Rubus*. — *Pinus abies*; OGHSENHEIMER.
- tipuliformis.** — Intérieur des *Ribes rubrum*, *nigrum* (et aussi des *Corylus avellana*, selon Alph. DUBOIS). — Vit en été et en automne; se métamorphose vers le 20 avril.

- conopliformis.** — Les vieilles souches de *Quercus robur*; se transforme vers le 20 mai.
- asiliformis.** — Troncs du Bouleau et du Peuplier d'Italie; en septembre.
— Dans les gros troncs et les vieilles souches de *Quercus robur* et souvent dans les excroissances malades; passe deux hivers, selon BERCE. — Se chrysalide en mai et commencement juin; STAUDINGER.
- myopæformis.** — Troncs des *Pyrus malus* vieux; passe deux hivers; STAUDINGER. — *Pyrus communis*, *Prunus domestica*, *Cratægus oxyacantha*, dans les tiges; MERRIN. — Se métamorphose en juin.
- typhæformis.** — Troncs et rameaux du *Pyrus malus*; se transforme en chrysalide commencement de juin; STAUDINGER. — Passe deux hivers.
- culiciformis.** — Dans l'écorce du *Prunus domestica* et du *Pyrus malus*.
— Selon d'autres auteurs, la chenille vivrait dans le tronc et les branches du *Betula alba* et très rarement *Alnus viscosa*. — Ne passe qu'un hiver, se transforme fin avril ou mai.
- formicæformis.** — Troncs et racines des *Salix alba*, *triandra* et *viminalis*; rarement sur le premier; se chrysalide en mai, juin ou juillet; passe deux hivers. — Selon STAUDINGER, elle ne passerait qu'un hiver.
- ichneumoniformis.** — Les gros troncs et les vieilles souches de *Quercus robur* et souvent dans les excroissances malades; passe deux hivers; la chenille a toute sa taille dans les vingt premiers jours d'avril.
- empiformis.** — Passe deux hivers; vit dans les racines de l'*Euphorbia cyparissias*, y pénètre par les tiges endommagées; se transforme en mai (en juin; STAUDINGER).
- muscæformis.** — Tiges du *Statice armeria*; juillet et septembre; MERRIN.
- affinis.** — Dans les racines de l'*Helianthemum*; vit tout l'été et jusqu'à novembre; MARTORELL.
- leucopsiformis.** — Vit dans les racines d'*Euphorbia* et hiverne probablement deux fois.
- anthraciformis.** — *Euphorbia myrsinites*; RAMBUR.
- chrysidiformis.** — Racines de l'*Artemisia campestris* et de l'*Helianthemum*; GRASLIN. — *Rumex crispus*; P. MABILLE. — Avril; MERRIN.

BEMBEZIA

hylæiformis. — Intérieur des jeunes branches du *Rubus idæus*; LASPEYRES et *Rubus fruticosus*; HUBNER. — Se transforme en mai ou juin.
— Racines, passe sûrement un hiver; STAUDINGER.

PARANTHRENE

tineiformis. — Selon Adrien de VILLIERS, vivrait dans les tiges de l'*Echium vulgare*.

THYRIS

fenestrella. — *Clematis vitalba*; juillet, août et septembre. — Le *Sambucus* et peut-être les *Lactuca*; MARTORELL. — Dans les tiges de *Sambucus ebulus* et *S. nigra*, et aussi *Arctium lappa*; OCHSENHEIMER.

diaphana. — Tiges des *Phaseolus*; BOISDUVAL et GUÉNÉE; quelquefois même entre les feuilles de cette plante.

HETEROGYNIS

penella. — Les *Genista purgans*, *scoparia* et *sagittalis*; surtout cette dernière espèce. — *Ulex*; MARTORELL. — A toute sa taille en mai.

paradoxa. — Sur un *Genista*; avril, mai, juin.

AGLA OPE

infausta. — *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*, *Amygdalus communis*, *Armeniaca vulgaris* et autres arbres fruitiers; mai.

INO

pruni. — *Prunus spinosa*, *Quercus robur*, *Cratægus oxyacantha*, *Calluna vulgaris*; mai.

chloros. — *Globularia vulgaris* et sur différentes plantes basses; mai.

globulariæ. — *Globularia vulgaris* et sur différentes plantes basses; mai.

statices. — *Rumex acetosa*, *Globularia vulgaris* et plusieurs plantes basses.

(*Var.*) *micans*. — BERCE en fait une espèce distincte. STAUDINGER la regarde comme une synonymie du *I. statices*. — La chenille du *I. micans* vit, selon E. MARTIN, sur le *Cistus salviæfolius*; en mars et avril.

Geryon. — *Helianthemum vulgare*; mai.

ZYGÆNA

- Erythrus.** — *Thymus serpyllum*. — *Eryngium campestre*; DONZEL. — A tout son développement fin mai ou les premiers jours de juin.
- pilosellæ.** — *Trifolium montanum*; *Hippocrepis comosa*, *Lotus corniculatus*. — *Eryngium campestre*; MILLIÈRE. — Mai et juin.
- (Var.) **nubigena.** — MERRIN ne mentionne que le *Thymus serpyllum*; Juillet; passe l'hiver, se chrysalide en mai.
- scabiosæ.** — Sur le *Trifolium* et plusieurs autres Légumineuses herbacées; en mai et juin.
- Sarpedon.** — *Eryngium campestre* et *E. maritimum*, *Dorycnium suffruticosum*; avril, mai et juin. — Mars et avril; RAMBUR.
- Contaminei.** — Sur les *Eryngium*.
- achillæ.** — *Lotus corniculatus*, *Trifolium*, *Hippocrepis*. — *Onobrychis sativa*, *Astragalus glycyphyllos*; DONZEL. — Mai et juin.
- exulans.** — Les *Lotus* et d'autres plantes basses.
- corsica.** — *Santolina incana*, Bruyères; au printemps; RAMBUR.
- melloti.** — *Lonicera*, *Lotus corniculatus*, plusieurs espèces de *Trifolium*, *Vicia*; juin; MERRIN.
- Charon.** — Chenilles sur les *Lotus*.
- trifolii.** — *Lotus corniculatus*, *Trifolium procumbens*, *Hippocrepis comosa*, etc.; mai.
- lonicerae.** — *Lotus corniculatus*, *Trifolium*, *Hippocrepis comosa*; prairies humides, allées ombragées; avril et mai.
- stæchadis.** — *Dorycnium suffruticosum*; ont tout leur développement à la mi-juin.
- filipendulæ.** — *Spiræa filipendula*, *Trifolium*, *Veronica*, *Hieracium pillosella*, *Taraxacum dens-leonis*, *Briza minor*; se métamorphose vers la mi-mai.
- angelicæ.** — *Trifolium montanum*; OCHSENHEIMER.
- transalpina.** — *Hippocrepis comosa*, *Astragalus glycyphyllos*, *Lotus corniculatus*; mai et juin; BOISDUVAL.
- epiathes.** — *Peucedanum officinale*, *Trifolium pratense*, *Hippocrepis comosa*, *Lotus corniculatus* et *L. siliquosus*, *Coronilla varia*, *Medicago falcata*; en mai. — Mai et juin; BOISDUVAL.
- lavandulæ.** — *Dorycnium suffruticosum*; éclôt en septembre, atteint toute sa grosseur mars ou avril.
- Rhadamanthus.** — *Dorycnium suffruticosum*; février.

- hilaris.** — Les *Ononis*; juin. — *O. natrix* et *O. arvensis* dans les Basses-Alpes; DONZEL.
- bætica.** — *Coronilla juncea*; avril et septembre; RAMBUR.
- fausta.** — *Ornithopus perpusillus*, *Coronilla minima*, *Hippocrepis comosa*, *Genista juncea*; juin.
- carniolica.** — *Hedysarum onobrychis*, *Astragalus glycyphyllos*, *Dorycnium suffruticosum*; mai. — *Lotus corniculatus*; BOISDUVAL.
- occitanica.** — *Dorycnium suffruticosum* (*D. monspeliense*); RAMBUR). juin et juillet. — En Espagne la transformation a lieu en mai; MARCORELL.

SYNTOMIS

- Phegea.** — *Rumex acetosa* et autres, *Plantago lanceolata*, *Scabiosa succisa*, *Taraxacum dens-leonis*; Mars et avril. — Selon OCHSENHEIMER on la nourrit en captivité avec le *Prunus padus*.

NAGLIA

- ancilla.** — Les Lichens tels que les *Parmelia parietina*, *caperata*, *olivacea* et sur la *Jungermannia complanata*; Alph. DUBOIS; mai et juin; se chrysalide dans un léger tissu.
- punctata.** — Les Lichens: *Lecanora* et le *Parmelia*; passe l'hiver, se chrysalide mai.

SARROTHRIPA

- undulana.** — *Salix caprea*; fin juin et juillet; vit sur le Chêne et les Saules; le Chêne donnerait le type. — La var. *degenerana*, semble provenir du *Salix caprea*; DE PEYERIMHOFF. — Se tient à l'extrémité des rameaux dans un paquet de feuilles fortement liées.

EARIAS

- chlorana.** — Différentes espèces de *Salix*; a toute sa taille fin juillet-commencement août. — Du 15 août jusqu'en octobre; DE PEYERIMHOFF.

HYLOPHILA

- prasinana.** — *Fagus sylvatica*, *Betula alba*, *Atrius glutinosa*, *Quercus robur*; a toute sa taille en août, septembre et octobre.
- bicolorana.** — Plusieurs espèces d'arbres, mais principalement le *Quercus robur*; passe l'hiver; a toute sa taille vers le milieu de mai.

NYCTEOLA

- togatulalis.** — Sur les Lichens des arbres et des rochers ; au printemps.
- cucullatella.** — *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*, *Sorbus aucuparia* ; mai.
- strigula.** — Se nourrit de préférence du Lichen des Chênes ; fin mai, commencement de juin.
- confusalis.** — *Quercus robur*, *Mentha aquatica* ; fin mai, commencement de juin.
- thymula.** — *Thymus vulgaris* ; P. MILLIÈRE ; a son entier développement vers la fin de mai.
- chlamydulalis.** — Fleurs et graines d'*Odontites lutea* et dans les fleurs des *Scabiosa* ; juin et juillet. — D'autres auteurs disent que la chenille éclôt courant septembre, et que quinze ou dix-sept jours lui suffisent pour acquérir son entier développement.
- albula.** — On présume *Mentha aquatica*. — *Rubus cæsius* ; BUCKLER.
- cristatula.** — Chen. sur le *Quercus robur* et la *Mentha aquatica*.

NUDARIA

- senex.** — Lichens des marais et fondrières ; mai et juin ; MERRIN.
- mundana.** — Sur les vieux murs en pierres sèches ; juin.
- murina.** — Lichens des pierres ; avril mai, juin et juillet.

CALLIGENIA

- miniata.** — Les Lichens des arbres ; se métamorphose courant mai.

SETINA

- irrorella.** — Lichens des arbres et des pierres : *Parmelia parietina*, *P. olivacea*, *Cetraria prunastri*, *Lotus corniculatus* avec lequel on l'éleve très bien en captivité et sur lequel elle vivrait selon BOISDUVAL ; mai.
- aurita.** — Elle ne paraît vivre que de divers Lichens qui croissent en abondance sur les rochers, on la nourrit avec la *Peltigera canina* ; se chrysalide en août.
- mesomella.** — Vit de Lichens, il faut la chercher pendant le jour au pied des *Quercus robur*, dans les feuilles sèches, endroits chauds, août à mai ; MERRIN.

LITHOSIA

- muscerda.** — Lichens des Frênes ; mai et juin. — Lichens des Saules dans les marais ; MERRIN.

- griseola.** — Lichens sur *Prunus spinosa*, *Quercus robur*, *Salix*, etc.; août et juin; MERRIN.
- deplana.** — Parait vivre sur les Lichens qui croissent sur les Pins et les Sapins. — Juin; MERRIN.
- lurideola.** — Après les pluies dans les bois sur les écorces des *Quercus robur*; avril, mai.
- complana.** — Lichens des *Quercus robur*, *Prunus spinosa*, *Berberis vulgaris*, *Spartium scoparium*; se métamorphose entre la mi-mai et le commencement de juin.
- sericea.** — Probablement sur les Lichens des Bruyères; juin.
- caniola.** — Lichens sur les tuiles des vieux toits; mars, avril et mai; fin juillet, commencement août sur les vieux murs. — Selon moi, elle aurait deux époques.
- unita.** — Sur les Lichens de différents arbres et des rochers en montagnes, *Genista purgans*; juin, juillet, août.
- lutarella.** — *Lichen fusco-ater*; DOUBLEDAY. — Avril à juin; MERRIN.
- sororcula.** — *Abies excelsa*, *Pinus sylvestris*; OCHSENHEIMER. — Lichens des arbres; BERCE. — Passe l'hiver, se chrysalide en mai. — Sur les Lichens du *Quercus robur*, *Larix europæa*; MERRIN.

GNOPHRIA

- quadra.** — *Betula alba*, *Castanea vulgaris*, *Quercus robur*, dont elle mange les lichens. — Ch. DUBOIS ajoute : *Fagus sylvatica*, *Quercus sessilifolia* et *Q. pedunculata*, *Tilia europæa* sauvage, *Pinus sylvestris*; mai ou juin. — *Carpinus betulus*, et quelquefois aussi sur les arbres fruitiers.
- rubricollis.** — *Lichen pulmonarius*, *L. olivaceus*, Lichens des murailles, *Jungermannia complanata*; à toute sa taille courant octobre. — Juin et juillet; DONZEL.

EMYDIA

- striata.** — *Artemisia vulgaris* et *A. campestris*, *Galium verum*, *Hieracium pilosella*, *Erica vulgaris*, *Festuca duriuscula*, *Lamium album*, *Prunus spinosa*, *Urtica*; particulièrement dans les clairières des bois. — La chenille se montre dès les premiers jours d'avril et a acquis toute sa taille fin mai à commencement de juin.
- bifasciata.** — Polyphage; aime surtout les Graminées, les Chicoracées; mai, juin, juillet et août.

cribrum. — *Artemisia vulgaris* et *A. campestris*, *Galium verum*, *Hieracium pilosella*, *Erica vulgaris*, *Festuca duriuscula*, *Lamium album*, *Prunus spinosa*, *Urtica*; à toute sa taille en mai et juin.

DEIOPEIA

pulchella. — *Heliotropium europæum*, *Myosotis arvensis*, *Solanum nigrum*. — J'ai trouvé la chenille commencement juin et commencement octobre.

EUCHELIA

jacobeæ. — *Senecio vulgaris*; depuis juillet jusq' en octobre.

NEMEOPHILA

russula. — *Scabiosa succisa*, *Taraxacum officinale*, *Plantago lanceolata*, *Cynoglossum officinale*, *Hieracium umbellatum* et *H. sylvaticum*, *Alsine media*, *Lactuca*; hiverne; à toute sa taille en mai.

plantaginis. — *Plantago lanceolata*, *Lychnis dioica*, *Silene noctiflora*; en captivité, *Lactuca sativa*; commencement mai et en août.

CALLIMORPHA

dominula. — Chenille sur un grand nombre de plantes basses et quelquefois sur les jeunes arbustes; on l'élève très bien avec des Borraginées et même avec de la Laitue; passe l'hiver et à toute sa taille en mai.

hera. — *Cynoglossum officinale*, *Quercus robur*, *Fagus sylvatica*, *Salix alba*, *Pyrus malus*, *Ribes uva crispa*, *Rubus idæus*, *Spartium scoparium*, *Sisymbrium officinale*, *Trifolium*, *Plantago*, *Urtica*, *Epilobium*, *Lactuca*; à toute sa taille fin mai, juin.

PLERETES

matronula. — *Corylus avellana*, *Tilia europæa*, *Rhamnus cathartica* et *R. frangula*, *Cerasus padus*, *Plantago major*, *Artemisia vulgaris*, *Hieracium umbellatum*, *Viola tricolor*, *Lactuca*. — *Cynoglossum officinale*; BRUAND. — Passe deux fois l'hiver.

ARCTIA

Caja. — Polyphage: *Urtica*, *Lamium*, *Euphorbia*, les *Chicoracées*, etc.

- Se chrysalide en mai, après avoir passé l'hiver ; seconde génération en juillet, août.
- Flavia.** — Le papillon n'éclôt que la troisième année ; les chenilles de la seconde année périssent en captivité après avoir passé l'hiver ; mais en les élevant *ab ovo*, on réussit très bien ; en captivité, elles refusent toute nourriture, excepté le *Taraxacum officinale*. À l'état libre, elles s'accrochent d'un grand nombre d'autres plantes, notamment l'*Aconitum napellus* ; il ne faut jamais leur présenter des feuilles fraîches, ce qui les ferait mourir en peu de temps, mais des feuilles que l'on a laissé faner douze à vingt-quatre heures ; le soleil et la pluie ne doivent pas leur être favorables, car elles sont toujours à l'abri dans la nature. On trouve en même temps, tout le mois de juillet et le mois d'août, le papillon, la chrysalide et la chenille, à 1.800 jusqu'à 2.000 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est à M. Rodolphe ZELLER-DOLDER, entomologiste savant et zélé, que je dois ces précieux renseignements.
- Villica.** — *Ulmus campestris*, *Alsine media*, *Achillea millefolium*, *Spinacia oleracea*, *Urtica*, *Genista* ; passe l'hiver ; a toute sa taille fin avril, mai.
- pupurata.** — *Spartium scoparium*, *Ulmus campestris*, *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, *Pyrus malus*, *Prunus cerasus*, *P. domestica*, *Vitis vinifera*, *Ribes uva crista*, *Lamium album*, *Galium verum* et *G. mollugo*, *Anchusa officinalis*, *Cynoglossum officinale*, *Plantago major*, *Alsine media* ; avril et juin.
- fasciata.** — Polyphage : *Syringa vulgaris*, *Euphorbia oleæfolia* ; mai et juin. — En avril, atteint toute sa grosseur ; DONZEL.
- Hebe.** — *Achillea millefolium*, *Artemisia*, *Medicago*, *Cynoglossum officinale*, *Euphorbia cyparissias*, *Lactuca*, *Senecio vulgaris*, *Taraxacum dens-leonis*, *Alsine media*, *Onopordon acanthium*, les *Pisum* ; passe l'hiver et se métamorphose, avril et mai.
- aulica.** — *Achillea millefolium*, *Cynoglossum officinale*, *Galium aparine*, *Alsine media*, *Lamium album*, *Urtica urens*. — Je pense qu'il faut la rechercher en avril et mai comme la *Civica* (*Maculania*).
- maculania.** — *Achillea millefolium*, *Plantago major*, *Lamium album*, *Alsine media*, *Lysimachia vulgaris* ; est polyphage, mais elle

préfère les *Luzula*, *Rumex acetosella* ; en captivité *Cichorium intybus* ; à toute sa taille fin avril, commencement de mai.

maculosa. — *Galium aparine*.

casta. — *Asperula cynanchica*, *Galium mollugo* ; juin et juillet. — *H. pilosella* ; BRUAND.

Latreillei. — *Plantago lanceolata* ; est polyphage : *Genista hispanica*, les Chicoracées, les *Picris stricta* et *P. hieracioides* ; juin, juillet et août. — *Plantago psyllium* ; MARTORELL.

Cervini. — *Geum montanum* ; en captivité : *Rumex*, *Alsine*, *Plantago*, etc. ; se rencontre toute la belle saison.

spectabilis. — Doit être polyphage ; elle semble préférer les *Artemisia*. — Cette espèce est figurée à l'état de larve dans MENETRIES.

EUPREPIA

pubica. — *Briza media* et *B. minor* ; on la nourrit très bien avec le *Poa annua* ; parvient à toute sa taille fin avril. Il faut bien se garder de déranger les chenilles, sous peine de ne pas obtenir l'insecte parfait.

rivularis. — Vit uniquement de Graminées ; RAMBUR. — Selon LEDERER, elle vivrait en été de Graminées desséchées.

OCNOGYNA

corsica. — Est polyphage ; à toute sa croissance à la fin de l'hiver ; se récolte en mai.

bætica. — Plantes herbacées ; a pris tout son accroissement vers la fin de l'hiver. — En captivité : *Plantago* et *Taraxacum*. — Reste souvent deux ans en chrysalide ; OBERTHUR.

parasita. — Plusieurs Graminées, *Gentiana lutea* ; MILLIÈRE ; fin juillet. — Mange les feuilles, atteint en peu de jours son entier développement ; se transforme commencement août dans la mousse.

hemigena. — Plantes herbacées ; est polyphage ; en captivité s'accommode très bien de *Plantago lanceolata* ; parvient à toute sa grosseur au mois d'août.

zoraida. — Polyphage ; l'insecte parfait paraît en mai !

Lœvil. — Dans les dunes des bords de la mer, réunies en société ; LEDERER.

SPILOSOMA

fuliginosa. — *Rumex acetosa* et *R. patientia*, *Geum urbanum*, *Brassica*

- rapa* et *B. napus*, *Plantago major*, *Epilobium*, *Urtica urens*, *Evonymus europæus*, *Rubus fruticosus*, *R. idæus*, *Ribes uva-crispa*, *Lamium album*; en été et à la fin de l'automne, et souvent même pendant l'hiver.
- luctifera.** — *Plantago lanceolata*, *Scabiosa columbaria*, *Hieracium pilosella*, *Cynoglossum officinale*, *Veronica*, *Taraxacum officinale*, *Alsine media*, *Gnaphalium arenarium*, *Delphinium Ajacis*; mai et septembre. — Je l'ai toujours trouvée en juillet et août, puis octobre et novembre.
- sordida.** — Sur les plantes basses, principalement les *Plantago*, *Rumex*, *Scabiosa*, sous les herbes et les pierres pendant le jour; juin, juillet.
- mendica.** — *Plantago lanceolata*, *Taraxacum officinale*, *Rumex acetosa*, *Urtica*, *Lamium album*, *Balsamita major*; se métamorphose en juillet et août.
- lubricipeda.** — *Sambucus nigra*, *Rubus idæus*, *Hieracium pilosella*, *Epilobium*, *Urtica*; depuis juillet jusqu'en octobre.
- menthastri.** — *Mentha sylvestris*, *Polygonum persicaria* et *P. hydro piper*, *Nepeta cataria*, *Balsamita major*, *Lamium album*, *Urtica*; depuis la fin de juillet jusqu'en octobre.
- urtica.** — Plusieurs plantes aquatiques: MARSHAM. — Plantes basses; est polyphage; août et septembre. — *Mentha sylvestris*, *Ményanthes trifoliata*, *Nepeta cataria*, *Polygonum persicaria*, les *Plantago*, *Rumex aquatica*, *Carex*, etc.; Ch. DUBOIS.

HEPIALUS

- humuli.** — Racines de *Humulus lupulus*, peut être *Bryonia dioica*; se chrysalide fin avril. — *Arctium lappa*; BARDANE. — *Urtica*; MERRIN.
- sylvinus.** — Racine de *Rumex*; vit deux ans; juillet; MERRIN.
- velleda.** — Racines de *Pteris aquilina*; depuis août à avril; MERRIN.
- lupulinus.** — Les *Daucus*, les *Bryonia*, les *Valeriana* (*Plantago major*, *lanceolata*, *Triticum vulgare* et *repens*, *Humulus lupulus*; Ch. DUBOIS); Racines des Orties languissantes; MERRIN. — Éclôt à la fin de l'été, passe l'hiver et est parvenue à toute sa taille fin mars-commencement avril. — Selon RASPAIL, racines de différentes plantes basses à une profondeur de 6 à 8 centimètres.
- hecta.** — *Erica vulgaris*. — Racines de *Pteris aquilina*; vit deux ans,

se chrysalide en mai et juin ; MERRIN. — Racines de *Primula*, *Rumex*, Bruyères et froment ; FREY.

COSSUS

cossus. — *Quercus robur*, *Betula alba*, *Ulmus campestris*, *Populus*, *Salix* ; j'en ai trouvé beaucoup dans les Cognassiers ; en captivité on les élève très bien avec des pommes pourries ; juin et juillet.

Terebra. — *Populus nigra* et *P. tremula* ; OCHSENHEIMER.

ZEUZERA

pyrina. — *Æsculus hippocastanum*, *Ulmus campestris*, *Tilia europæa*, *Pyrus malus*, *Sorbus aucuparia*, *Corylus avellana*, *Ilex aquifolium*. — D'après LE ROI, la chenille ne vivrait dans le Nord que dans le tronc du *Fraxinus excelsior*. — En septembre ; se chrysalide l'été de l'année suivante.

PHRAGMATÆCIA

castaneæ. — Vit dans les tiges d'*Arundo phragmites*.

HYPOPTA

thrips. — Les racines de diverses plantes basses ; EVERSMAAN.

cœstrum. — *Celtis australis* ; DAUBE.

STYGIA

australis. — Tiges et racines des *Echium italicum*, *violaceum* et *vulgare*. — Adrien de VILLIERS prétendait que la chenille vivait dans les tiges du *Morus alba*. — Mai.

HETEROGENEA

limacodes. — *Quercus robur*, *Fagus sylvatica*, *Castanea vulgaris* ; fin de l'été ; se chrysalide avant l'hiver. — *Arbutus unedo* ; septembre à mai ; MARTORELL.

asella. — *Prunus spinosa* et *Populus*, selon GODART. — Probablement aussi sur le *Quercus robur* ; BERCE. — Août et septembre ; MERRIN.

PSÏCHE

unicolor. — Se nourrit de diverses Graminées, principalement *Poa annua* et *P. trivialis* ; contre les arbres, les murs, les barrières, les rochers ; avril et mai.

- villosella.** — Ordinairement sur la Bruyère, le Prunellier et, dit DOUBLEDAY, sur le Saule; à toute sa taille en novembre, passe l'hiver et ne se transforme qu'en avril.
- febretta.** — Les *Scorzonera*, dès les premiers jours du printemps; BRUAND; éclôt en août le matin entre sept et huit heures, sur les tiges fraîches du blé; à toute sa taille commencement juillet.
- viciella.** — Fourreau composé de pailles courtes placées transversalement, et entrelacées avec régularité.
- Constancella.** — *Vicia sepium*; je l'ai toujours élevée avec la *Poa annua*; se chrysalide du quinze au trente mars.
- apiformis.** — *Rubus fruticosus*; OCHSENHEIMER. — *Vicia*; BRUAND. *Berberis vulgaris*; LEDERER. — Je l'ai nourri avec la *Vicia sepium*. — Commencement de mars, avril. — Semble ne vivre que de graminées; RAMBUR.
- præcellens.** — *Erica arborea*; mai; STAUDINGER.
- Graslinella.** — Est polyphage et vit sur diverses plantes basse; à toute sa taille en mars ou en avril. — Vit deux ans, d'après HEYLAERTS DE BRÉDA, sur les *Salix alba*, *caprea*, etc., *Calluna vulgaris* et diverses Graminées.
- Opacella.** — Trouvée dans un bois de Sapins, la chenille se nourrit-elle de cette essence? au printemps. — Sur les troncs de Sapins tombés; MERRIN. — Pour moi, je crois cette espèce polyphage; se prend contre le tronc des arbres. — Se fixe, en avril contre, les Chênes et autres arbres près du sol, doit vivre de Graminées; HOFMANN.
- Zelleri.** — Fourreaux trouvés sur des buissons qui rampent et qui végètent sur une pelouse sèche, près d'une montagne.
- Pyrenella.** — Fourreau ressemblant un peu à celui du *P. plumosella*; comme lui, forme presque globuleuse, mais pailles très grêles, implantées plus à angle droit, leur base est garnie de soie, il forme davantage la pelotte.
- albida.** — *Poa trivialis* dans les localités montagneuses. Je l'ai trouvée dans des localités arides, même en plaine et sur diverses Graminées; mars, avril, mai et juin.
- Millierella.** — Je ne l'ai jamais trouvée avec le type; vit aussi de Graminées.
- Lorquinella.** — Lieux incultes; le fourreau est composé de brins d'herbe et de mousse; la chenille vit sur les Graminées; MILLIÈRE.

- Leschenaulti.** — Ne se nourrit que de Graminées ; passe l'hiver en mars et avril, se fixe pour se chrysalider.
- malvinella.** — Se nourrit de plantes basses principalement d'un *Erodium* ; fin janvier commencement avril.
- quadrangularis.** — *Alhagi persarum*, *A. camelorum*, *Peganum harmala* et une *Artemisia* ; se sont fixées commencement juillet.
- atra.** — *Festuca ovina* et *F. elatior*, *Tussilago alpina* ; OCHSENHEIMER. — Je l'élève facilement avec les *Poa annua* et *P. trivialis* ; fin mai commencement juin.
- vesubiella.** — Vit de Graminées se fixe du quinze au vingt-cinq juillet ; MILLIÈRE.
- Schiffermuelleri.** — Graminées. — Suivant quelques auteurs sur le *Tussilago alpina* ; avril et mai. — Vit deux ans, selon BRUAND.
- Muscella.** — Se nourrit de Graminées : *Festuca ovina*, *Brachypodium pinnatum*, etc. ; mars et avril ; se fixe près du sol la tête en bas et cachée dans les herbes ; HOFMANN.
- fulminella.** — Fourreau, forme de petites feuilles sèche de *Buxus* et de *Quercus coccifera* ; doit vivre de Graminées ; MILLIÈRE.
- Silphella.** — A toute sa taille à la fin de mars ; se nourrit de *Plantago. Rumex*, *Dorycnium* ; MILLIÈRE.
- mediterranea.** — *Thymus Serpyllum*, endroits pierreux et rocailleux, au pied de la plante près de la racine.
- Gondebautella.** — Vit de Graminées ; en captivité, je l'élève facilement avec les *Poa annua* et *trivialis* ; passe l'hiver ; on la prend en février et se chrysalide commencement de mars.
- plumifera.** — Fourreau médiocrement allongé, brun, formé d'esquilles et de parcelles de mousse, sur les collines sèches et arides ; février et mars.
- plumistrella.** — Fourreau revêtu de pailles courtes et ne se prolongeant qu'au tiers de sa longueur, les deux autres tiers sont recouverts de grains de sable fin, serré et brun.
- tenella.** — D'après la conformation du fourreau, doit vivre de Graminées ; fourreau formé de parcelles de micasciste et de quartz.
- hirsutella.** — Sur les arbres forestiers, dans les bois ; très abondant en automne, l'est beaucoup moins après l'hiver ; préfère le Chêne et le Noisetier ; se récolte en avril et mai, éclot en juin.
- Standfusii.** — Fourreau fait de pailles courtes disposées transversalement,

EPICHOPTERYX

- bombycella.** — Se tient tout près du sol, dans les prés humides, sur la mousse, dans les localités exposées du nord au couchant ; mars et avril. L'éclosion se fait en mai, le soir avant la tombée de la nuit, du moins c'est ce qui a lieu en captivité.
- pulla.** — Vit de Graminées ; pas rare dans les prairies surtout en montagnes ; avant l'époque de la chrysalidation, se tient dans l'herbe à 5 ou 6 centimètres du sol ; a toute sa grosseur fin avril.
- Tarnierella.** — Sur les Peupliers moussus et chargés de Lichens. — La chenille, m'écrit M. HEYLAERTS DE BRÉDA, vit comme le *Pulla* parmi et sur les Graminées, sur les pentes du côté du midi, de dix heures à quatre heures et jamais sur le tronc des arbres.
- Sieboldii.** — La chenille doit se nourrir de Graminées ; le fourreau ressemble à celui des *Pulla*, formé de tiges d'herbes sèches appliquées les unes contre les autres.
- helix.** — Il faut récolter les fourreaux contre les rochers ; mai.
- helicinella.** — Semble polyphage ; vit surtout de *Lavandula*, *Thymus*, *Teucrium* et *Cistus* ; mai, juin, commencement juillet. — Le fourreau a la forme d'une petite hélice subconique présentant à peu près trois tours de spire ; il est composé de grains de sable et de terre.

FUMEA

- pectinella.** — Graminées basses ; avril.
- nudella.** — Fourreau conique d'une teinte un peu sombre ; la chenille habite les côtes rocailleuses et montagneuses ; vit de Graminées tendres, se tient sur la mousse toujours près du sol ; avril, mai, juin.
- intermediella.** — Se trouve contre les arbres, les barrières, sur les buissons, etc. ; avril et mai.
- affinis.** — La chenille est à toute sa taille à la fin de mai ; le genre de vie est le même que celui de l'*Intermediella* ; HOFMANN.
- crassiorella.** — Mange les Plantains en mars ; MARTORELL. — La chenille, après avoir hiverné, paraît dès les premiers beaux jours du printemps, au pied des rochers tournés au levant ou au midi et contre les vieux murs couverts d'herbes et de ronces ; se chrysalide en mai.

- betulina.** — Chenille sur les vieilles barrières en chêne et contre les troncs de Peuplier ; fourreau recouvert de débris ligneux et de petites parcelles d'écorce. — Se rencontre aussi, dit HEYLAERTS, sur les Frênes, les Chênes, etc. — D'éducation difficile ; fin mai, on trouve les fourreaux chrysalidés ; les chenilles se nourrissent de Lichens. — Je l'ai toujours trouvée sur le tronc des *Ulmus campestris*. — Vit aussi, ajoute HEYLAERTS, d'insectes morts.
- sepium.** — Lichens de différentes espèces qui croissent sur l'écorce des arbres ; vit au delà d'une année ; se chrysalide fin juin ; le papillon éclôt quinze jours à trois semaines après.
- salicicolella.** — Chenille sur le Saule à lier, coteaux en vignobles ; BRUAND. — En captivité, m'écrit M. FOUCARD, ne s'élève qu'avec la *Stellaria holostea* ; en mai.
- roboricolella.** — Chenille sur Chêne, quelquefois sur les vieilles barrières ; en mai et commencement juin ; BRUAND.
- comitella.** — Sur les Salix ; a toute sa taille fin avril, commencement mai, après avoir hiverné.
- subflavella.** — Le fourreau a la forme de ceux des *Roboricolella* et *Comitella* ; les pailles sont plus nombreuses et moins agglomérées ; fin avril ; contre les vieilles murailles ; MILLIÈRE.

ORGYA

- aurolimbata.** — Différentes espèces de *Genista*, principalement le *purgans* ; se trouve aussi sur le *Salix caprea* ; fin avril, mai ; se chrysalide commencement de juin.
- gonostigma.** — *Quercus robur*, *Prunus domestica* et *P. spinosa*, *Alnus*, *Rubus idæus*, *Vaccinium myrtillus*, *Rosa canina*, *Cratægus oxyacantha* ; mai, juillet, août, septembre et octobre.
- antiqua.** — *Quercus robur*, *Pyrus malus*, *Prunus domestica*, *Armeniaca vulgaris*, *Corylus avellana* ; mai, juillet, août, septembre et octobre.
- rupestris.** — *Statice articulata*, *Lotus creticus* et les *Genista* ; tout le mois de mai ; RAMBUR.
- trigotephras.** — *Quercus coccifera*, *ilex*, *suber*, les *Genista* (*Coriaria myrtifolia* et le Chêne, MARTORELL) ; mai et juin.
- Ramburi.** — *Genista Lobelii* ; a atteint toute sa grosseur vers les premiers jours de juillet.
- erica.** — *Erica tetralix*, *Calluna*, Saule argenté ; juillet.

dubia. — Polyphage, préfère cependant les *Genista* épineux ; a toute sa taille fin mai commencement de juin.

DASYCHIRA

fascelina. — *Prunus domestica*, *Rubus fruticosus*, principalement les *Genista*, *Trifolium*, *Ribes*, *Plantago*, *Fragaria vesca*, *Taraxacum dens-leonis*, *Erica vulgaris*, *Hippophae rhamnoides* ; se métamorphose fin mai, première quinzaine de juin.

Abietis. — *Pinus picea*.

pudivunda. — *Quercus robur*, *Fagus sylvatica*, *Populus alba*, *Ulmus campestris*, *Corylus avellana*, *Juglans regia*, *Salix viminalis*, *Salix alba* ; juillet à mi-octobre. — Fin juin ; GUÉNÉE.

LÆLIA

cœnosa. — *Phragmites* et *Carex* ; août ; MERRIN.

LARIA

L. nigrum. — *Tilia europæa*, *Betula alba*, *Quercus robur*, *Fagus sylvatica* ; se métamorphose en juin. — DUBOIS prétend que courant avril la chenille a atteint toute sa croissance.

LEUCOMA

salicis. — *Salix* et *Populus* ; juin.

PORTHESIA

chrysorrhæa. — Arbres fruitiers et forestiers ; éclôt fin août, passe l'hiver et se chrysalide fin juin, commencement juillet.

similis. — *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, *Ulmus campestris*, *Betula alba*, *Salix alba*, *Populus*, *Cratægus oxyacantha*, *Prunus spinosa* ; passe l'hiver en chrysalide et subit sa métamorphose fin juin.

PSILURA

monacha. — *Pinus sylvestris* principalement, puis *Quercus robur*, *Betula alba*, *Pyrus communis*, *Fagus sylvatica* ; fin juin, commencement juillet.

OCNERIA

dispar. — Toute espèce d'arbres fruitiers et forestiers ; se métamorphose en juillet.

Atlantica. — La chenille, dit OBERTHUR, a été élevée sur plantes basses. **detrita.** — *Quercus robur* et *Q. ilex*.

rubra. — *Quercus robur*, les *Rubus*, *Arbutus unedo*, *Pistacia lentiscus*, divers *Cistus*, même les *Erica*. — BERCE ne mentionne que les *Quercus robur* et *ilex*. — Éclôt en novembre ou en décembre ; a toute sa grosseur fin mai, juin.

BOMBYX

ilicis. — *Quercus ilex* et *Q. coccifera*, dont elle semble ne manger que les parties desséchées ; RAMBUR. — Selon MILLIÈRE, elle vivrait exclusivement de *Quercus ilex*. — Mai et juin (avril et mai ; MARTORELL.)

cratægi. — *Cratægus oxyacantha*, *Prunus spinosa*, *Pyrus malus*, *Prunus cerasus*, *Betula alba*, *Salix alba* (*Ulmus campestris*, *Salix caprea*, *Populus tremula*, *Quercus robur* ; Alp. DUBOIS) ; se métamorphose fin mai ou au commencement de juin.

populi. — *Betula alba*, *Populus tremula* et *P. nigra*, *Tilia europæa*, *Castanea vulgaris*, *Quercus robur*, *Berberis vulgaris*, *Fagus sylvatica*, *Acer platanoides*, *Quercus ilex* ; se métamorphose en mai, juin et juillet.

franconica. — *Statice limonium*, *Dorycnium suffruticosum*, les *Plantago*, les *Euphorbia* ; éclôt en février, arrive à toute sa taille les derniers jours de mai.

alpicola. — *Rosa pimpinellifolia*, diverses *Euphorbia*, *Dorycnium decumbens* et *D. suffruticosum* ; a son entier développement à la fin de juin.

castrensis. — *Helianthemum vulgare* et *H. guttatum*, *Euphorbia cyparissias* et *E. sylvatica*, *Centaurea jacea*, *Geranium dissectum*, *Erodium cicutarium*, *Hieracium pilosella*, *Quercus robur*, *Berberis vulgaris*, *Betula alba* ; on l'éleve très bien avec l'*Euphorbia cyparissias*. — DONZEL prétend non seulement qu'on l'éleve avec le *cyparissias*, mais qu'on l'y trouve principalement. — Sa métamorphose a lieu commencement juillet.

neustria. — Arbres fruitiers et forestiers ; a toute sa croissance en juin.

loti. — *Cistus salviæfolius* ; de mai à septembre ; MARTORELL. — Fin février et août ; RAMBUR.

Vandalicia. — Plantes basses ; très peu connue.

lanestris. — *Berberis vulgaris*, les *Prunus spinosa*, et *domestica*.

- et *cerasus*, *Betula alba*, *Salix alba*; se chrysalide fin mai, commencement juin.
- catax.** — *Berberis vulgaris*, *Prunus spinosa*, *Pyrus communis*, *Betula alba*; fin mai, commencement juin.
- rimicola.** — *Quercus robur*; en mai et juin.
- Eversmanni.** — Les *Scabiosa*, suivant FREYER. — Sur un *Acacia* et sur le *Caragana frutescens*, suivant HERRICH SCHÖFFER. — Juin.
- trifolii.** — *Trifolium medicago*, *Genista* et autres Légumineuses; passe l'hiver et subit sa métamorphose courant juin.
- (Var.) **Cocles.** — Les *Trifolium*, *Lotus*, *Vicia*, *Genista*; mars à fin juin; TREITSCHKE.
- quercus.** — *Salix alba* et *S. vitellina*, *Populus*, *Syringa vulgaris*, *Prunus domestica*, *Berberis vulgaris*, *Quercus robur*, *Ulmus campestris*, *Spartium scoparium*, *Rubus fruticosus*, *Ribes rubrum*, *Prunus spinosa*; passe l'hiver et se transforme en juin.
- (Var.) **Spartii.** — *Rhamnus alaternus*; fait son cocon vers la fin de juin.
- rubi.** — *Rubus fruticosus*, *Trifolium repens*, *Potentilla reptans*; passe l'hiver, se métamorphose fin mars et avril.

CRATERONYX

- taraxaci.** — *Taraxacum dens-leonis*, *Lactuca sativa*; éclôt au printemps et subit sa métamorphose fin juillet.
- Baleanica.** — Dans les régions alpestres, près des neiges, dit HABERHAUER (LEDERER).
- dumi.** — Plusieurs *Hieracium*, particulièrement l'*Hieracium pilosella* et *H. murorum*, *Taraxacum dens-leonis*, *Hippochæris radicata*.

LASIOCAMPA

- potatoria.** — *Bromus sterilis*, *Alopecurus agrestis*, *Phragmites communis*, et autres Graminées; lieux humides; se transforme en mai, juin, commencement juillet. — Il faut la chercher en juillet; DONZEL.
- (**rui.**) — *Prunus domestica*, *P. spinosa*, *Pyrus communis*, *P. malus*, *Ulmus campestris*, *Betula alba*, *Quercus robur*, *Populus* (*Tilia europæa*; Alph. DUBOIS). — C'est sur l'Orme, dit LE ROI, qu'il faut principalement la chercher. — Sa métamorphose a lieu fin mai, courant juin.

- quercifolia.** — *Pyrus malus* et *P. communis*, *Persica vulgaris*, *Amygdalus communis*, *Prunus domestica*, *P. cerasus*, *Berberis vulgaris*, *Rhamnus alaternus*, les *Salix alba*, *caprea* et *vitellina*, *Quercus robur*; se métamorphose en juin, commencement juillet.
- populifolia.** — Les *Populus*, principalement le *fastigiata*, *Salix alba*, *Fraxinus excelsior*; passe l'hiver et se métamorphose fin mai à commencement juin.
- tremulifolia.** — *Betula alba*, *Fraxinus excelsior*, *Salix alba*, *Populus nigra*, *Quercus robur*, *Sorbus aucuparia*; juillet, août et septembre.
- ilicifolia.** — *Salix alba*, *S. vitellina*, *Vaccinium myrtillus*; se chrysalide en juin, commencement juillet.
- suberifolia.** — Les *Quercus suber*, *robur*, *pubescens*, *Auzendi*; à fin juin, elle a acquis toute sa taille. — *Quercus ilex*; mai; RAMBUR.
- lunigera.** — *Pinus sylvestris* et *P. picea*.
- pini.** — Les *Pinus sylvestris*, *maritima* et *picea*; passe l'hiver, se transforme, mai à commencement juin.
- lineosa.** — *Cupressus fastigiata*. — DONZEL l'a trouvée sur le *Juniperus oxycedrus*; se transforme en mai. — Sort de l'œuf en juillet et parvient à toute sa taille vers la fin d'avril.

MEGASOMA

- repanda.** — *Genista juncea*, *Spartium virens*, *S. monospermum*. — A Alger, selon DONZEL, elle vit essentiellement sur le *Pistacia lentiscus*; elle se trouve, selon ce lépidoptériste, toute l'année, même en hiver. — *Spartium sphærocarpum* et aussi *monospermum* de janvier à fin mai, RAMBUR. — Sur le *Tamarix*, dit OBERTHUR, d'après M. ALLARD. — Le colonel LEVAILLANT prétend qu'elle est polyphage.

ENDROMIS

- versicolor.** — *Betula alba*, *Salix caprea*, *Atnus glutinosa*, *Carpinus betulus*, *Corylus avellana*; elle atteint toute sa croissance fin de juillet; file en terre une légère coque de soie.

SATURNIA

- pyri.** — *Pyrus communis*, *P. malus*, *Ulmus campestris*, *Fraxinus excelsior*, *Prunus domestica*, *Amygdalus communis*, *Alnus glutinosa*; se chrysalide commencement août.
- spini.** — *Prunus spinosa* et aussi, selon DONZEL, Pommier sauvage; se transforme fin juillet, commencement août.
- pavonia.** — *Rubus fruticosus* et *R. cæsius*, *Berberis vulgaris*, *Prunus spinosa*, *Quercus robur*, *Ulmus campestris*, *Fagus sylvatica*, *Carpinus betulus*, *Fraxinus excelsior*, *Betula alba*, *Salix alba* et *S. vitellina*, quelquefois *Genista*; depuis mai, jusqu'à fin juillet.
- cœcigena.** — *Quercus apennina*; en juin; TREITSCHKE.
- Isabellæ.** — *Pinus maritima*; se transforme fin juin.

AGLIA

- Tau.** — *Fagus sylvatica*, *Carpinus betulus*, *Betula alba*, *Tilia europæa*, *Salix caprea*, *Corylus avellana*, *Quercus robur*, *Pyrus malus* et *P. communis*; en Allemagne et dans le nord de la France, habite les bois de plaine; à partir de Lyon, bois de montagne d'une certaine élévation.

DREPANA

- falcataria.** — *Betula alba*, *Alnus glutinosa*, *Populus tremula*, *Salix alba*, *Quercus robur*; mai et septembre.
- curvatula.** — *Alnus viscosa*, *Betula alba*, *Quercus robur*; mai et septembre.
- harpagula.** — *Quercus robur*, *Betula alba*, *Tilia europæa*; mai; juin.
- lacertinaria.** — *Betula alba*; en juin et en septembre.
- binaria.** — *Quercus* et *Betula*, *Quercus ilex*; se nourrit de feuilles anciennes; juin septembre et octobre; MILLIÈRE. — Sur tous les Chênes y compris *Pilex* et le *suber*; DONZEL.
- cultraria.** — *Quercus robur*, *Fagus sylvatica* principalement, *Prunus spinosa*; juin, septembre et octobre.

CILIX

- glaucata.** — *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*; mai, juin, juillet, août et septembre.

HARPYIA

- verbasci.** — Les *Salix helix*, *monandra* et *hippophaeoides*; du 15 juin au 15 juillet et du 15 août à la mi-septembre.
- bicuspis.** — *Fagus sylvatica*; en juin, puis en août et septembre.
- furcula.** — Les *Populus* et *Salix*; en juin, puis en août jusqu'en novembre.
- bifida.** — *Populus tremula* et *P. fastigiata*, *Salix*, etc.; juin et août jusqu'en octobre.
- erminea.** — *Betula alba*, *Populus tremula*, *P. fastigiata*, et arbres des bois; depuis la mi-avril, jusqu'en juillet. — Juin et septembre; DONZEL.
- vinula.** — Différentes espèces de *Populus* et de *Salix*; depuis le mois de juin, jusqu'au commencement de septembre.

STAUROPUS

- fagi.** — *Fagus sylvatica*, *Quercus robur*, *Alnus glutinosa*, *Betula alba*, *Corylus avellana*, *Prunus domestica*, peut être *Ulmus campestris*. — *Arbutus unedo*; juin et juillet; MARTORELL. — *Carpinus betulus*; juillet août et septembre; Alph. DUBOIS.

UROPUS

- ulmi.** — *Ulmus campestris*; à toute sa croissance en juillet.

HYBOGAMPA

- Milhauseri.** — *Quercus robur*, *Betula alba*. — L'Orme et le Peuplier; Alph. DUBOIS. — Se transforme au mois d'août et en septembre.

NOTODONTA

- tremula.** — *Populus tremula* et divers *Populus*, des *Salix vitellina*, *alba*, *caprea*, *Betula alba*; en juin et à la fin de septembre.
- dictæoides.** — *Betula alba*, *Populus tremula*, *Alnus glutinosa*, *Salix alba*, *Populus*; en juin, septembre et octobre.
- ziczac.** — Les *Salix vitellina*, *caprea*, *alba*, *Populus fastigiata*, *Betula alba*. — Les *Salix bicolor*, *babylonica*, *cinerea*, *purpurea*, *pentandra*, *viminalis*, *incana*, *Populus tremula*; Ch. DUBOIS. — En juin, septembre et octobre.
- tritophus.** — *Populus tremula*, divers *Populus*, *Betula alba*, *Salix*; en juillet et en septembre.

- trepida.** — *Quercus robur* (et le *Quercus ilex*; MARTORELL). — Se métamorphose fin juillet, août. — Juin et juillet; DONZEL.
- torva.** — *Betula alba*, *Populus tremula* et divers *Populus*; en juillet et en septembre. — Juin et septembre, DONZEL.
- dromedarius.** — *Betula alba*, *Alnus glutinosa*, *Corylus avellana*, *Quercus robur*; en juin et commencement septembre, octobre.
- chaonia.** — *Quercus robur* et *Q. pedunculata*; mai, juin et fin septembre. DONZEL n'indique que mai et juin.
- querna.** — *Quercus robur*; s'enterre pour se transformer; août et septembre.
- trimacula.** — *Quercus robur*, et, ajoute DUBOIS, *Betula alba*; se transforme en terre; juillet, août et septembre.
- bicoloria.** — *Betula alba*; août et septembre.
- argentina.** — *Quercus robur*; se transforme en juillet ou en août.

LOPHOPTERIX

- carmelita.** — *Ulmus campestris*; BERCE. — *Betula alba*; du 20 au 30 juin a toute sa taille.
- Sieversi.** — Il est probable que la chenille vit sur *Betula alba*; MENESTRIES.
- camelina.** — *Quercus robur*, *Ulmus campestris*, *Carpinus betulus*, *Betula alba*, *Tilia europæa*, *Populus tremula*, *Alnus glutinosa*; depuis juillet à fin octobre.
- eculina.** — *Cratægus terminalis*, *Acer campestre*, *Ulmus campestris*; août et septembre.

PTEROSTOMA

- palpina.** — *Salix alba*, *Populus fastigiata*, *Tilia europæa*; juin, août septembre et octobre.

DRYNOBIA

- velitaris.** — *Quercus robur*, et, ajoute DUBOIS, *Fagus sylvatica*, *Populus*; de préférence sur les jeunes pousses, au pied des arbres; le même auteur ne mentionne qu'une génération; juillet et août. — De juillet à octobre, d'après d'autres auteurs.
- melagona.** — *Quercus robur*, *Fagus sylvatica*; en juillet et septembre.

GLUPHISIA

- crenata.** — *Populus nigra* et autres; en septembre et octobre. — En août sur les *Populus* et les *Salix*; DONZEL.

PTILOPHORA

plumigera. — *Acer campestre*, *Salix caprea*, *Betula alba*; s'enterre à la fin de mai.

GNETHOCAMPA

processionea. — *Quercus robur*; mai, commencement juin.

pityocampa. — *Pinus sylvestris*; se chrysalide au milieu de mars, quelquefois avril et même en mai.

Herculeana. — Géraniacées; commencement janvier; RAMBUR.

PHALERA

Bucephala. — *Quercus robur*, *Betula alba*, *Ulmus campestris*, *Fagus sylvatica*, *Tilia europæa*; depuis le mois de juillet, jusqu'au mois d'octobre.

Bucephaloides. — *Quercus robur*, *Q. ilex*; depuis le mois de juillet jusqu'à fin octobre.

PYGÆRA

Timon. — Depuis fin août jusqu'au milieu de septembre, sur *Populus tremula*; se transforme entre deux feuilles.

anastomosis. — *Salix* et *Populus alba*; mai, juin et juillet, puis en août et septembre.

curtula. — *Tilia europæa*, *Ulmus campestris*, *Quercus robur*, *Acer campestre*, *Alnus glutinosa*, *Salix alba*, *Populus*; mai, juin, juillet, août, septembre et octobre.

anachoreta. — *Salix* et *Populus*, mais plus particulièrement sur les *Salix*; mai et juin, juillet, août septembre et octobre.

pigra. — *Populus tremula*, *Populus* et *Salix*; mai et juin.

GONOPHORA

derasa. — Les *Rubus fruticosus*, *idæus*, *cæsius*; en septembre.

THYATIRA

batis. — Les *Rubus*; juillet, août, septembre et octobre.

GYMATOPHORA

octogesima. — *Populus*; entre deux feuilles qu'elle lie; septembre et octobre, juin et juillet.

- or.** — *Populus tremula* et divers *Populus* ; entre deux feuilles ; juin et juillet, août, septembre et octobre. — Juin et septembre ; DONZEL.
- duplaris.** — *Populus nigra*, *Alnus glutinosa* et *A. incana* ; juin, juillet, août et septembre..
- fuctuosa.** — *Betula alba* ; auteurs allemands. — Septembre et octobre ; MERRIN.

ASPHALIA

- ruficollis.** — *Quercus robur*, *Betula alba* ; a toute sa grosseur à la fin de juin.
- diluta.** — *Quercus robur*, *Betula alba* ; a toute sa taille fin juin.
- flavicornis.** — Arbres fruitiers, *Quercus robur*, *Betula alba*, *Populus* ; juin, juillet, septembre.
- zidens.** — *Quercus robur* et autres espèces de *Quercus* ; en juin et septembre.

NOCTUÆ

DILOBA

- cæruleocephala.** — Tous les arbres fruitiers, *Cerasus* et *Amygdalus*, *Cratægus oxyacantha* ; a toute sa croissance à la fin de juin.

SIMYRA

- dentinosa.** — La larve est figurée dans MENETRIES.
- nervosa.** — Les *Euphorbia*, les *Rumex* et quelques autres plantes basses ; en juin. — La variété *argentacea* est figurée à l'état de larve dans MENETRIES.

ARSILONCHE

- albovenosa.** — Graminées ; fin juillet selon DEGEER. — *Glyceria aquatica* ; août et septembre ; MERRIN.

EOGENA

- Contaminel.** — La larve est figurée dans MENETRIES.

GLIDIA

- geographica.** — *Linaria vulgaris*.
- chamæsyces.** — Vit en famille nombreuse sur les *Euphorbia characias nicæensis* et *chamæsyce* ; en juillet.

RAPHIA

hybris. — *Populus nigra* ; a toute sa taille vers le 10 juin.

DEMAS

coryll. — *Corylus avellana*, *Prunus insititia*, *Cratægus oxyacantha*, *Betula alba*, *Carpinus betulus*, *Fagus sylvatica*, *Quercus robur*, *Salix alba* ; mai, juin et septembre.

ACRONYCTA

- leporina.** — *Alnus glutinosa*, *Salix alba*, *S. vitellina*, *Betula alba*, *Populus tremula* et autres, et quelquefois l'*Ulmus campestris* ; depuis le mois de juin jusqu'en octobre.
- aceris.** — *Acer campestre*, *Æsculus hippocastanum*, *Ulmus campestris*, *Tilia europæa* ; juillet et août.
- megacephala.** — *Populus tremula*, *Betula alba*, *Populus* et *Salix* ; depuis fin juillet jusqu'en octobre.
- alni.** — *Salix vitellina* et *S. alba*, *Alnus glutinosa*, *Tilia europæa*, *Betula alba*, les *Populus* ; juin, juillet et août ; se transforme à terre dans la mousse, dans les débris.
- strigosa.** — *Betula alba* ; BERCE, DONZEL. — Sorbier des oiseleurs et *Prunus spinosa* ; TREITSCHKE. — *Cratægus oxyacantha* ; juillet août et septembre ; MERRIN.
- tridens.** — *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*, *Ulmus campestris*, *Pyrus communis*, *Rubus fruticosus*, *Rosa canina* ; se change en chrysalide en septembre et octobre.
- psi.** — Arbres fruitiers et forestiers ; *Tilia europæa*, les *Populus*, *Cratægus*, *Betula alba*, *Ulmus campestris*. — *Prunus spinosa* ; DE PEYERIMHOFF. — Depuis août jusqu'à la fin de l'automne.
- cuspis.** — *Alnus glutinosa* ; en septembre.
- menyanthidis.** — *Menyanthes trifoliata*. — *Myrica gale* ; GUÉNÉE. — Juin et juillet.
- auricoma.** — *Salix caprea*, *Rubus*, *Populus tremula*, *Erica vulgaris*, *Betula alba*, etc. — A Hyères, sur *Arbutus unedo* ; DONZEL. Milieu de juin, juillet et septembre.
- myrica.** — *Myrica gale*, *Salix*, *Betula alba*, Bruyère ; août et septembre ; MERRIN.

- euphorbia.** — *Euphorbia cyparissias*; juillet et août. — Vit en automne sur divers *Euphorbia*; DONZEL.
- euphrasia.** — *Cratægus oxyacantha*, *Euphrasia officinalis* *E. odontites*, *Euphorbia cyparissias* et *E. Gerardiana*, *Helianthemum vulgare*, *Rubus fruticosus*, *Vaccinium myrtillus*. — *Erica vulgaris*; OBERTHUR. — A toute sa taille fin septembre. — En juin et en septembre; BERGE.
- rumicis.** — *Rumex patientia*, les *Malva*, *Urtica*, *Sonchus*, *Rubus*, et *Rosa*, *Syringa vulgaris*, *Populus fastigiata*, *Betula alba*, *Polygonum persicaria*; depuis juin jusqu'en automne.
- ligustri.** — *Ligustrum vulgare*, *Fraxinus excelsior*, *Syringa vulgaris*; en juillet; se transforme en terre.

BRYOPHILA

- raptricula.** — Sur les Lichens des pierres et des vieux murs — Lieux exposés à toute l'ardeur du soleil; DONZEL. — En mai.
- strigula.** — Lichens des pierres et des vieux murs; en mai.
- algæ.** — Lichens des arbres.
- muris.** — Lichens du genre *Parmelia*, principalement sur *P. olivacea*, *grisea* et *parietina*; commencement du printemps, mai et juin; difficile à élever en captivité.
- perla.** — Lichens des murs et des pierres exposés au soleil; mange le soir et surtout le matin au lever du soleil; mai et juin.

MOMA

- Orion.** — *Quercus robur*, *Betula alba*, *Fagus sylvatica*. — *Quercus pedunculata*, *Q. sessilifolia*, *Carpinus betulus*; Ch. DUBOIS. — Août, septembre et octobre.

DIPHTERA

- ludifica.** — *Quercus robur*, *Salix*, Sorbier des oiseleurs, *Prunus spinosa*; est arrivée à toute sa taille en juillet et août; TREITSCHKE. — Pommier, *Prunus padus*, *Salix caprea*; HEINRICH FREY. — *Cratægus oxyacantha*; LE PAIGE,

PANTHEA

- cænobita.** — *Abies picea*; à toute sa taille en septembre ou octobre.

AGROTIS

- strigula.** — *Erica herbacea*, *E. cinerea*. — Sur différentes espèces de Bruyères; BERCE. — Mai et juin. — Juillet et août; passe l'hiver en chrysalide; DONZEL.
- polygona.** — *Plantago media* et probablement sur d'autres plantes basses; BERCE. — *Polygonum* et *Rumex*; FREY.
- sigma.** — *Brassica oleracea*, *Atriplex* des jardins sur plantes basses; BERCE; au printemps.
- subrosea.** — *Myrica gale*, *Salix*; mai et juin; MERRIN.
- jantina.** — *Aram maculatum*, *Primula veris*. — *Cytisus scoparius*, *Alsine media*; MERRIN. — Mars et avril.
- linogrisea.** — *Primula veris*, *Rumex acetosella*, *Glechoma hederacea*; février et mars. — En avril sur les plantes basses, après avoir passé l'hiver; DONZEL.
- fimbria.** — *Primula veris*, *Cynoglossum officinale*, *Faba vulgaris*, *Solanum tuberosum*, *Valerianella locusta*, *Leontodon taraxacum*; est polyphage; dans les bois, a toute sa taille; mars commencement avril, eu secouant les feuilles sèches.
- interjecta.** — Dans les herbes et les broussailles, surtout dans les terrains en talus; avril et mai.
- punicea.** — Ronce, Plantin; se chrysalide en mai.
- augur.** — *Taraxacum dens-leonis* et autres plantes basses; hiverne et vit au printemps.
- obscura.** — Sous les plantes basses, *Carduus*, *Taraxacum dens-leonis*; avril et mai; MERRIN.
- pronuba.** — Plusieurs Crucifères et principalement *Thlaspi*, *Senecio vulgaris*, *Primula officinalis*; sur toutes les plantes basses; DONZEL, BERCE. — Se transforme mars et commencement avril dans les bois et les jardins.
- orbana.** — Sur les Graminées et quelquefois sur les plantes basses; mars, avril et mai; dans les bois et les jardins sur une foule de plantes potagères.
- comes.** — *Plantago lanceolata*, plantes basses et potagères; mars et avril. — Avril et mai sur les Graminées et quelquefois sur les plantes basses; BERCE.
- castanea.** — Sur les plantes basses; avril et mai. — *Calycotome spinosa*; MILLIÈRE.

- hyperborea**. — *Empetrum nigrum*; fin juillet, août; MECK.
- agathina**. — Les *Erica vulgaris*, *cinerea*, *scoparia* et *arborea*; éclôt fin de l'automne, passe l'hiver et on commence à la trouver fin février commencement de mars, jusqu'en mai.
- triangulum**. — *Bellis perennis* et plusieurs plantes basses dans les allées des bois; est polyphage. — *Salix*, *Rubus fruticosus*, etc.; avril; MERRIN.
- baja**. — *Primula veris*, *Atropa belladonna*, Fraisier, Pissenlit; avril et mai. — Sur plusieurs plantes basses et arbustes; BERCE.
- candelarum**. — *Taraxacum dens-leonis*, *Plantago media*; HUBNER.
- Ashworthii**. — Se nourrit de Graminées et d'un *Sedum*. — *Festuca ovina*, *Picris hieracioides*, *Helianthemum vulgare*, *Thymus*, *Erica*, *Taraxacum dens-leonis*; MERRIN. — Passe l'hiver et n'est parvenue à toute sa taille qu'à la fin de mars ou les premiers jours d'avril.
- C. nigrum**. — *Lonicera xylosteum*, sous les plantes basses et dans les feuilles sèches; février et mars.
- ditrapezium**. — Sur plusieurs plantes basse; *Primula*, *Lamium*, etc.; mars.
- stigmatica**. — *Plantago lanceolata*; elle est polyphage, selon BERCE; mange les *Rumex*, selon DE PEYERIMHOFF; mars et avril.
- xanthographa**. — Se nourrit de *Plantago*; MARTORELL. — Sur les Graminées et autres plantes basses, LE ROI et BERCE. — *Polium perenne*; BRUAND. — Depuis octobre à mars; MERRIN.
- umbrosa**. — Gazon et autres plantes basses; avril. — Depuis août à février, *Rumex* et différentes plantes basses; MERRIN.
- rubi**. — Bois humides, plantes herbacées; avril, mai et juin.
- Dahlia**. — *Plantago lanceolata*; HUBNER; mai; dans les hivers doux se nourrit sans hiverner.
- brunnea**. — *Pisum arvense*, *Primula elatior*, *P. officinalis*, *Rubus fruticosus*, *Lonicera*, *Geum urbanum* et diverses plantes basses; avril et mai. — Au printemps et en automne; Ch. DUBOIS.
- festiva**. — *Rumex acetosa* et diverses plantes basses, dans les feuilles sèches; mars, avril et mai. — Depuis juillet à février compris, sur *Viola*, *Salix*, *Digitalis purpurea* et racines des plantes basses; MERRIN.
- confua**. — Polyphage, préfère le *Silene acaulis* et les *Leontodon*; a toute sa taille fin mai.

- depuncta.** — Sur plusieurs plantes basses, *Rumex*, etc.; au printemps.
- glareosa** — Sur les plantes basses, principalement les *Rumex*, *Ficaria ranunculoides*, *Spartium scoparium*; au printemps. — En mars trouvée abondamment dans les herbes des vignes; DONZEL.
— Les *Galium*; MARTORELL;
- margaritacea.** — *Plantago media* et différentes plantes basses; au printemps.
- multangula.** — Différentes espèces de *Galium*; mai.
- rectangula.** — Principalement les *Melilotus*, *Trifolium* et *Medicago*; GODART.
- cuprea.** — *Taraxacum* et sur plusieurs plantes basses; FREY.
- ocellina.** — *Phyteuma*.
- plecta.** — *Cichorium intybus*, *Galium verum* et d'autres plantes amères; en captivité, *Persica vulgaris*; en automne.
- leucogaster.** — *Lotus angustissimus* et aussi plusieurs plantes basses; éclôt en janvier; a toute sa taille fin février.
- musiva.** — *Cichorium intybus*; GODART. — *Picris* et sur plusieurs plantes basses; FREY.
- flammatra.** — Sur le *Taraxacum* et le *Potentilla*; FREY.
- candelisequa.** — *Peucedanum paniculatum*. — *Plantago media*; HUBNER. — Fin mai, commencement de juin.
- simulans.** — Sous les plantes basses, Graminées, Bruyères et autres plantes basses; août; MERRIN.
- lucernea.** — *Campanula rotundifolia*, *Taraxacum dens-leonis*; février, mars, avril, mai; MERRIN.
- nyctimera.** — *Festuca ovina*; passe l'hiver sous les pierres, dans les lieux secs et arides; se métamorphose fin avril; BERCE.
- helvetina.** — *Triticum repens*; s'enterre en juillet.
- lucipeta.** — Plantes herbacées, printemps; *Tussilago farfara*, *Petasites officinalis*, *Euphorbia cyparissias*; FREY.
- fugax.** — Vit sur les plantes basses et principalement sur les Graminées; GUÉNÉE.
- putris.** — Ronge les racines de diverses Graminées, notamment le *Triticum repens*; a toute sa grosseur fin avril, commencement de mai, et pour la deuxième fois en août.
- signifera.** — *Draba verna*, *Cochlearia armoracia*, *Plantago*; FREY.
- forcipula.** — Différentes espèces de *Rumex*; WULLSCHLEGEL.

fimbriola. — Différentes plantes basses dans les prés exposés au soleil ; avril.

latens. — Vit de Graminées dans les lieux montagneux ; avril.

birivia. — *Triticum repens* ; juin ; DONZEL.

cinerea. — Sous les plantes basses, de septembre à mars ; MERRIN.

puta. — Sur les Graminées, aux bords des marais et des rivières ; TRIMOULET ; en mai et septembre. — Fin février, à toute sa taille ; MILLIÈRE.

exclamationis. — *Senecio vulgaris* ; au pied de toutes les plantes basses ; août.

spinifera. — Au pied des Graminées dont elle ronge les feuilles. — *Plantago, Scabiosa, Cichorium* ; MARTORELL.

arenosa. — *Plantago, Scabiosa, Rumex, etc.* ; MARTORELL.

ripæ. — *Cynoglossum officinale* ; août, septembre et octobre ; MERRIN.

cursoria. — Les *Euphorbia esula, Gerardiana* et *cyparissias* ; mai et juin.

nigricans. — Sous les plantes basses ; au printemps.

tritici. — *Origanum vulgare, Centranthus ruber, Dianthus armeria, Cichorium intybus, Galium verum* ; avril et mai. — Dans les racines des Graminées ; BERCE.

obelisca. — *Galium verum*, racines de Graminées ; en avril.

saucia. — Racines de Graminées, sous les Luzernes et les Trèfles, *Centranthus ruber, Plantago, Rumex, Daucus, Carduus* ; hiverne et vit au printemps. — MILLIÈRE dit qu'elle ne vit pas de racines, mais de feuilles.

trux. — Lieux arides, presque toutes les plantes basses, feuillés caulinaires et racines ; au printemps. — *Melilotus vulgaris* ; FREY.

lunigera. — S'élève très bien avec le *Polygonum aviculare* ; août, septembre et octobre ; MERRIN.

ypsilon. — *Sonchus arvensis* et différentes plantes basses ; au printemps.

segetum. — Vit aux dépens de presque toutes les plantes-racines, après avoir hiverné en terre ; se transforme en mai.

corticea. — Vit de racines. — *Chenopodium*, depuis septembre à mars ; MERRIN. — Se chrysalide avril et mai.

crassa. — Sur les Graminées ; WULLSCHI EGEL.

obesa. — Vit sous terre, s'attaque de préférence aux racines du *Camphorosma monspeliacum* et à son défaut à d'autres racines, quelquefois à celles du *Vitis vinifera*.

vestigialis. — *Euphorbia cyparissias* ; GODART. — Pied des *Carduus* ;

lieux arides et sablonneux; fin septembre, hiverne; se trouve en mai mangeant les racines de gazon.

fatidica. — Ronge de préférence les racines plutôt que les feuilles des Graminées; a son entier développement commencement d'août.

præcox. — *Sonchus oleraceus* et plantes basses, dans les endroits sablonneux, principalement au bord de la mer; fin mai; s'enfonce en terre au commencement de juin.

prasina. — *Cochlearia armoracia*, *Anchusa officinalis*, *Primula veris* et *P. elatior*, *Cynoglossum officinale*, *Lonicera*; CONSTANT. — *Vaccinium myrtillus* et *V. uliginosum*; Ch. DUBOIS. — Passe l'hiver et n'acquiert toute sa taille qu'en mars, avril ou mai. — Dans les feuilles sèches; M. LE ROI.

occulta. — *Lactuca sativa*, *Taraxacum dens-leonis*; mai.

BRITHYS

pancratii. — *Pancratium maritimum*; juin. — La chenille vit en automne sur *Pancratium maritimum* qui croit dans les sables près de la mer; DONZEL.

encaustus. — DONZEL croit qu'elle a les mêmes mœurs que la précédente.

CHARCEAS

graminis. — Ronge les racines des Graminées.

NEURONIA

popularis. — *Lolium perenne*, *Triticum repens*, et *T. æstivum*; mars, avril et mai. Presque enterrée à la base des Graminées dont elle mange les racines et les feuilles basses; BERCE.

cespitis. — Racines des Graminées, principalement *Triticum repens*, *Aira cæspitosa*; a toute sa taille en juillet; les chenilles s'entre-dévorent; pour élever les chrysalides, il est bon de les tenir dans un endroit humide.

MAMESTRA

leucophæa. — *Achillea millefolium*, *Spartium scoparium*; en été et en automne. — Vit de Graminées dans les bois; a toute sa taille courant avril; BERCE.

serratilinea. — *Plantago lanceolata*, *Verbascum*; a toute sa taille en juin. S'enterre selon TREITSCHKE.

- advena.** — *Lactuca sativa*, *Taraxacum dens-leonis*; en société; TREITSCHKE. — *Polygonum aviculare* et diverses plantes basses; MERRIN. — Entre en terre à la fin de l'automne et arrive à toute sa taille en avril.
- tincta.** — Les *Ononis spinosa* et autres; fin de l'automne; DUPONCHEL. — Passe l'hiver et a toute sa taille au mois d'avril; BERCE.
- nebulosa.** — *Verbascum thapsus*, *Primula veris*, *Rumex*. — *Betula alba*; MERRIN. Mars et avril.
- contigua.** — *Senecio Jacobæa*, *Chenopodium Bonus-Henricus*, *Genista* et *Rumex*, même sur les jeunes pousses de *Corylus avellana*; s'enfonce en terre en septembre et octobre.
- thalassina.** — *Betula alba*, *Genista* et *Rumex*; en septembre.
- dissimilis.** — Différentes espèces de *Plantago*, *Atriplex hortensis* et différentes plantes herbacées (épis de Maïs; JOURDHEUILLE); se chrysalide très profondément en terre, depuis juin jusqu'à fin octobre.
- pisi.** — *Pisum sativum*, aussi sur les autres plantes Légumineuses, même le *Spartium scoparium*; *Delphinium consolida*, *Trifolium*, *Populus*, *Plantago*, *Scabiosa sylvatica*, *Myrica gale*; a toute sa grosseur en septembre.
- brassicæ.** — Toutes les plantes Potagères, principalement les *Brassica*; depuis juillet à fin septembre.
- persicariæ.** — *Polygonum persicaria*, *Sambucus nigra*, *Humulus lupulus*, quelquefois les *Atriplex*, *Lamium album*, *Brassica*, *Urtica*; septembre et octobre.
- albicolon.** — Chenille dans les rides et sous les écorces des Peupliers; BERCE. — *Atriplex* et *Chenopodium*; juillet et août; MERRIN.
- aliena.** — Aime les lieux exposés au soleil sur le *Melilotus* et l'*Hippocrepis comosa*; FREY.
- oleracea.** — *Polygonum persicaria*, *P. hydropiper*, *Verbascum thapsus*, *Ribes uva-crispa*; sur presque toutes les plantes Potagères; depuis juin jusqu'au milieu d'octobre.
- genistæ.** — Vit sur les *Genista germanica*, *pilosa*, *sagittalis* et *tinctoria*, *Vaccinium myrtillus*; s'enfonce en terre en août. — Août et septembre; BERCE.
- glauca.** — *Cypripedium calceolus*; HUBNER. — *Tussilago farfara*; TREITSCHKE. — A toute sa grosseur en juillet et août.
- dentina.** — *Taraxacum dens-leonis* et sur plusieurs plantes basses;

- Ranunculus acris*, *R. repens*; a atteint toute sa grosseur en mai et juin. — Elle ronge de préférence les racines; DONZEL.
- peregrina.** — Différentes plantes basses; en juin. — *Salsola* et *Chenopodium maritimum*; en juin, août et septembre; se transforme en terre; RAMBUR.
- marmorosa.** — *Hippocrepis comosa*, *Ornithopus perpusillus*; vit pendant l'été.
- Treitschkei.** — *Hippocrepis comosa*, *Anarrhinum bellidifolium*, *Lotus corniculatus*; en juin.
- trifolii.** — *Apium graveolens*, *Lactuca sativa*, *Brassica oleracea*, *Sonchus oleraceus*, *Asparagus sativus*, *Spartium scoparium*, *Atriplex hortensis*, *Chenopodium Bonus-Henricus*; depuis le mois de juillet jusqu'en octobre.
- sociabilis.** — *Artemisia campestris*. 1. *cærulescens*; juin, juillet et août.
- sodæ.** — Différentes espèces de *Salsola* et de *Chenopodium*.
- reticulata.** — *Saponaria officinalis*, *Dianthus armeria*, *D. carthusianorum*, *Silene inflata*, *Cucubalus baccifer*; a toute sa taille en juillet et en août.
- chrysozona.** — Fleurs et boutons des *Lactuca sativa*, *virosa* et *perennis*, *Aquilegia vulgaris*, *Apium petroselinum*, *Artemisia*; fin avril, juin, juillet et août. — DONZEL ne mentionne que le mois d'avril.
- serena.** — *Tilia europæa*, *Hieracium umbellatum*, *Leontodon hispidus*, *L. hirtus*, *Sonchus palustris*, *Crepis tectorum*, *Lactuca perennis*; se change en chrysalide en juillet.
- cappa.** — *Delphinium staphisagria*, *D. Ajacis*; mange les fleurs, les graines et les capsules vertes; mai, juin et août.

DIANTHÆCIA

- luteago.** — Tige et racine du *Silene inflata*; en juillet et août.
- cæsia.** — Aux pieds des plantes basses; au printemps. — Capsules du *Silene maritima*; juin; PORRIT.
- filigramma.** — *Silene inflata* et *S. nutans*.
- Magnolii.** — Les *Silene nicæensis* et *noctiflora*; BOISDUVAL. — *Silene nutans*; FREY. — WULLSCHLEGEL dit qu'elle vit de la graine.
- nana.** — Graines des *Lychnis dioica*, les *Silene inflata* et *nutans*, les *Lychnis flos-cuculi* et *sylvestris*; en juin et juillet.
- albimacula.** — Préfère les *Silene nutans*; se trouve aussi sur le *Silene*

inflata, les *Lychnis flos-cuculi* et *dioica*; juin et juillet. —

Capsules des *Silene*; en mai; MARTORELL.

compta. — *Lychnis dioica*, *Dianthus prolifer*, *D. caryophyllus*; en juin et juillet; deux pontes par an suivant TREITSCHKE.

capsincola. — *Lychnis dioica*, *Silene inflata*, *Saponaria officinalis*; de juin à octobre.

cucubali. — *Silene inflata*, et, selon DE PEYERIMHOFF, *Agrostemma coronaria*; juillet, août, septembre et octobre.

carpophaga. — *Silene inflata*, *S. noctiflora*, *Cucubalus behen*, *Saponaria officinalis*; se chrysalide en terre, en août.

capsophila. — Attaque les *Silene*; MARTORELL. — Graines des *Silene maritima* et *inflata*; mai, juin à septembre; MERRIN.

silenes. — Capsules du *Silene viscosa*. — *Silene crassicaulis*; juillet à septembre; MARTORELL.

irregularis. — *Gypsophila paniculata* et *G. saxifraga*; dans les fleurs; août.

METOPOCERAS

Canteneri. — Les *Plantago* et les Chicoracées; en octobre; MARTORELL.

CLADOCERA

optabilis. — *Pterotheca nemausensis*, de préférence à toutes autres plantes herbacées; atteint son entier développement fin avril; racines dans les terrains incultes.

EPISEMA

glaucina. — *Muscari racemosum*, *Anthericum ramosum*; FREY.

scoriacea. — *Quercus robur*; mai. — Selon GUINARD, de Montpellier, elle vivrait des fleurs de l'Asphodèle rameux.

HELIOPHOBUS

hispidus. — Graminées, aux pieds desquelles elle se cache après la troisième mue; vit aussi de plusieurs plantes basses; en automne; BERCE.

ULOCHLÆNA

hirta. — Ne mange que la nuit et se nourrit de Graminées; parvenue à toute sa taille en avril; ne se métamorphose qu'en août.

APOROPHYLA

- lutulenta.** — Sur un grand nombre de plantes basses dans les jardins et les champs, les *Genista*. — A Hyères, se trouve abondamment en mars, dans le cœur des Asphodèles rameux; DONZEL. — *Lithospermum arvense* et autres plantes basses; MERRIN. — Avril et mai.
- nigra.** — *Alsine media*, différentes espèces de *Rumex*, préfère les *Genista*; se trouve aussi sur différentes plantes basses; a toute sa taille en juin et juillet.
- catalaunensis.** — *Ononis ramosissima*; elle vit enterrée sous les pieds de la plante.
- australis.** — *Asphodelus microcarpus* et les Chicoracées; RAMBUR. — Selon MILLIÈRE, plusieurs espèces de Graminées et de *Carex*. — S'élève très bien, disent les auteurs, avec les *Carex* et les Graminées. — Mars; a toute sa taille en septembre.

AMMOCONIA

- coccimacula.** — *Sium falcaria*, *Taraxacum dens-leonis*, *Spartium scoparium*; mai.
- vetula.** — *Calycotome spinosa*; vers le milieu de mai, elle a atteint toute sa grosseur.]

EPUNDA

- lichena.** — Sur les *Rumex*; en avril. — *Senecio*; MERRIN.

POLIA

- serpentina.** — Chenille figurée par FREYER sur les plantes basses; en avril.
- polymita.** — *Arctium lappa*. — Selon TREITSCHKE, vit en société. — *Primula elatior*; FREY.
- flavicincta.** — *Ribes grossularia*, *Lactuca sativa*, *L. virosa*, *Rumex patientia*, *Salix*, *Artemisia*, *Cichorium intybus*, *Prunus cerasus*, *Antirrhinum asarina*; juin et juillet. — Sur une foule de plantes et d'arbustes; en mai; BERCE.
- rufocincta.** — Sur plusieurs espèces de plantes basses de genres bien éloignés; *Asplenium ruta-muraria*, les *Hieracium*, *Silene*

- nutans*, *Crepis biennis*, *Campanula*; éclôt à la fin de mars et n'est parvenu à toute sa taille que vers les premiers jours de mai.
- dubia.** — Les *Centranthus ruber* et *calcitrapa*, *Cistus albidus*, *Atriplex humilis*, *Buxus sempervirens*, *Hyosciamus niger*; décembre et janvier. — En mars, selon MARTORELL.
- anthomista.** — *Plantago lanceolata*; en mai. — *Spartium scoparium*; GUILLEMOT, CONSTANT.
- venusta.** — *Ulex parviflorus*, *Spartium junceum*, *Cistus albidus*, *C. salviæfolius*; éclôt en octobre; passe l'hiver et parvient à toute sa taille vers la fin mars.
- canescens.** — Diverses plantes, principalement sur l'*Asphodelus microcarpus*; en février, mars et avril, selon RAMBUR; en mai et juin, d'après BERCE.
- suda.** — Sur les *Galium*.
- chi.** — *Aquilegia vulgaris*, *Sonchus oleraceus*, *S. arvensis*, *Lactuca sativa*, *Arctium lappa*, *Salvia pratensis*, *Genista*; à toute sa grosseur dans le milieu de juin.

DRYOBOTA

- furva.** — Sur les fleurs des *Quercus ilex* et *suber*; se change en chrysalide, fin octobre. — Avril et mai; MILLIÈRE.
- roboris.** — *Quercus robur*; en mai et juin.
- Saportæ.** — *Quercus ilex*; en juin.
- monochroma.** — *Quercus suber* et *Q. ilex*; en mai et juin.
- protea.** — *Quercus robur*; en mai et juin.

DICHRONIA

- convergens.** — *Quercus robur*; à toute sa grosseur fin mai.
- æruginea.** — *Quercus austriaca*; à toute sa taille en mai. — *Quercus robur*; DONZEL, DELAMAIN.
- aprilina.** — *Quercus robur*, *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*; à toute sa taille fin août. — Mai; BERCE.

CHARIPTERA

- viridana (cultâ).** — *Cratægus oxyacantha*, *Prunus spinosa*, *P. domestica*, *Pyrus communis*; à toute sa grosseur en août et septembre.

MISELIA

- bimaculosa.** — *Ulmus campestris*; à toute sa taille fin juin. — Avril et mai, à Hyères; DONZEL.
- oxyacanthæ.** — *Cratægus oxyacantha*, *Prunus spinosa* et *P. domestica*, *Persica vulgaris*; mai et juin.

VALERIA

- jaspidea.** — *Prunus spinosa*; mai, juin et juillet, suivant les localités.
- oleagina.** — *Prunus spinosa*; mai et juin.

APAMEA

- testacea.** — Racines des Graminées; DE PEYERIMHOFF. — *Marrubium vulgare*; TRIMOULET. — Juin et octobre. — En mars; MERRIN. — Selon DONZEL, vit en été de la partie inférieure des plantes basses.
- Nickerlii.** — Graminées; se tient cachée dans les racines, dans les endroits sablonneux; à toute sa grosseur dans le mois de juin.
- Dumerilii.** — Vit certainement, selon moi, dans la terre des racines des Graminées.

LUPERINA

- Haworthii.** — Vit sur des plantes marécageuses du genre *Eriophorum*; STANTON. — En juin et juillet, sur l'*Eriophorum vaginatum*; MERRIN.
- matura.** — Plusieurs Graminées; vit très cachée sous les touffes, aime les lieux arides et le bord des routes. — Vit sur les *Primula* et probablement sur d'autres plantes basses; DONZEL. — Depuis le mois de septembre jusqu'au mois d'avril.
- rubella.** — Racines de Graminées; à toute sa taille du 15 au 20 juillet; MILLIÈRE.
- verens.** — *Alsine media*, *Plantago lanceolata* et sur les Graminées; se transforme commencement de juin. — Sur les Graminées dans les lieux arides; GOOSSENS.
- chenopodiphaga.** — *Chenopodium fruticosum*, *Salsola soda*, *Atriplex portulacoides*; en hiver et au mois de mai; RAMBUR. — A toute sa taille, milieu de mars, avril et mai.

HADENA

- porphyrea.** — *Lonicera alpigena*, HUBNER. — *Lonicera periclymenum*; juin; MERRIN.
- adusta.** — Vit sur diverses plantes basses, mange aussi les feuilles du *Quercus robur*; août et septembre; hiverne.
- Sommeri.** — Divers *Hieracium*, *Leontodon* et certaines Graminées; met tout l'été à grossir, et ne parvient à toute sa taille qu'en septembre.
- Solieri.** — Vit de plusieurs plantes basses et surtout de plantes potagères; *Cyclamen europæum*, *C. neapolitanum*; hiverne; a toute sa taille en janvier. — Sous les *Genista*, en juillet; Société entomol. de France.
- ochroleuca.** — Sur diverses Graminées, dans les prairies, les champs de blé, autour des granges; mai et juin.
- exulis.** — Les *Poa*; passe l'hiver, a toute sa taille à la mi-juin.
- furva.** — A la base des Graminées; en juin. — *Aira canescens*; en mai; MERRIN.
- abjecta.** — Vit de plantes basses; BERGE. — Racines de *Triticum repens*; en mai; MERRIN.
- lateritia.** — Vit de plantes basses et de gazon, cachée sous les pierres; mai.
- monoglypha.** — Se nourrit de racines de différentes plantes potagères; passe l'hiver et croît jusqu'en avril et mai.
- lithoxylea.** — Sur les racines des Graminées; fin mars; W. MACHIN.
- sordida.** — *Betula alba* et *Alnus*; septembre. — Graminées; FREY.
- basilinea.** — *Triticum repens* et spécialement les céréales; en septembre et octobre. — Dévore les chenilles avec lesquelles on la met; février; MERRIN.
- rurea.** — Plusieurs espèces de plantes, principalement *Lolium perenne*, *Primula veris*, *Triticum repens*, *Rumex* (LE ROI ne mentionne que les *Rumex*); a toute sa grosseur fin mars.
- scolopacina.** — Racines de Graminées et de plantes basses, Ajoncs; se transforme au commencement de juin.
- hepatica.** — Racines et jeunes pousses de Graminées; TREITSCHKE; passe l'hiver et ne se chrysalide qu'au printemps suivant. — Plantes basses, *Alsine media*; MERRIN.
- gemina.** — Se nourrit de plantes basses; avril, mai, juin et septembre.

- unanimis.** — Sur les plantes basses et les Graminées. — Se cache sous l'écorce des *Salix* et *Populus*, ou dans le sol parmi les racines de ces arbres; depuis septembre en mars; MERRIN. — Principalement sur le *Phalaris arundinacea*; FREY.
- didyma.** — Sur différentes plantes basses, principalement le *Dactylis glomerata*; au printemps.
- literosa.** — Dans les tiges des Graminées; vit en avril.
- strigilis.** — Tiges des Graminées, dans les parties humides et basses; mars et avril.
- fasciuncula.** — *Aira cæspitosa*; trouvée le 23 avril; continua de manger jusqu'au 1^{er} mai; BUCKLER.
- bicoloria.** — Dans les tiges de *Festuca*; avril, mai et juin; MERRIN.

DIPTERYGIA

- scabriuscula.** — Plusieurs *Rumex*, principalement l'*acetosa*; a toute sa taille fin septembre commencement d'octobre et pour la deuxième fois en avril.

HYPPA

- rectilinea.** — *Lonicera xylosteum*, *Rubus idæus*, *Fragaria vesca*, *Vaccinium myrtillus*, *Salix caprea*; septembre et octobre. — TREITSCHKE dit quelle passe l'hiver; a toute sa taille. — Depuis août en mars; MERRIN. — *Pteris aquilina*, *Anthriscus sylvestris*; FREY.

RHIZOGRAMMA

- detersa.** — Se nourrit de plusieurs plantes herbacées, préfère le *Berberis vulgaris*; hiverne et s'enterre à la fin de mai.

CHLOANTHA

- hyperici.** — Les *Hypericum perforatum*, *montanum*, et *Richeri*; juin.
- polyodon.** — Sur les *Hypericum hirsutum*, *perforatum* et *quadrangulum*, *Astragalus cicer*; depuis juin jusqu'en août. — GOOSSENS la prend en septembre et octobre, surtout à la brume.
- radiosa.** — *Hypericum perforatum*, *H. montanum*; juillet et août. — Juin; DONZEL.

ERIOPIUS

purpureo-fasciata. — *Pteris aquilina*; juillet, août et septembre; ne se chrysalide qu'au printemps suivant.

Latreillei. — *Ceterach officinarum*; ne ronge que les fructifications; quatre à six générations par an. — *Adiantum capillus-Veneris*; en automne et par les temps de pluie; MARTORELL. — Selon d'autres auteurs, en juin et juillet.

POLYPHÆNIS

sericata. — Les *Lonicera caprifolium* et *xylosteum*, *Phillyrea angustifolia*; avril; ne mange que la nuit.

TRACHEA

atriplicis. — *Atriplex hortensis*, *Rumex acetosa*, *Polygonum persicaria*, *P. hydropiper*; dans les basses-cours, au bord des marais et des ruisseaux, le jour se cache sous les plantes; depuis le mois de juillet, jusqu'en octobre.

TRIGONOPHORA

flammea. — Vit sur plusieurs plantes basses; *Ficaria ranunculoides*, *Urtica* et *Rumex*, les *Genista*; GUILLEMOT. — Selon MARTORELL, entre les feuilles sèches des *Centaurea*. — Passe l'hiver et parvient à toute sa taille au mois de mai. — Mars, MERRIN.

Jodea. — *Prunus spinosa* et les *Genista*; avril et mai.

EUPLEXIA

lucipara. — *Rubus fruticosus*, *R. saxatilis*, *Rumex acetosa*, *Lactuca sativa*, *Matricaria*, *Chamomilla*, *Trifolium*, *Melilotus*, *Echium vulgare*, *Anchusa officinalis*, *Chelidonium majus*; dans les endroits ombragés; août, septembre et octobre.

HABRYNTIS

scita. — *Fragaria vesca*, *Viola odorata*, *Pinus abies*; BRUAND; en juin. — En mai; DONZEL.

BROTOLOMIA

meticulosa. — Différentes Giroflées, Absinthe, *Beta vulgaris*, *Urtica*

urens et *U. dioica*, *Mercurialis annua*, *Poterium sanguisorba*, *Primula veris*; a atteint toute sa taille au mois d'avril. — Vit sur une foule de plantes basses, presque toute l'année; BERCE.

MANIA

maura. — *Crataegus oxyacantha*, *Prunus spinosa*, *Alnus glutinosa*, *Salix*, *Populus*, *Rubus*, *Rumex*, *Alsine*; avril et mai.

NÆNIA

typica. — *Verbascum lychnitis*, *Cynoglossum officinale*, *Urtica urens*, *Salix pentandra*, *Scrophularia aquatica*, *Sonchus*, *Vitis vinifera*; vit en petite famille dans son jeune âge; passe l'hiver; en mai a toute sa taille.

NYSSCENEMIS

obesa. — Se nourrit la nuit des nombreuses fleurs de *Pterotheca nemausensis*; le jour elle s'enfonce en terre; au commencement de mai, elle entre en terre pour ne se transformer qu'en juillet.

JASPIDEA

celsia. — *Typha latifolia*; racines des arbres forestiers; FREY.

HELOTROPHA

leucostigma. — *Iris pseudo-acorus*, dans les tiges; en juin; DONZEL. — En avril; MERRIN.

HYDRÆCIA

nictitans. — Vit de Graminées, principalement: *Aira cæspitosa*; se tient toujours cachée sous terre; mai et juin.

micacea. — Racines de Cypéracées; se chrysalide en terre, et le papillon éclôt en août et septembre. — *Rumex conglomeratus* et *R. crispus*; dans les tiges et racines; MABILLE.

petasitis. — Tiges et racines de *Petasites vulgaris* et *Arctium lappa*; juin et juillet; MERRIN.

xanthenes. — *Cirsium lanceolatum*, peut-être le *C. tuberosum*, les *Cynara scolymus* et *C. carduncellus*; au printemps et en été; MILLIÈRE.

leucographa. — Passe l'hiver dans les tiges de *Peucedanum officinale*; se chrysalide dans la racine, en juillet.

GORTYNA

ochracea. — *Arctium lappa*, *Verbascum thapsus*, *Scrophularia aquatica*, *Sambucus nigra*, *S. ebulus*, *Cirsium palustre*, dans les tiges ; a atteint toute sa croissance en juillet.

NONAGRIA

cannæ. — *Typha latifolia*, *Carex riparia* ; se transforme en chrysalide commencement juillet.

sparganii. — *Sparganium ramosum*, *Typha angustifolia* le plus souvent ; juillet.

arundinis. — *Typha latifolia*, quelquefois les *T. intermedia* et *angustifolia*. Les *Sparganium* ; MARTORELL ; juillet, août.

geminipuncta. — Intérieur des tiges de l'*Arundo phragmites*. — *Iris pseudo-acorus* ; RENARD. — A toute sa taille en juillet.

neurica. — Intérieur des Joncs ; se transforme en juin et juillet.

SENTA

maritima. — *Spergularia marina* et *S. media* ; août. — Depuis septembre en avril sur *Phragmites communis* ; MERRIN.

MYCTEROPLUS

puniceago. — *Atriplex nitens*, *Chenopodium polyspermum*, graines vertes ; octobre et novembre.

TAPINOSTOLA

fulva. — Dans les *Carex* et le *Poa aquatica* ; juin et juillet.

Hellmanni. — Racines de l'*Arundo phragmites* ; juin ; MERRIN.

extrema. — La chenille vit dans les Roseaux ; DONZEL.

elymi. — *Elymus arenarius* ; mai ; MERRIN.

JESAMIA

nomagrivides. — Tiges du Maïs, dont elle mange la moelle et aussi, dit-on, dans les tiges du *Sorgho* ; deux ou trois générations se succèdent par année ; BERGE.

cretica. — Champs de Maïs ; depuis octobre, jusqu'en mai.

CALAMIA

lutosa. — Dans les racines de l'*Arundo phragmites*; du 15 juin au 15 juillet; octobre à avril; MERRIN.

phragmitidis. — *Arundo phragmites*; se retire pendant le jour dans les tiges sèches de cette plante; se transforme en chrysalide en juin.

LEUCANIA

impudens. — *Eriophorum angustifolium*; DONZEL. — Graminées; BOIS-DUVAL, RAMBUR et GRASLIN. — *Arundo phragmites*, *Glyceria aquatica*, Graminées; mars. — Se métamorphose au printemps, après avoir passé l'hiver.

impura. — Dans les bois humides, les prairies marécageuses et le bord des étangs; *Carex*; avril et mai. — Mai et juin; DONZEL. — *Carex*, *Dactylis glomerata*; MERRIN.

pallens. — *Rumex acetosa*, *Alsine media*, et sur les Graminées; au premier printemps et en juin, juillet et août. — Sur les Graminées et autres plantes basses; mars, avril et août; BERCE. — *Deschampsia cespitosa*; d'octobre en mars; MERRIN.

obsoleta. — Intérieur des Jones, brisés ou tordus, principalement l'*Arundo phragmites*; y passe l'hiver; août et septembre.

straminea. — Dans les prairies basses et au bord des ruisseaux; dès février; *Arundo phragmites* et Graminées grossières; mars, avril; MERRIN.

hispanica. — Graminées, peut être exclusivement sur les *Piptatherum*, notamment le *P. multiflorum*; août, septembre et décembre.

sicula. — La chenille vit sur les bords de la mer; en août; BERCE.

zeæ. — Champs de Maïs, *Zea*.

punctosa. — Sur les Graminées; en mars; doit éclore en automne, a atteint son entier développement fin février ou mars.

putrescens. — Sur les Graminées; en mars; reste enfermée dans sa coque sans se chrysalider, depuis la mi-mars jusqu'au 15 ou 20 mai.

comma. — *Rumex acetosa*, et différentes plantes basses; en juillet et au printemps suivant.

conigera. — *Bellis perennis* et Graminées, a toute sa taille en avril et mai. — Février et mars; selon BERCE. — *Triticum repens* et autres Graminées; MERRIN.

- vitellina.** — Sur les Graminées; les *Rumex*, *Plantago*, *Lactuca*; commencement du printemps et en automne.
- littoralis.** — *Calamagrostis arenaria* et quelquefois *Triticum acutum*; mange les feuilles et surtout les graines; de janvier à mai.
- Loregi.** — Graminées; au printemps et en automne.
- riparia.** — Avril; BERCE.
- l. album.** — *Carex pallescens* et différentes plantes basses; avril, mai, juin, août. — Particulièrement, *Milium multiflorum*; MARTORELL. — Vivant de plantes basses dans le voisinage des marais et dans les prairies humides; BERCE.
- congrua.** — Dans les prairies et les endroits herbeux; fin de l'automne; encore très petite sur les tiges de maïs où elle se tient cachée entre les feuilles; puis dans le courant de l'été.
- albipuncta.** — *Plantago major*, *Bromus mollis*, et autres Graminées à feuilles molles; avril et mai; reparait de nouveau pendant l'été. — En août, dit MARTORELL.
- lithargyria.** — *Alsine media*, *Plantago*, *Bromus pinnatus*; passe l'hiver; avril et mai. — En décembre, suivant MARTORELL. — En janvier; MERRIN.
- turca.** — Principalement *Briza media*, *Luzula vernalis*; les Graminées des bois, dans les tiges, passe l'hiver; se trouve février, mars et avril; se chrysalide en juin.

MITHYMNA

- imbecilla.** — *Gentiana*; et plusieurs plantes basses; juillet; se métamorphose commencement octobre.

GRAMMESIA

- trigrammica.** — *Plantago lanceolata*; de mai à octobre; croît lentement; passe l'hiver en société. — *Plantago major* et autres plantes, se cache le jour dans les racines; MERRIN.

STILBIA

- anomala.** — Vit exclusivement de Graminées; dans les clairières des bois; a toute sa grosseur dans le courant de février.

CARADRINA

- exigua.** — Plusieurs espèces de *Convolvulus* ; en automne ; BERCE. —
Sur le *Polygonum persicaria* ; suivant HMMIGHOFFEN. —
Champs de blé ; DAUBE.
- morpheus.** — *Convolvulus sepium* et plantes basses ; septembre et
octobre.
- quadripunctata.** — Plantes basses ; au printemps.
- fusicornis.** — *Scrophularia ramosissima* ; en juillet ; RAMBUR.
- Kadenii.** — Différentes plantes basses ; mars et avril ; BERCE.
- Germainii.** — Chrysalide au pied d'un Cyprès ; printemps.
- pulmonaris.** — *Pulmonaria angustifolia*. — GUÉNÉE pense qu'elle doit
vivre d'abord dans les chatons, d'où elle descend ensuite sur les
Pulmonaria ; au printemps.
- respersa.** — *Taraxacum dens-leonis* ; Graminées, Joubarbe blanche ;
BRUAND ; passe l'hiver sous des pierres ; au printemps, principa-
lement dans les pâturages secs ; se transforme fin avril.
- alsines.** — *Stellaria media*, *Plantago* et *Rumex*. — *Scabiosa* ; MAR-
TORELL. — Février et mars.
- superstes.** — *Stellaria media*, *Plantago* et *Rumex* ; février et mars.
- ambigua.** — *Plantago major*, *Urtica urens* et *V. dioica* ; s'élève bien
avec le *Stellaria media* ; mars.
- taraxaci.** — *Plantago*, *Rumex* et *Alsine* ; février et mars.
- lenta.** — Sur les plantes basses ; mai ; GUÉNÉE.
- pallustris.** — *Plantago* et autres plantes basses ; en juillet et août.
- arcuosa.** — *Aira caespitosa* ; mai ; MERRIN.

ACOSMETIA

- caliginosa.** — Sur les Graminées ; vit en hiver.

RUSINA

- tenebrosa.** — *Plantago lanceolata* ; les plantes basses, principalement
les *Viola* ; février et mars.

AMPHIPYRA

- tragopogonis.** — *Tragopogon*, *Spinacia oleracea*, *Rumex patientia*,

- Brassica oleracea*, *Serratula*; sur une multitude de plantes basses, sans en affectionner aucune; BERCE; en juin.
- tetra.** — *Alsine media*, FABRICIUS. — *Stellaria*, *Hieracium*; FREY.
- livida.** — *Taraxacum officinale* et différentes plantes basses.
- pyramidea.** — *Prunus domestica*, *Juglans regia*, *Cratægus oxyacantha*, *Salix alba*, *Quercus robur*, *Prunus spinosa*, *Ulmus campestris*, *Populus*; mai et juin.
- effusa.** — Les *Cytisus argenteus*, *candicans* et *spinosus*, *Daphne gnidium*, les *Erica arborea* et *scoparia*, *Lavatera olbia*, les *Cistus albidus*, *salvifolius* et *monspeliensis*; éclôt en décembre, passe l'hiver et se chrysalide fin avril.
- perflua.** — *Ulmus campestris*, *Prunus domestica*, *Quercus robur*, *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*; se chrysalide milieu de juillet.
- cinnamomea.** — Principalement sur l'*Ulmus campestris* et aussi sur le *Prunus spinosa*, *Populus* et peut-être *Quercus robur*; mai et juin. — Juin et juillet; DONZEL.

PERIGRAPHA

- cincta.** — Plusieurs espèces de *Rumex*; HUBNER. — Chenille glabre, d'un violet pâle, avec quatre lignes latérales et une dorsale jaune, la tête est fauve.

TÆNIOCAMPA

- gothica.** — *Lonicera xylosteum*, *Corylus avellana*, *Galium aparine*, *Medicago sativa*, *Rumex acetosa*. — *Genista*; BERCE. — en juin, juillet et octobre. — Mars et avril; MARTORELL.
- miniosa.** — *Quercus robur*; mai. — Vit en juin sur le *Thymus communis*, *Anemone stellata*, *Erica arborea*, etc.; MILLIÈRE.
- pulverulenta.** — *Quercus robur*, *Ulmus campestris*, *Tilia europæa*; juin et juillet.
- populeti.** — Les *Populus tremula*, *fastigiata* et *alba*; juin, juillet; MERRIN.
- stabilis.** — *Cerasus*, *Prunus*, *Quercus robur*, *Ulmus campestris*, *Alnus glutinosa*, etc.; mai et juin.
- gracilis.** — *Lysimachia vulgaris*, *Quercus robur* et différentes plantes basses; mai et juin.
- incerta.** — *Quercus robur*, *Amygdalus communis*, quelquefois *Cra-*

- tægus oxyacantha*. — Je l'ai trouvée et élevée sur le *Centaurea jacea*. — En mai; les auteurs indiquent juillet, août et septembre.
- opima**. — *Salix caprea*; juin. — *Quercus*; FREY.
- munda**. — *Quercus robur*; juin et juillet. — Polyphage : arbres fruitiers, Chêne, Hêtre, Peuplier, Tilleul; FREY.

PANOLIS

- piniperda**. — *Pinus sylvestris*, *P. abies*. — Les Pins et les Sapins; BERCE. — Mai, juin, juillet et août.

PACHNOBIA

- leucographa**. — *Plantago*; juin et juillet; MERRIN. — Aussi *Stellaria*, *Taraxacum*, Bruyères; FREY.
- rubricosa**. — *Fragaria vesca*, *Digitalis parviflora* et sur un grand nombre de plantes basses; juin et juillet. — Selon MILLIÈRE, sur diverses Anémones, le Ficaire à grandes fleurs, et une fois sur la Bruyère arborescente.

MESOGONA

- oxalina**. — Plantes basses; en captivité, jeunes pousses de *Salix*; à toute sa taille à la fin de mai.
- acetosellæ**. — Se nourrit de plantes basses et se cache pendant le jour; fin mai, commencement de juin. — *Quercus*; FREY.

DICYCLA

- oo**. — *Quercus robur*; elle se tient entre des feuilles reliées par de la soie à la manière des Micros; mai et juin.

CALYMNIA

- pyralina**. — *Ulmus campestris*, *Cratægus oxyacantha*, *Quercus robur*. — Pommier sauvage; BRUAND. — Septembre, mai. — En juin sur le Poirier; DONZEL.
- diffinis**. — *Ulmus campestris*; principalement ceux des routes; mai et juin.
- affinis**. — *Ulmus campestris*; principalement ceux des routes. — BRUAND dit dans les bois. — Mai.
- trapezina**. — *Quercus robur*, *Ulmus campestris*, *Tilia europæa*, *Fagus sylvatica*, *Acer campestre*, *Corylus avellana*, *Betula alba*, *Carpinus betulus*; mai et juin.

COSMIA

paleacea. — *Betula alba*, *Quercus robur*; juin.

abluta. — *Salix alba* et *Populus*; à toute sa taille fin mai.

DYSCHORISTA

suspecta. — *Betula alba*, *Populus*; mai; MERRIN.

fissipuncta. — *Populus* et *Salix*; *Acer campestre*, selon TREITSCHKE; se tient cachée le jour sous les Lichens et les Mousses; mai. — Juin; MILLIÈRE.

PLASTENIS

retusa. — *Salix* et *Populus*; mai et juin.

subtusa. — Les *Populus* et les *Salix*; entre les feuilles; mai et juin.

CIRRÆDIA

ambusta. — *Pyrus nivalis*, *Prunus domestica*; mai.

xerampelina. — *Fraxinus excelsior*; CONSTANT. — Aussi sur le Sycamore, pendant le jour se cache au pied, sous les feuilles sèches ou les mousses du tronc; avril, mai; se chrysalide en juillet.

CLEOCERIS

viminalis. — Les Saules, l'Osier, à l'extrémité des branches, entre les feuilles qu'elle roule et attache, avec des fils de soie; avril et mai.

ANCHOCELIS

lunosa. — Mange des Graminées, dans les endroits arides et élevés, se cache sous les pierres; en avril.

ORTHOSIA

ruticilla. — *Quercus ilex*, *Quercus suber*; mai et juin.

lota. — *Salix pentandra* et d'autres espèces de *Salix*; *Coriaria myrtifolia*, d'après MARTORELL; mai et juin.

macilenta. — *Plantago lanceolata*, *Alsine media*, *Fagus sylvatica*, probablement les *Salix*, les *Populus*; dans les mousses et les feuilles sèches, principalement au pied des *Fagus*; mai et juin.

cercellaris. — *Quercus robur*, *Populus tremula*, *Salix caprea*, *Rumex acetosa*; s'enterre. — LE ROI ne mentionne que les *Rumex*.

- helvola.** — *Quercus robur* ; s'enterre ; mai.
- pistacina.** — *Lychnis dioica* ; sur différentes plantes basses : Les *Rumex crispus, acetosa, patientia*, et quelquefois sur les *Ulmus campestris* qui bordent les routes ; avril, mai, juin. — *Pistacia lentiscus* et *Phillyrea angustifolia* ; en hiver et en automne ; MARTORELL.
- hæmatidea.** — *Rhamnus alaternus* ; en hiver.
- nitida.** — Différentes espèces de *Veronica, Primula officinalis*, et diverses plantes basses ; mars, avril, mai.
- humilis.** — *Triticum repens, Sonchus oleraceus* et plusieurs autres plantes herbacées ; mai et juin ; DONZEL.
- lævis.** — Vit, dit-on, sur le *Quercus robur* ; BERCE.
- litura.** — Les plantes basses ; se tient cachée le jour sous les feuilles sèches et les broussailles, surtout au pied des *Genista* ; en mai.

XANTHIA

- citrago.** — Vit en société sur le *Tilia microphylla*, dont elle mange les feuilles les plus basses. — *Tilia* en général ; BERCE. — Chatons de *Salix caprea* ; LE ROI. — D'après DONZEL, il faut mouiller les chrysalides pour qu'elles n'avortent pas. En mai et juin.
- sulphurago.** — *Acer campestre* ; mai.
- aurago.** — *Fagus sylvatica*, entre les feuilles qu'elle lie ensemble ; TREITSCHKE. — Sur les *Populus* ; ESPER ; mai.
- flavago.** — *Salix caprea*, suivant ESPER ; avril. — LE ROI ne détermine pas quel *Salix*, je suppose que dans le nord elle se prend ailleurs que sur le *Salix caprea*.
- fulvago.** — *Betula alba*, chatons du *Salix caprea* ; juin. — Avril, suivant GUÉNÉE.
- gilvago.** — Se nourrit de diverses plantes, mais elle préfère les jeunes pousses des *Populus, Ulmus campestris* ; en juin, dans les feuilles sèches et les broussailles.
- ocellaris.** — Bourgeons des Peupliers ; mai, juin ; LE ROI.

HOPORINA

- croccago.** — *Quercus robur* ; fin mai, commencement juin.

ORRHODIA

- fragariæ.** — Sur les plantes basses ; FREY.

- erythrocephala.** — Toutes les plantes basses, sous les feuilles sèches; mai.
- vau punctatum.** — *Cratægus oxyacantha*, *Prunus spinosa*, *Ribes uva-crispa*, *Brassica oleracea*; avril et mai.
- Daubei.** — *Buxus sempervirens*, dont elle ronge les jeunes pousses; se tient cachée; commencement mai.
- vaccinii.** — *Plantago media*, *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*, les *Rumex*, les *Alsine*, *Quercus robur*; assez commune au pied des Chênes, sous les mousses et les feuilles sèches; avril, mai, juin et juillet. — Suivant TREITSCHKE, dit DONZEL, sur les *Rubus* et *Vaccinium*.
- ligula.** — Les plantes basses dans sa jeunesse; *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*, *Erica vulgaris*; se cache le jour sous les feuilles sèches et sous les pierres; en mai.
- rubiginea.** — Toutes sortes d'arbres fruitiers sauvages, diverses plantes basses principalement les Chicoracées et le *Quercus robur*; mai, juin et juillet. — Mai; BERCE.
- Staudingeri.** — Chicoracées et *Plantago*; commencement de juin.

SCOPELOSOMA

- satellitica.** — *Quercus robur*, *Ulmus campestris*, *Cratægus oxyacantha*, *Rubus*; surtout au pied des Ormes, sous les feuilles sèches et les broussailles; a toute sa taille en juin.

SCOLIOPTERYX

- libatrix.** — Les *Salix* et les *Populus*; en été et en automne.

XYLINA

- semibrunnea.** — *Fraxinus excelsior*; mai.
- socia.** — *Quercus robur*, *Tilia europæa*, *Ulmus campestris*, *Prunus domestica*; mai et juin.
- furcifera.** — Les *Alnus glutinosa* et *viscosa*, *Betula alba*, *Quercus robur*, *Populus*; juin et juillet. — AVRIL; MERRIN.
- lambda.** — *Myrica gale*; mai et juin; MERRIN.
- ornitopus.** — *Quercus robur*, *Populus tremula* et plusieurs *Salix*; mai, commencement de juin.
- lapidea.** — Les *Juniperus virginica*, *sabina*, *cupressifolia* et *tamariscifolia*; les Cyprès horizontal et pyramidal; mai et juin.

Merckii. — *Alnus viscosa*; mai, se chrysalide en terre; RAMBUR.

CALOGAMPA

vetusta. — *Scabiosa succisa*, *Statice limonium*, les *Carex*, *Urtica dioica* et *Populus*; MERRIN; mai, juin et juillet.

exoleta. — *Urtica dioica*, sur un grand nombre de plantes de familles très éloignées tels que *Scabiosa succisa*, *Cucubalus behen*, *Ononis arvensis*, *Silene otites*, les *Genista*; juin et juillet. — AVRIL; MERRIN.

solidaginis. — *Vaccinium vitis idæa*, *Myrtillus*; on peut la nourrir à son défaut de *Pyrus malus*; à toute sa taille fin juin.

XYLOMYGES

conspicillaris. — Sur presque toutes les plantes, mange aussi des racines de Graminées, s'enterre en août. — Plantes basses, *Genista*; juin; BERCE.

SCOTOCHROSTA

pulla. — Sur les plantes basses en mai; TREITSCHKE.

ASTEROSCOPIUS

nubeculosus. — *Betula alba*, *Ulmus campestris*, *Quercus robur*, *Tilia europæa*, *Cratægus oxyacantha*, *Prunus spinosa*, *Populus tremula*, *Prunus cerasus*, etc.; BERCE; mai et juin; passe l'hiver en chrysalide.

sphinx. — *Quercus robur*, *Tilia europæa*, *Salix caprea*, *Fagus sylvatica*, *Prunus cerasus*, *Ulmus campestris*. — Se prend fréquemment sur le *Cratægus oxyacantha*, *Prunus spinosa*; BERCE. — Du 20 mai au 15 juin, selon DONZEL et moi; principalement sur l'*Ulmus campestris*.

DASYPOLIA

templi. — *Heracleum sphondylium*, tiges et racines; éclôt au printemps, acquiert pendant l'été son développement complet.

XYLOGAMPA

areola (lithoriza). — Les *Lonicera caprifolium*, *peryclymenum* et

principalement le *xylosteum*; juin et juillet. — Mars et avril; MARTORELL.

LITHOCAMPA

ramosa. — Les *Lonicera*, dans les montagnes; juillet et août.

Millierei. — *Lonicera xylosteum*; septembre et octobre. — En mai et septembre; MARTORELL.

EPIMECIA

ustula. — *Scabiosa leucantha*, dévore les fleurs; mai et août. — De juillet à septembre; MARTORELL.

CALOPHASIA

casta (opalina). — Les *Linaria* et l'*Antirrhinum majus*. — *Scabiosa*; MARTORELL. — Toute la belle saison; quelques-unes passent l'hiver.

platyptera. — *Lynaria vulgaris*.

lunula (linariæ). — Les *Linaria vulgaris*, *pelliceriana*, *repens*; juillet et milieu d'octobre. — Juin, juillet, puis août et septembre; BERCE.

GLEOPHANA

anterrhini. — *Linaria vulgaris*, *Euphorbia cyparissias*, *Scabiosa leucantha*, *Antirrhinum linaria*. — Les *Lonicera*; MARTORELL. croit qu'elle a deux générations; au printemps et en octobre. — A la mi-septembre.

serrata. — Sur plusieurs espèces de *Scabiosa*; en mai et juin.

CUCULLIA

verbasci. — Les *Verbascum thapsus*, *phlomoides*, *lychnitis* et *nigrum*, les *Scrophularia canina* et *aquatica*; depuis le mois de mai jusque vers la fin d'août.

scrophulariæ. — Les *Scrophularia aquatica* et *nodosa*, quelquefois *Verbascum blattaria*; juillet et août.

lychnitis. — Les *Verbascum lychnitis*, *pulverulentum*, *nigrum*, *phlomoides* et *sinuatum*; fleurs et fruits; juillet et août; RAMBUR. — Juillet, août et septembre; BERCE.

(*Var.*) **rivularum.** — Exclusivement sur les *Scrophularia*; en juillet et

- dans les endroits humides. — Le type sur les terrains pierreux arides et élevés ; GUÉNÉE.
- thapsiphaga.** — *Verbascum thapsus*, *Scrophularia canina*, *Verbascum lychnitis* ; en juin et août ; GUÉNÉE.
- scrophulariphaga.** — *Scrophularia ramosissima* ; se cache souvent au bas des tiges sous les feuilles inférieures ; mai, juin.
- blattariæ.** — Les *Scrophularia canina* et *ramosissima*, les *Verbascum lychnitis*, *thapsus* et quelques autres espèces rameuses, quelquefois le *Scrophularia aquatica* ; aime surtout les fleurs et les fruits ; juin, juillet, août.
- asteris.** — *Solidago virgaurea*, les *Aster* et différents *Chrysanthemum* sauvages et cultivés ; juillet, août, septembre.
- balsamitæ.** — Sur un *Hieracium* ; en mai ; GUÉNÉE.
- umbratica.** — Les *Sonchus oleraceus* et *arvensis*, *Peucedanum*, *Campanula*, *Cichorium* ; depuis juillet jusqu'en septembre.
- lactucæ.** — *Lactuca sativa*, *Lampsana communis*, Les *Sonchus arvensis* et *oleraceus*, *Prenanthes muralis*. — Je l'ai surtout remarquée sur les *Sonchus arvensis* et *oleraceus*, dans les vignes ; depuis juillet jusqu'en septembre.
- lucifuga.** — *Prenanthes purpurea* ; août ; BOISDUVAL, RAMBUR et GRASLIN. — Vit sur les Chicoracées ; DONZEL.
- campanulæ.** — *Matricaria chamomilla* ; a toute sa taille en août. — *Campanula rotundifolia* ; FREY.
- santolinæ.** — Les *Artemisia arborea* et *campestris* ; juin, juillet et avril.
- chamomillæ.** — *Matricaria chamomilla*, les *Anthemis cotula*, *arvensis* et *nobilis*, les *Chrysanthemum* ; avril et en juin. — Juin, juillet et premiers jours d'août, sur les fleurs ; BERCE.
- anthemidis.** — De la mi-septembre à fin octobre, *Aster acris* ; passe souvent deux ans en chrysalide ; MILLIÈRE.
- tanaceti.** — *Tanacetum vulgare*, les *Artemisia absinthium*, *vulgaris* et *abrotanum*, *Matricaria chamomilla*, *Parthenium*, *Achillea millefolium* ; a toute sa taille en août et septembre.
- santonici.** — *Artemisia absinthium* ; BOISDUVAL.
- xeranthemi.** — *Aster acris* ; MILLIÈRE.
- gnaphali.** — Sur les même plantes que le *C. asteris* ; principalement *Solidago virgaurea* ; courant juillet et dans le commencement du mois d'août.
- scopariæ.** — *Artemisia scoparia*.

- artemisiæ.** — Les *Artemisia abrotanum*, *absinthium*, *campestris*, les *Matricaria chamomilla*, et *dracunculus*; ne mange que les fleurs; en août.
- absinthii.** — Les *Artemisia absinthium* et *vulgaris*; mange les fleurs; en automne.
- formosa.** — *Artemisia camphorata*.
- argentea.** — *Artemisia campestris*; depuis juillet jusqu'en septembre.
- argentina.** — Vit sur diverses espèce d'Absinthe dans les steppes; GUÉNÉE.

EURHIPIA

- adulatrix.** — Les *Pistacia terebinthus* et *lentiscus*; mai à novembre et même décembre.

CALPE

- capucina.** — Les *Thalictrum flavum*, *minus* et *angustifolium*; dévore les fleurs; mai, juin, juillet. — BERCE indique seulement le mois de mai.

TELESILLA

- amethystina.** — *Peucedanum officinale*; juillet et août.

PLUSIA

- triplesia.** — *Urtica dioica*, *Humulus lupulus*; GUILLEMOT; juillet, août, septembre et octobre. — Juillet et octobre; BERCE.
- asclepiadis.** — *Asclepias vincetoxicum*; ne mange que la nuit; en juillet.
- tripartita.** — *Asclepias vincetoxicum*; juillet et août. — En juillet et en octobre sur les *Urtica*; BERCE.
- c. aureum.** — Les *Thalictrum aquilegifolium* et *flavum*; mai et juin.
- moneta.** — Les *Aconitum lycoctonum* et *napellus*, les *Helianthus tuberosus* et *annuus*, *Arctium lappa*, *Cucumis sativa*; en juillet.
- cheiranthi.** — *Thalictrum flavum*; avril et mai.
- uralensis.** — *Aconitum anthora*; a toute sa taille fin juin.
- illustris.** — Les *Aconitum lycoctonum* et *anthora*, *Thalictrum aquilegifolium*; a toute sa taille en juin.
- modesta.** — *Pulmonaria angustifolia*, *Arum maculatum*; avril et mai.
- chrysitis.** — *Urtica dioica*, *Lamium album*, *Galeopsis tetrahit*, *Arctium lappa*; de mai à septembre.

- chryson.** — *Eupatorium cannabinum* ; juin et juillet.
- bractea.** — *Eupatorium cannabinum* ; mai, juin ; MERRIN. — *Hieracium pilosella*, *Taraxacum* et *Picris hieracioides* ; WULLSCHLEGEL.
- festuca.** — *Festuca fluitans*, *Iris pseudo-acorus*, *Sparganium ramosum*, *Arundo phragmites*, *Carex riparia*. — LE ROI n'indique que *Carex*. — En juin et juillet.
- accentifera.** — Diverses *Mentha* : *M. aquatica*, *insularis* ; depuis janvier et février, jusqu'à la fin de l'année.
- gutta.** — Les *Urtica*. — Une grande partie de l'année sur les *Mentha* ; MARTORELL.
- chalcytes.** — *Parietaria officinalis*, les *Urtica dioica* et *wrens*, *Cytisus argenteus*, les *Solanum nigrum* et *dulcamara*, *Lycopersicum esculentum* ; pendant neuf ou dix mois de l'année. — En Espagne, particulièrement le *Solanum miniatum*.
- iota.** — Les *Urtica dioica* et *wrens*, les *Lamium album* et *hirsutum*, *Arctium lappa*, *Galeobdolon luteum*, les *Lonicera periclymenum* et *caprifolium*, *Senecio vulgaris* ; avril, juin et juillet.
- pulchrina.** — Les *Lonicera* ; avril, juin et juillet.
- gamma.** — *Urtica dioica*, *Lamium album*, et sur presque toutes les plantes basses ; premier printemps jusqu'en automne.
- circumflexa.** — Plantes basses.
- Daubei.** — *Sonchus maritimus* ; en captivité avec les *Chicoracées*.
- ni.** — Est polyphage ; peu connue.
- interrogationis.** — *Urtica wrens* ; mai et juin. — *Vaccinium uliginosum* ; FREY.
- devergens.** — GUÉNÉE suppose que la chenille est polyphage.

ANOPHIA

- leucomelas.** — *Convolvulus sepium* et la plupart des *Convolvulus* spontanés de la Provence, fleurs et feuilles ; MILLIÈRE ; en mai. — Avril et mai, juillet à décembre, suivant MARTORELL.

CEDIA

- funesta.** — *Convolvulus sepium*.

AMARTA

- myrtilli.** — Les *Vaccinium myrtilloides* et *uliginosum*, les *Erica vulgaris*

et *tetralix*; depuis juin jusqu'à octobre. Ces dernières passent l'hiver.

cordigera. — *Vaccinium uliginosum*; août.

HELIACA

tenebrata. — *Cerastium arvense*, mange les capsules; juin.

HELIOTHIS

cognatus. — *Prenanthes purpurea*.

cardui. — *Jacobæa vulgaris*, *Picris hieracioides* et plusieurs *Chicoracées*; juillet et août.

ononis. — *Ononis spinosa*, *Salvia pratensis*; vit en été.

dipsaceus. — *Rumex acutus*, les *Dipsacus fullonum*, *arvensis* et *pilosus*, *Cichorium intybus*, les *Centaurea nigra*, *jacea*, *scabiosa* et *calcitrapa*, les *Plantago major*, *media* et *lanceolata*, *Lychnis dioica*, *Silene inflata*, *Cucubalus baccifer*; mars, juin, août et septembre. — Principalement les *Linaria*; BERCE.

maritimus. — *Spergularia marina* et *S. media*; juillet et août; BERCE.

scutosus. — *Artemisia campestris*; commencement de mai à la mi-juin; fin août à mi-septembre.

peltiger. — *Hyosциamus niger*; STAINTON. — *Senecio viscosus*; BELLIER DE LA CHAVIGNERIE et GUILLEMOT. — *Ulex europæus*; TRIMOULET. — *Salvia pratensis*; carnassière. — Juin et juillet. — Sur diverses plantes basses, principalement *Bellis sylvestris*, à Hyères; novembre, décembre; DONZEL. — A Lyon, se prend sur le Souci des jardins; AUSTAUT.

armiger. — *Plantago*, *Cucurbita*, *Nicotiana*, *Medicago*, *Cannabis sativa*, *Zea Mâis*, *Ulex europæus*, *Reseda lutea*; STAINTON. — Sur une multitude de plantes basses; DONZEL. — Août, septembre et octobre. — *Inula viscosa*; avril, mai et août; MARTORELL.

incarnatus. — La larve est figurée dans MENETRIES.

CHARICLEA

delphinii. — Les *Delphinium consolida*, et *Ajacis*, *Aconitum napellus* et *A. lycoctonum*, dont elle mange les fleurs et surtout les fruits; très carnassière; de juin à fin septembre.

victorina. — Sur la semence d'un *Salvia*; au mois de juin; J. LEDERER.

umbra. — *Ononis spinosa*, *Geranium pratense*, les *Ononis repens* et *arvensis*, *Robinia hispida*, fleurs et boutons ; fin juillet et août.

XANTHODES

malva. — *Lavatera olbia*, *Malva officinalis* et *M. moschata* ; la génération d'été en mai, opère rapidement sa transformation ; la génération d'automne se chrysalide quelquefois avant l'hiver.

Graelsii. — Les *Lavatera*, principalement le *L. olbia*, se métamorphose en août.

EUTERPIA

laudeti. — *Silene otites* ; juin. — *Silene otites*, variété *volgensis*, Spr. ; en juillet ; LEDERER. — *Gypsophila* et *Silene* ; FREY.

ACONTIA

arania. — Se tient en repos sur la surface supérieure des feuilles d'une *Althæa* ; J. LEDERER.

lucida (solaris). — Plusieurs espèces de *Trifolium* et *Chenopodium*, *Taraxacum dens-leonis*, les *Convolvulus* ; en juin et septembre. — Les Malvacées ; fin juillet ; MILLIÈRE.

luctuosa. — *Plantago major*, les *Convolvulus*, les *Malva* ; mai et juin.

viridisquama. — Sur une Malvacée ; juillet ; DE GRASLIN.

THALPOCHARES

Dardouini. — Dans les capsules de l'*Anthericum ramosum* ; FREY.

lacernaria. — Vit sur les *Phlomis*, dont elle lie les feuilles ; GUÉNÉE.

hansa. — HABERHAUER a découvert, dit LEDERER, la chenille de cette espèce sur un *Echinops* ; elle est adulte fin juin.

ostrina. — La chenille vit sur les *Carlina* et autres plantes analogues ; MARTORELL.

parva. — Réceptacle des *Inula montana* et *viscosa*, *Centaurea calcitrapa* ; octobre et novembre.

paula. — *Gnaphalium dioicum* ; TREITSCHKE.

helychrysi. — *Helichrysum angustifolium*, se tient à l'extrémité des tiges ; avril, juin et juillet ; RAMBUR.

Himmighoffeni. — HIMMIGHOFFEN suppose qu'elle doit vivre sur quelques plantes basses, telles que *Plantago*, *Helychrysum* ou *Scabiosa*.

ERASTRIA

- argentula.** — Différentes espèces de Graminées; en mai; DUPONCHEL.
— Août et septembre; BERCE. — Juillet; catalogue de Belgique.
- uncula.** — *Carex*, dans les prés humides; en août. — *Cyperus* et différentes espèces de *Carex*; FREY.
- obliterata.** — Les *Artemisia cœrulescens* et *absinthium*; a tout son développement fin juin.
- venustula.** — *Corylus avellana*, *Quercus robur*, *Prunus spinosa*, *Juniperus communis*; août.
- scitula.** — Vivrait, selon Himmighoffen, sur les pêchers; MILLIÈRE.
- numerica.** — *Santolina*; juillet. — De mai à juillet, sur des plantes aromatiques; BERCE.
- deceptorica.** — Sur différentes plantes basses et arbustes; juillet, août.
- fasciana.** — Différents *Rubus*, se chrysalide au milieu de mai; DUPONCHEL. — En août et septembre; BERCE.

AGROPHILA

- trabealis.** — *Convolvulus arvensis* et *C. sepium*; juillet et août.

HÆMEROSIA

- renalis.** — *Chondrilla juncea*, les *Lactuca sativa*, *ramosissima*, *fœtida* et *sylvestris*; mange les étamines; fin septembre et octobre; MILLIÈRE, DAUBE.

METOPONIA

- Kækeritziana.** — Sur les *Delphinium*, dans les lieux secs; juillet et août; GUÉNÉE.

MEGALODES

- eximia.** — *Althæa*, boutons des fleurs; adulte depuis la fin de juin jusqu'à la mi-juillet; se chrysalide sous terre; JULIEN LEDERER.

METOPTRIA

- monogramma.** — Dans les fleurs du *Psoralea bituminosa*; se transforme à la fin de juillet.

EUCLIDIA

- mi.** — Différentes espèces de *Trifolium*, *Medicago*, *Ononis spinosa* — *Myrica gale*; GOOSSENS; juin, août et septembre. — Juillet et août; BERCE.
- glyphica.** — *Trifolium*. — Différentes espèces de *Trifolium* et sur l'*Ononis spinosa*; juin, août et septembre; BERCE. — Se chrysalide fin juillet et fin septembre.

CEROCALA

- scapulosa.** — *Helianthemum halimifolium* et sa variété *sanguineum*; à la fin d'avril et à la fin de juillet elle a acquis toute sa grosseur.

PERICYMA

- albidentaria.** — Vit sur une plante épineuse qui doit être ou un *Ulex* ou un *Genista*; printemps.

LEUCANITIS

- Callino.** — *Salix viminalis*; fin septembre.
- stolida.** — *Rubus*, d'après DAHL; chenille peu connue. — Se nourrit des feuilles du *Quercus* et du *Coriaria myrtifolia*; en juillet; MARTORELL.

GRAMMODES

- bifasciata.** — *Polygonum persicaria* et aussi *Cystus salvifolius*; MARTORELL; depuis fin mai jusqu'en décembre. — D'après GUÉNÉE, le *Smilax* et les *Rubus*.
- algira.** — *Rubus*, *Salix* et *Punica granatum*; MILLIÈRE ne l'a jamais rencontré que sur la Ronce des haies. — De juin en août et fin octobre.

PSEUDOPHIA

- illunaris.** — Sur les *Tamarix*, le *T. gallica* principalement; septembre, octobre et novembre; on la rencontre aussi dès la mi-juillet à sa taille.
- lunaris.** — *Quercus robur* et aussi sur le *Populus tremula*; juillet, TREITSCHKE. — Juin, juillet; DONZEL.

tirrhæa. — Les *Pistacia terebinthus* et *lentiscus*, *Rhus coriaria*, *Cratægus oxyacantha*; milieu de septembre et octobre. — Elle vit à Hyères, en été, en automne et même en hiver; DONZEL.

CATEPHIA

alchymista. — *Quercus robur*, *Ulmus*; en août.

CATOCALA

fraxini. — *Fraxinus excelsior*, *Populus tremula* et *P. fastigiata*, *Ulmus campestris*, *Betula alba*, *Corylus avellana*, *Acer campestre*, *Castanea vulgaris*; quelquefois sur les *Salix* d'après BERGE; commencement de juillet jusqu'à la fin d'août.

elocata. — Les *Populus alba*, *nigra* et *fastigiata*; BERGE indique les *Salix* et les *Populus*. — Pour moi, je ne l'ai jamais trouvée sur les *Salix*; juin et juillet.

nupta. — *Salix alba*, *Ulmus campestris*, *Populus*; mai et juin.

dilecta. — *Quercus robur*.

sponsa. — *Quercus robur*; mai et juin; DONZEL et GODART. — Avril; MERRIN.

promissa. — *Quercus robur*; mai.

conjuncta. — *Quercus robur*; mai.

pacta. — *Salix cinerea*.

optata. — *Salix caprea* et *S. viminalis*; se chrysalide vers la fin de juillet.

electa. — Les *Salix alba*, *caprea*, *viminalis* et *vitellina*, *Tilia europæa*, *Populus fastigiata*; juin et juillet.

puerpera. — *Salix incana* et *S. helix*; MILLIÈRE; en juin.

neonympha. — Chenille sur le *Glycyrrhiza*; LEDERER. — En juin, sur la réglisse; GUÉNÉE.

nymphæa. — Les *Quercus ilex*, *suber* et *coccifera*; mai, juin; DONZEL. — MILLIÈRE suppose qu'elle vit sur l'Olivier.

paranympha. — *Prunus insititia*, *Berberis vulgaris*, *Prunus spinosa*; se métamorphose commencement de juin. — D'après BERGE, vit en mai sur le *Prunus spinosa* et sur le *Cratægus oxyacantha*; DONZEL.

hymenæa. — *Prunus spinosa*; selon TREITSCHKE.

conversa. — Il est probable qu'elle vit sur le *Quercus robur*; BERGE.

diversa. — *Quercus robur*; mai.

nymphagoga. — *Quercus ilex* et *Q. suber*; mai.

SPINTHEROPS

spectrum. — *Genista pilosa* et *G. juncea*; principalement sur ce dernier; a toute sa taille en mai.

cataphanés. — *Ulex europæus*; BERCE. — *Genista purgans*; MILLIÈRE; en juillet. — En mai suivant BERCE.

dilucida. — Vit sur le *Genista*; en juin; MARTORELL. — *Hipocrepis comosa*, *Onobrychis* et *Medicago*; FREY.

EXOPHILA

rectangularis. — Chenille sur les arbrisseaux de *Celtis*; J. LEDERER.

TOXOCAMPA

lusoria. — *Astragalus glycyphyllos*, *Vicia racica*; mai, juin et juillet; DONZEL.

pastinum. — *Vicia cracca*; en mai; GUÉNÉE. — *Astragalus* et *coronilla*; FREY.

viciæ. — *Vicia dumetorum*; mai, juin et septembre; GUÉNÉE.

cracciæ. — Les *Vicia cracca*, *multiflora*, *sativa*; mai et juin. — Le Plantain et les Légumineuses; MARTORELL. — Juin et juillet; DONZEL.

limosa. — *Vicia cracca*, *Coronilla varia*; avril, mai et septembre; GUÉNÉE.

AVENTIA

flexula. — *Lichen stellaris* et *L. parietinus*, principalement Lichen des Hêtres; avril, mai et juin. — Lichens des *Prunus* et *Cratægus*; FREY.

BOLETOBIA

fuliginaria. — Plusieurs espèces de Mousses, principalement le *Bryum murale*, *Lichen parietinus*, bois pourri; a toute sa taille à la fin de juin. — Sur les Bolets secs qui croissent sur le bois pourris, et, dit-on, sur certains Lichens; en juillet; GUÉNÉE.

HELIA

calvaria. — *Rumex acutus* et *R. obtusifolius*, au pied des arbres; mai et juin. — Sur les Saules et les Peupliers; FREY.

NODARIA

nodosalis. — Est polyphage; fin septembre, octobre.

ZANCLOGNATHA

tarsiplumalis. — Polyphage; sur les plantes basses; FREY.

grisealis. — *Chrysosplenium alternifolium*; on l'éleve aussi avec le *Galium album* et le *Rumex acetosa*. — *Betula alba*; FOUARD. — Se transforme à la fin de mai.

tarsipennalis. — Framboisier? mange volontiers le *Polygonum aviculare* et le Saule; depuis août jusqu'en avril; MERRIN.

emortualis. — Feuilles sèches des Chênes; DE TISCHER. — D'après TREITSCHKE, les Lichens du Chêne; en septembre et octobre.

MADOPA

salicalis. — *Salix triandra*, et *S. caprea*; différentes espèces de *Salix*; se transforme commencement juin.

HERMINIA

cribrumalis. — *Salix*, *Carex sylvatica*, *Luzula pilosa*; depuis août à avril; MERRIN.

crinalis. — *Rubia peregrina*; en captivité se nourrit de *Rubus*, *Lonicera*, *Rosa* et *Quercus*; passe l'hiver et se transforme en mars.

tentacularia. — Sur les *Hieracium*; FREY.

derivalis. — Chenilles dans les bois, parmi les feuilles des chênes morts; depuis août à avril; MERRIN.

PECHYPOGON

barbalis. — *Quercus robur*, chatons du *Betula alba*; septembre et octobre; passe l'hiver, et à la mi-mars a toute sa taille.

BOMOLOCHA

fontis. — *Erica vulgaris*, *Urticaurens*, *Solidago virgaurea*; de juillet à septembre. — *Vaccinium myrtillus*; FREY.

HYPENA

lividalis. — Entre les feuilles de *Parietaria diffusa*; presque toute l'année; MARTORELL.

- rostralis.** — *Humulus lupulus*, *Urtica urens*. — *Humulus lupulus*, mais jamais sur l'*Urtica*; GUÉNÉE. — A toute sa taille en juin et en septembre.
- proboscidalis.** — *Urtica urens* et *U. dioica*, *Plantago lanceolata*; commencement de mai et en juillet.
- obesalis.** — Suivant FREYER, sur l'*Urtica*.

HYPENODES

- costæstrigalis.** — *Thymus serpyllum*; juillet et août; MERRIN.

RIVULA

- sericealis.** — *Urtica* et différentes plantes qui bordent les fossés et les marais; se métamorphose commencement de juin.

BREPPOS

- parthenias.** — *Betula alba*, *Quercus robur*, *Castanea vulgaris*, *Fraxinus excelsior*, *Fagus sylvatica*; juin et juillet.
- nothum.** — *Betula alba*, *Populus tremula*; commencement juin. — Selon BERCE, elle a les mêmes mœurs que le *B. parthenias*. — La variété *Touranginii* vit sur le *Salix monandra*. — *Salix caprea*, *Populus tremula*; en juin; DONZEL.
- puella.** — La chenille, selon TREITSCHKE, vit sur le *Populus tremula*.

GEOMETRÆ

PSEUDOTERPNA

- pruinata.** — *Spartium scoparium*; fin mai, commencement de juin. — *Cytisus spinosus*, *Genista scoparia* et *G. tinctoria*; suivant MILLIÈRE. — Elle vit, d'après DONZEL, sur un grand nombre de Légumineuses arborescentes, principalement, *Spartium scoparium*; se transforme entre des feuilles.
- coronillaria.** — *Cytisus laniger* et *C. spinosus*; RAMBUR. — *Coronilla*; MARTORELL. — *Ulex europæus*; TRIMOULET. — *Genista scoparia*; MAURICE SAND. — Avril et mai.
- corsicaria.** — *Genista scoparia* et *G. corsica*; mars et juin. — RAMBUR ne l'a prise que sur le *Genista corsica*.

GEOMETRA

- papilionaria.** — *Betula alba*, *Alnus glutinosa* et *A. viscosa*, *Fagus sylvatica*, *Corylus avellana*, *Spartium scoparium*; mai et juin, août et septembre.
- vernaria.** — *Clematis vitalba*, *Quercus robur*, les *Prunus spinosa*, *domestica* et *armeniaca*; mai et septembre.

PHORODESMA

- pustulata.** — *Quercus robur*; dans un fourreau composé de débris de feuilles; elle le quitte arrivée au tiers de sa taille; se chrysalide fin mai.
- smaragdaria.** — L'abbé FETTIG a élevé la chenille sur l'*Achillea millefolium*; ESPER l'a représentée sur cette plante. — *Rubus*; TRIMOULET. — Mai.

EUCROSTIS

- herbaria.** — Les *Teucrium capitatum*, *flavescens*, et *polium*; avril, mai, juin et juillet; MILLIÈRE.
- aureliaria.** — Éclôt dès le mois d'octobre, a tout son développement courant ou fin mars; vit sur les *Phillyrea angustifolia* et *media* et sur l'Olivier.
- indigenata.** — *Euphorbia spinosa*, *E. cyparissias*, et probablement d'autres espèces d'*Euphorbia*; se transforme fin avril pour la première génération et en octobre pour la seconde.

NEMORIA

- viridata.** — *Rubus fruticosus*, *Crataegus oxyacantha*, *Quercus robur*, *Corylus avellana*, *Ononis spinosa*; mange les fleurs de préférence aux feuilles. La chenille vit en automne. — Juillet et octobre; BERCE. — En juin et septembre; DONZEL.
- porrinata.** — Sur les *Crataegus*, *Corylus* et *Rubus*; FREY.
- pulmentaria.** — Sur plusieurs espèces d'Ombellifères: *Bupleurum*, *Seseli*, *Anthriscus*, *Fœniculum*, *Lotus hispidus*; vit en automne, se chrysalide en juillet.
- faustinata.** — *Rosmarinus officinalis*, sur les fleurs seulement; passe l'hiver, se transforme fin mars ou commencement avril.

strigata. — *Quercus robur* et plusieurs espèces d'arbres, *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha* ; mai et juin.

THALERA

fibrialis. — *Buplevrum falcatum*, *Cratægus oxyacantha*, *Betula*, *Prunus spinosa* ; *Euphorbia cyparissias* d'après GUÉNÉE ; se chrysalide en juin.

JODIS

putata. — Chenille sur le Chêne et divers autres arbres ; LE ROT. — Sur le Charme, l'Aulne, l'Airelle ; DONZEL.

lactearia. — *Carpinus betulus*, *Alnus glutinosa* et *A. viscosa*, *Vaccinium myrtillus*, *Quercus robur* ; se chrysalide en août. — Août et septembre ; GUÉNÉE.

ACIDALIA

pygmæaria. — Juin et juillet.

trilineata. — *Vicia dumetorum*, FABRICIUS. — DONZEL croit qu'elle vit sur le *Genista purgans* et *G. cinerea*. — A toute sa grosseur fin mai.

flaveolaria. — Plantes basses ; mars, avril, mai.

perochraria. — *Festuca duriuscula*.

ochrata. — Plantes basses : Composées, Radiées, Crucifères, Borragnées *Festuca duriuscula* ; éclôt en juillet, se chrysalide à fin juin.

macilentaria. — *Plantago lanceolata*, *Achillea millefolium* ; a toute sa taille commencement de mai.

rufaria. — Sur les *Stellaria* et diverses plantes basses ; FREY.

mediaria. — *Euphorbia spinosa*. — DE GRASLIN l'a élevée sur un *Ulex*. — Éclôt fin de l'été ; a toute sa grosseur les premiers jours de juin.

moniliata. — Les *Vicia*, les *Leontodon*, les *Borrago* et autres plantes herbacées ; passe l'hiver et n'est parvenue à tout son développement que vers la fin de mai.

alyssumata. — En mai ; polyphage, en captivité ; dans la nature, semble vivre spécialement de *Centaurea aspera*.

muricata. — *Plantago major*. — *Euphorbia* ; l'abbé FETTING. — A

- toute sa taille à la fin de juin. — Depuis août jusqu'en mars;
MERRIN.
- dimidiata.** — Fleurs d'*Anthriscus sylvestris*, *Taraxacum dens-leonis*; MERRIN. — Mai; AUDOUIN.
- contiguaria.** — Est polyphage, préfère le *Polygonum aviculare*. — *Sedum*, FREY. — L'abbé FETTIG dit qu'on l'élève avec le *Galium mollugo*. — Se chrysalide en automne; passe l'hiver et a atteint son développement seconde quinzaine de mai.
- Cervantaria.** — Vit de plantes basses, principalement l'*Alyssum calycinum*; en captivité : *Alyssum maritimum*; atteint toute sa grosseur à la mi-avril.
- sodaliaria.** — La chenille se nourrit de diverses plantes, telles que : Boraginées, Composées, Galiums. — Sur les *Genista*, surtout le Chêne vert; septembre à novembre; MARTORELL.
- nexata.** — Polyphage, a été élevée sur le *Linaria organifolia*; mai et juin.
- virgularia.** — Les *Rhamnus*, *Viburnum*, *Cytisus*, *Cratægus*, *Rubus*, *Pistacia lentiscus*; en avril. — Vit pendant presque toute l'année, s'accommode de mousses et de feuilles sèches; BERCE.
- straminata.** — Polyphage, préfère les feuilles. — Se nourrit des feuilles et des fleurs de beaucoup de plantes basses; l'hiver, se contente de feuilles sèches; BERCE. — Février, mars.
- subsericeata.** — Se nourrit très bien avec *Polygonum aviculare*; juillet; MERRIN; sort de l'œuf en juillet, passe l'hiver et parvient à toute sa taille au mois d'avril.
- lævigaria.** — Les *Galium*, *Chrysanthemum* et une *Gypsophila*; est polyphage, passe l'hiver, se chrysalide fin mars.
- obsoletaria.** — Est polyphage; éclôt fin juillet et n'a son entier développement que commencement mai. — Vit depuis février jusqu'en juin; BERCE.
- helianthemata.** — Polyphage, semble préférer les fleurs aux feuilles, passe l'hiver, et, vers les premiers jours de juin, elle a acquis son entier accroissement.
- ostrinaria.** — Préfère l'*Heliotropium europæum* et l'*Erica vulgaris*; passe l'hiver et se chrysalide en mai.
- circuitaria.** — Feuilles desséchées de l'*Osyris*, *Clematis*, *Rubus*; on la trouve en automne; mais il ne convient de la chercher qu'au printemps.

- herbariata**. — *Juniperus communis*, *Betula alba*; vit dans les herbiers; BERCE. — A toute sa taille en mai et juin.
- calumetaria**. — Les *Dorycnium*; vit en hiver.
- Zephyrata**. — Polyphage; se transforme vers le commencement de mai.
- bisetata**. — Vit sur différentes espèces d'arbres et d'arbustes, passe l'hiver; BERCE. — *Taraxacum*, *Polygonum aviculare*; depuis août en avril; MERRIN.
- trigeminata**. — *Anthriscus sylvestris*, fleurs de *Taraxacum*; MERRIN. — Chenille éclôt en août, hiverne et se chrysalide fin avril.
- belemiata**. — Vit sur plusieurs plantes basses, passe l'hiver, ne grossit visiblement qu'à partir d'avril.
- politata**. — Se nourrit d'un grand nombre de plantes basses, vit depuis le mois de juillet et se transforme courant mai, premiers jours de juin.
- filicata**. — Se nourrit des fleurs de *Dianthus*, *Veronica anagallis*; vit tout l'été et jusqu'à novembre; MARTORELL.
- rusticata**. — Polyphage; se chrysalide sous forme de coque; a toute sa taille du 15 au 20 août; la deuxième génération passe l'hiver en chenille.
- humiliata**. — Est polyphage, se nourrit avec les *Rumex*, les *Taraxacum*, les *Veronica* et autres plantes basses; passe l'hiver, arrive à toute sa grosseur en mai.
- dilutaria**. — Est polyphage, préfère l'*Anagallis arvensis*, plantes fanées; se métamorphose commencement mai.
- Vesubiata**. — Vit sur les plantes basses, et se métamorphose au printemps; MILLIÈRE.
- holosericeata**. — *Helianthemum vulgare*, flétri; juillet à mai; MERRIN.
- circellata**. — Se nourrit très bien avec le *Polygonum aviculare*; août; MERRIN.
- agrostemmata**. — Capsules de l'*Agrostemma dioica*.
- degeneraria**. — *Betonica officinalis*, a été élevé sur *Scabiosa*, *Achillea*, *Convolvulus*. — *Polygonum aviculare*, *Rubus fruticosus*, *Cerasticum*, *Veronica*; MERRIN. — Passe l'hiver et n'acquiert toute sa grosseur qu'en avril suivant. — BERCE ajoute: et en juillet.
- inornata**. — Plantes basses et aussi *Populus* et *Salix*; août; MERRIN. — *Rumex*; FREY.
- aversata**. — *Spartium scoparium*, *Geum urbanum*; très commune

- dans les broussailles, dit GUÉNÉE. — *Primula vulgaris*, *Corylus avellana*, *Ribes uva-crispa*; avril; MERRIN. — A toute sa taille en juin.
- emarginata.** — *Convolvulus arvensis*, *Galium verum*; se chrysalide entre les feuilles de la plante; juin.
- immorata.** — *Erica vulgaris*.
- rubiginata.** — *Vicia cracca*, *Convolvulus arvensis*, *Polygonum aviculare*; paraît au moins trois fois dans l'année. — *Lotus corniculatus*, *Medicago lupulina*, *Thalictrum minus*, *Taraxacum*; MERRIN.
- marginepunctata.** — *Vicia cracca*, *Achillea millefolium*; mai et juin. — *Sedum*; FREY.
- confinaria.** — Diverses plantes basses; se métamorphose en septembre.
- luridata.** — *Linaria cymbalaria*. — *Silene inflata* dont elle mange les feuilles; en mai; DE GRASLIN. — Passe l'hiver et arrive à toute sa taille au milieu d'avril.
- Isabellaria.** — *Alyssum maritimum*; préfère les fleurs; a toute sa taille en juillet.
- submutata.** — *Thymus vulgaris*, quelquefois *Dorycnium*. — Passe l'hiver, parvient à toute sa taille vers le milieu ou la fin d'avril et en juillet.
- incanata.** — Se nourrit de diverses plantes herbacées, s'enfonce en terre fin juin. — *Dianthus*, *Lychnis*, *Thymus*; FREY.
- Vesubiata.** — Polyphage, n'a acquis son entier développement qu'à la fin de mai.
- fumata.** — Bruyère; d'août en avril; MERRIN. — *Vaccinium myrtillus*; FREY.
- remutaria.** — *Vicia sepium*; commencement de juin; TREITSCHKE. — Plantes basses? *Polygonum aviculare*; depuis août à avril; MERRIN. — En mai; BERCE.
- punctata.** — *Quercus robur*, *Melilotus officinalis*, *Hippocrepis comosa*; forme leur cocon fin mai, commencement juin; MILLIÈRE.
- caricaria.** — Polyphage; on la nourrit plus spécialement avec la *Centaurea jacea*, *Artemisia vulgaris* et *A. campestris*; les unes arrivent à toute leur taille commencement novembre, le plus grand nombre en mars suivant.
- immutata.** — Chicoracées, *Artemisia campestris*, *Thesium linophyllum*; passe l'hiver et n'est à son entier développement qu'en

- mars.** — Vit à découvert sur plusieurs espèces de plantes en mars et en septembre; BERCE. — Selon DONZEL: en avril; *Plantago lanceolata* et *Achillea millefolium*.
- strigaria.** — *Betula alba*; mai. — En juin; MERRIN.
- strigilaria.** — Sur la Bruyère; LE ROI. — Sur les plantes basses; est polyphage; MILLIÈRE. — *Stachys sylvatica* et *Vicia cracca*; avril et mai; BERCE. — Après avoir passé l'hiver, dit MILLIÈRE, se transforme en mai.
- emutaria.** — *Convolvulus sepium* peut-être *Statice limonium*; se chrysalide fin mars.
- imitaria.** — *Rubus*, *Artemisia*, *Rubia*, *Erica*, *Lotus angustissimus*, les *Galium*, *Cratægus oxyacantha*, *Clematis vitalba*; passe l'hiver et reste à l'état de chenille jusqu'en mars ou avril.
- ornata.** — *Thymus serpyllum*, la *Marjolaine* et la *Mentha*; avril et mai; et à l'automne ajoute BERCE. — Depuis septembre à avril; MERRIN.
- decorata.** — *Thymus vulgaris*; passe l'hiver et ne parvient à toute sa grosseur que vers le milieu ou la fin d'avril, et en juillet ajoute BERCE.

ZONOSOMA

- pendularia.** — *Alnus glutinosa*, *Betula alba*; en juin, septembre et octobre.
- orbicularia.** — *Alnus*, *Salix caprea*; en septembre; GUÉNÉE. — Juin et septembre; BERCE.
- annulata.** — *Acer campestre*, REAUMUR. — DONZEL est porté à croire qu'elle vit en juin et septembre sur le *Quercus robur*.
- albiocellaria.** — Il est probable qu'elle vit sur *Acer campestre*; BERCE.
- pupillaria.** — Les *Cistus monspeliensis* et *salvifolius*, *Myrthus communis*, *Phillyrea angustifolia*, *Arbutus unedo* et divers *Quercus*; on la trouve toute l'année, aussi bien pendant la belle saison que pendant l'hiver.
- porata.** — *Quercus robur* et *Betula alba*; juin, juillet, septembre.
- punctaria.** — *Quercus robur* et *Betula alba*; juin, juillet et septembre.
- linearia H.** — *Fagus sylvatica*, *Quercus robur*; BRUAND. — Juin août et septembre.

TIMANDRA

amata. — Plusieurs espèces de *Rumex*, *Polygonum hydropiper*, *Persicaria*; juin et en septembre.

OCHODONTIA

adustaria. — *Evonymus europæus*; juin et septembre.

PELLONIA

vibicaria. — *Aira montana*, *Spartium scoparium*; septembre et octobre, passe l'hiver sur une foule de graminées; GUÉNÉE.

calabraria. — Sur les *Genista*, principalement *G. tinctoria*; septembre et octobre; BERCE.

ABRAXAS

grossulariata. — Différentes espèces de Groseilliers, principalement le *Ribes grossularia* et *R. rubrum*, *Prunus spinosa*, *Amygdalus communis*; hiverne et se chrysalide fin juin.

pantaria. — *Fraxinus excelsior*, *Ulmus campestris*; passe l'hiver, a toute sa taille courant juin.

sylvata. — *Ulmus campestris*, *Platanus orientalis*, *Fagus sylvatica*; août et septembre.

adustata. — *Evonymus europæus*; mai et en septembre. — Mai et juin; GUÉNÉE.

marginata. — Principalement *Corylus avellana*, *Populus tremula* et sur un grand nombre d'arbres et d'arbrisseaux; mai et septembre. — Principalement *Salix caprea*; GUÉNÉE. — Selon BERCE, sur différentes espèces de *Salix*; avril et mai.

BAPTA

pictaria. — *Prunus spinosa*; sur les buissons bas; en juin.

bimaculata. — *Cerasus avium*, *Salix*, *Rhamnus*; juillet; MERRIN.

temerata. — *Prunus spinosa*, *Cerasus avium*, *Rhamnus*; juillet; MERRIN.

STEGANIA

trimaculata. — Les *Populus alba*, *fastigiata* et *pyramidalis*; mai et juin. — BERCE, en juin et en septembre.

CABERA

pusaria. — *Betula alba*, *Salix alba*, *Fagus sylvatica*, *Alnus glutinosa*, quelquefois *Quercus robur*; juin, juillet et septembre. — Août; GUÉNÉE.

exanthemata. — *Betula alba*, *Salix alba*, *Fagus sylvatica*, *Alnus glutinosa*; juin et septembre.

NUMERIA

pulveraria. — *Salix caprea*; juin et septembre; TREITSCHKE.

capreolaria. — *Abies excelsa* et *A. picea*; a toute sa taille vers la mi-mai.

ELLOPIA

prosapiaria. — *Pinus sylvestris*, *Larix europæa*. — Quelques autres conifères; se transforme entre des feuilles; DONZEL. — Juin, juillet, août et septembre.

pinicoloria. — Sur les *Pinus maritima* et *P. laricio*; chenille en avril et probablement en juillet.

margaritaria. — *Carpinus betulus*, *Quercus robur*, *Alnus*; mai, juin et septembre.

honoraria. — Les Chênes verts et les Oliviers; GUÉNÉE. — Vit sur *Quercus robur*; août et septembre; BERCE. — Selon DUPONCHEL, sur le *Betula alba*; en automne.

EUGONIA

quercinaria. — *Ulmus campestris*, *Fraxinus excelsior* et principalement *Quercus robur*; en juin.

autumnaria. — *Alnus*, *Ulmus campestris*, *Tilia europæa*, *Quercus robur*, *Corylus avellana*; a toute sa taille commencement de juillet.

alniaria. — *Alnus*, *Ulmus*, *Tilia*, *Quercus robur*, *Corylus avellana*; a toute sa taille commencement juillet. — Principalement sur Bouleau et Peuplier; BERCE.

fuscantaria. — *Fraxinus excelsior*, *Betula alba*; *Fraxinus ligustrum* selon GUÉNÉE; fin septembre. — MERRIN la note en juin, et BERCE, en juillet.

erosaria. — *Quercus robur*, *Betula alba*, *Tilia europæa*, *Carpinus*

betulus, *Pyrus communis*; mai, juin. — Selon BERGE, en juin, puis en août et septembre.

quercaria. — Vit sur le *Quercus robur* et sur les Chênes verts; mai; MARTORELL.

SELENIA

bilunaria. — *Ulmus campestris*, *Quercus robur*, *Salix alba*, *Prunus domestica*, *Cratægus oxyacantha*; mai, juin; puis en août et septembre.

lunaria. — *Ulmus campestris*, *Quercus robur*, *Salix alba*, *Betula alba*, *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*; juin, août et septembre.

tetralunaria. — *Ulmus campestris*, *Quercus robur*, *Salix alba*, *Betula alba*; le *Juglans regia*, d'après BRUAND; juin, août, septembre.

PERICALLIA

syringaria. — *Syringa vulgaris*, *Jasminum officinale*, *Ligustrum vulgare*, *Salix alba*; juin, juillet, septembre et octobre.

THERAPSI

eronymaria. — *Evonymus europæus*.

ODONTOPERA

bidentata. — *Alnus glutinosa* et *A. viscosa*, *Rosa canina*, *Salix alba*, *Pinus sylvestris*; à toute sa taille en septembre ou octobre. — LE ROI n'indique que le *Quercus robur*; difficile à élever. — BERGE, août et septembre, sur beaucoup d'arbres et d'arbustes.

pennaria. — *Quercus robur*, *Carpinus betulus*; commencement de l'été. — *Quercus robur*, *Prunus spinosa*; en mai; BERGE. — Elle s'enterre; DONZEL.

CROCALLIS

tusciaria. — *Prunus spinosa*; en juin.

elinguaria. — *Ulmus campestris*, *Quercus robur*, *Pyrus communis*, *Prunus spinosa*, *Lonicera caprifolium* et *L. xylosteum*, *Viburnum lantana*, *Spartium scoparium*; courant de l'été. — Avril et mai; sur une foule d'arbres et d'arbustes; BERGE.

Dardoinaria. — *Ulex nanus* et autres; préfère la fleur; les *Genista*,

Cistus et *Juniperus* ; en novembre ; a toute sa taille fin janvier ;
MILLIÈRE.

EURYMENE

dolabraria. — *Quercus robur*, *Tilia europæa*, *Sambucus nigra*, *Prunus spinosa*, les *Rubus*, *Rosa* ; mai, juin, août, septembre et octobre.

ANGERONA

prunaria. — *Prunus domestica*, *P. spinosa*, *Coryllus avellana*, *Carpinus betulus*, *Ulmus campestris* ; passe l'hiver et arrive à toute sa taille vers la fin de mai.

URAPTERYX

sambucaria. — La Ronce, le Lierre, le Prunellier, préfère le Sureau et le Chèvrefeuille ; septembre ; se chrysalide avril, mai ou juin.

RUMIA

luteolata. — *Cratægus aria*, *C. oxyacantha*, *Prunus spinosa* et autres arbres analogues ; septembre, octobre et au printemps.

EPIONE

apiciaria. — *Salix alba* et autres *Salix* ; mai et août. — *Populus*, *Alnus glutinosa*, *salix* ; avril ; MERRIN.

paralellaria. — *Corylus avellana* ; vers le milieu de juin elle se change en chrysalide.

advenaria. — *Vaccinium myrtillus*, *Quercus robur*, *Cratægus oxyacantha* ; se chrysalide fin juillet, commencement août.

HYPOPLECTIS

adpersaria. — *Spartium scoparium* ; HUBNER. — Différentes plantes Herbacées ; *Senecio nemoralis* ; BORKAUSEN. — Septembre et octobre ; elle passe l'hiver, dit DONZEL ; c'est donc au printemps qu'il faut la chercher.

VENILIA

macularia. — *Lamium purpureum* et *L. album*, les Chicoracées ; a toute sa taille en août et septembre.

MACARIA

notata. — *Alnus glutinosa*, *Salix pentandra*, *Quercus robur*; à toute sa taille en juin et en septembre.

alternaria. — *Pinus sylvestris*; en septembre; TREITSCHKE. — Sur les *Salix* et *Alnus*; avril, juin; BERGE.

signaria. — *Pinus sylvestris*; septembre.

Estimaria. — *Tamarix gallica*; en mai, juin, juillet, septembre et octobre.

liturata. — *Pinus sylvestris*; septembre.

PIOSERIA

pulverata. — *Populus tremula*; HERRICH, SCHOEFFER.

CHIMERINA

caliginearia. — *Cistus monspeliensis* et *C. salvifolius*; avril et mai. — MILLIÈRE; fleurs en boutons. — *Cistus albidus*; DONZEL. — *Cistus incanus*, *Helianthemum polifolium*; BERGE.

HYBERNIA

rupicapraria. — *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*; avril et mai.

bajaria. — Différents arbres fruitiers, *Cratægus oxyacantha*; *Ligustrum* selon BRUAND; à toute sa taille à la fin de mai ou au commencement de juin.

leucophæaria. — *Quercus robur*; mai et juin.

aurantiaria. — *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, *Betula alba*; mai et juin. — *Quercus robur*, *Fagus sylvatica*; Société Belge.

marginaria. — *Quercus robur*, *Betula alba*, *Fagus sylvatica*; à toute sa taille commencement de juin. — *Cratægus oxyacantha*; BERGE.

defoliaria. — *Tilia europæa*, *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, *Betula alba*, *Cratægus oxyacantha* et autres arbres des bois, ainsi que les arbres fruitiers; mai et juin.

ANISOPTERYX

aceraria. — *Acer campestre*; *Quercus robur* d'après DELAMAIN; mai et juin. — *Cratægus oxyacantha*, *Ulmus campestris*, *Quercus robur*, *Tilia europæa*; BERGE.

PHIGALIA

pedaria. — *Quercus robur*, *Betula alba*, *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*, *Ulmus campestris*; à toute sa taille fin juillet. — BERCE ajoute *Tilia europæa*; en mai et juin.

BISTON

hispidarius. — *Quercus robur*; mai; DELAMAIN. — Et aussi, dit-on, sur les arbres fruitiers; BERCE.

pomonarius. — *Carpinus betulus*, *Corylus avellana*, *Quercus robur*, et la plupart des arbres fruitiers; depuis mai jusqu'en juillet.

zonarius. — *Achillea millefolium*, *Salvia pratensis*, *Centaurea jacea*, et même, dit GUÉNÉE, sur les *Lonicera*; en mai et juin; à toute sa taille à la fin de l'été.

alpinus. — *Chrysanthemum inodorum*, *Bellis perennis*, *Centaurea jacea*, *Cratægus oxyacantha*; éclôt les premiers jours de mai, se chrysalide première quinzaine de juillet.

græcarius. — Un grand nombre de plantes herbacées; se chrysalide en juillet.

hirtarius. — Sur un grand nombre d'arbres différents, principalement l'*Ulmus campestris*; août et septembre.

stratarius. — *Tilia europæa*, *Betula alba*, *Quercus robur* et différentes espèces de *Salix* et de *Populus*; juin, juillet et août. — BERCE; l'*Ulmus campestris*; juillet, août et septembre.

AMPHIDASIS

betularius. — *Betula alba*, différentes espèces de *Salix* et de *Populus*, *Quercus robur*, principalement l'*Ulmus campestris*; depuis juillet jusqu'en octobre.

APOCHREIMA

flabellaria. — *Senecio*, les *Chrysanthemum*; fin mars.

HEMEROPHILA

abruptaria. — *Quercus robur*, *Tilia europæa*, *Ulmus campestris*, *Prunus domestica*; mai et juin.

hyctemeraria. — *Genista scoparia*, *Juniperus oxycedrus*; DAUBE,

MILLIÈRE; fin mars, commencement avril; est certainement polyphage. — Trouvée sur le *Cistus albidus*; DONZEL.

NYCHIODES

lividaria. — *Prunus spinosa*, sur les fleurs des *Genista* et *Ulex*; MARTORELL; passe l'hiver et arrive en mai et juin.

SYNOPSISIA

sociaria. — *Hippophae rhamnoides*; a toute sa croissance fin de juin; DUPONCHEL. — Sur toutes les espèces de *Quercus*; DONZEL. — Suivant FREYER, sur les *Genista*. — *Genista purgans*, *G. scoparia*, *Artemisia campestris* A. *absinthium*, *Thymus vulgaris*; passe l'hiver; a toute sa taille vers le milieu d'avril, la seconde génération en mai et juin; MILLIÈRE.

propinquaria. — Variété suivant STAUDINGER, espèce suivant MILLIÈRE; *Genista scoparia* et *G. purgans*, *Artemisia campestris*, *Plantago cynops*; a tout son développement en juillet; les œufs de la deuxième génération éclosent en août.

Staudingeraria. — Sur le *Dorycnium*; vit de septembre à mai.

BOARMIA

Solieraria. — Les *Juriperus*? La chenille vit sur le Cyprès; se trouve presque toute l'année; MARTORELL.

occitanaria. — *Thymus vulgaris*; mange les fleurs; MILLIÈRE, MARTORELL. — *Quercus ilex* et *Q. suber*; DE GRASLIN. — Hiverne et a toute sa taille en mars ou avril.

subfiavaria. — Passe l'hiver; vit exclusivement sur les *Genista*; MILLIÈRE.

perversaria. — *Juniperus cupressifolia*; MILLIÈRE.

cinctaria. — *Erica vulgaris* et d'autres plantes basses, principalement *Malva malacoides*, *Psoralea bituminosa*; préfère les fleurs; n'a tout son développement qu'à la fin de juillet. — Selon BERCE, *Erica vulgaris*; en mai et juin, puis en août et septembre.

gemmaria. — *Quercus robur*; les arbres fruitiers, *Prunus spinosa*, *Crataegus oxyacantha*, *Rubus spinosa*, etc.; mai et juin, puis août et septembre; BERCE.

ilicaria. — Arbres fruitiers, *Quercus ilex* et *Q. robur*; GUÉNÉE; en mai et juin. — *Hedera helix*, *Syringa vulgaris*, *Clematis*;

- avril, mai et juin. — La var. *perfumaria* vit sur ces plantes; MERRIN; n'est-ce bien qu'une variété?
- secundaria.** — *Pinus sylvestris*; se chrysalide commencement de juin et probablement en septembre; BERCE.
- abietaria.** — *Pinus abies*; fin août. — Pins et Sapins en mai et juin; BERCE. — *Larix europæa*, *Abies excelsa*, *Pinus sylvestris*; depuis septembre à avril; MERRIN.
- umbraria.** — Les Oliviers et quelquefois les Chênes verts; février, mars.
- repandata.** — *Carpinus betulus*, *Betula alba*; GUÉNÉE prétend qu'elle vit de plantes basses; mai, août. — AVRIL; MERRIN. — Ronce, Framboisier, Prunellier, Chèvrefeuille etc.; avril, mai, août et septembre; BERCE.
- roboraria.** — *Fagus sylvatica*, de préférence le *Quercus robur*; mai, août et septembre.
- consortaria.** — *Populus fastigiata*, *Lonicera xylosteum*, *Prunus spinosa*, *Salix alba*, *Quercus robur*; mai et août. — *Betula alba*; BERCE. — *Ulex*, *Lonicera*, *Genista*, *Psoralea bituminosa*; MARTORELL.
- angularia.** — Vit de Cryptogames; en mai; TREITSCHKE.
- lichenaria.** — Plusieurs *Lichens*, principalement l'*omphaloides* sur les Chênes; mai et juin, puis en août et septembre. — Principalement sur les Lichens des Ormes et des Peupliers; GUÉNÉE.
- glabraria.** — *Lichen omphaloides*, *Usnea barbata*; en juin et au commencement juillet; GUÉNÉE. — Lichens des Sapins; mai et juin; MERRIN.
- selenaria.** — *Artemisia campestris*; TREITSCHKE. — *Pimpinella nigra*; MILLIÈRE. — *Arbutus unedo* et différentes plantes indigènes; septembre, octobre et fin juin. — *Artemisia campestris*; juin et juillet; BERCE.
- biundularia.** — *Quercus robur*, *Betula alba*, etc.; juin; MERRIN.
- crepuscularia.** — *Salix alba*, *Ulmus campestris*, *Populus nigra*, *Alnus glutinosa*, *Sambucus nigra*, *Prunus spinosa*; mai, août et septembre.
- consonaria.** — *Alnus glutinosa*; HUBNER; en juillet. — *Quercus robur*, peut-être *Fagus sylvatica* et d'autres arbres forestiers; BERCE.
- luridata.** — Vit, dit-on, sur l'Aulne et le Bouleau, mais certainement aussi sur le Chêne; BERCE.

punctularia. — *Alnus glutinosa*, *Betula alba*; en juin.

buxicolaria. — *Buxus sempervirens*; février et mars.

TEPHRONIA

sepiaria. — Différents Lichens des murs et des planches; en juin. — Vit en famille sur les Lichens des vieux murs et des palissades au nord et à l'ouest; mai et juin; BERGE.

cremiaria. — Lichens des planches; commencement juin.

PACHYCNEMIA

hippocastanaria. — Les *Erica* et *Calluna*; a toute sa taille en avril. — Vit au printemps et en automne; BERGE. — Selon MARTORELL, une grande partie de l'année.

GNOPHOS

dumetata. — Peut-être *Phillyrea latifolia*; se chrysalide vers le commencement de juin; MILLIÈRE.

furvata. — Se nourrit de plantes basses suivant DALH; *Viburnum lantana*, suivant les anciens auteurs. — CONSTANT dit qu'elle est polyphage; *Coronilla emerus*. — *Genista*, *Polygonum aviculare*; GUILLEMOT. — En avril, mai et juin, suivant les auteurs.

Respersaria. — *Rhamnus alaternus*; a toute sa grosseur en avril et mai. — *Spartium*, *Genista*; FREY.

sartata. — *Rhamnus alaternus*.

obscuraria. — *Rubus cæsius*, *Artemisia campestris*; avril. — Suivant l'abbé FETTIG, en septembre. — Facile à élever de plantes basses; BERGE. — *Potentilla reptans*, *Poterium sanguisorba*, *Thymus*, Graminées, *Helianthemum vulgare*; de septembre à avril; MERRIN. — *Silene nutans*, *Lychnis viscaria*; FREY.

ambiguata. — Pendant l'automne et l'hiver a été nourri de plantes basses; au printemps, des fleurs de *Ficaria* et de *Chrysanthemum*; passe l'hiver; au milieu de février a toute sa taille.

pullata. — Préfère les *Plantago* et certaines Composées; est polyphage; passe l'hiver; est arrivée à sa taille en avril et mai.

glaucinaria. — Est polyphage, mais préfère les Plantains et certaines Composées; Joubarbe blanche, selon BRUAND; en août.

variegata. — *Verbascum lychnitis*, *Linaria cymbalaria*; *Clematis vitalba*, d'après Maurice SAND; Joubarbe jaune, selon BRUAND;

- passe l'hiver; a toute sa grosseur en avril. — *Asplenium ruta muraria*; FREY.
- muclidaria.** — Vit de plantes basses, mange indistinctement les *Rumex*, les Composées Umbellifères, mais préfère l'*Anagallis arvensis* et le *Polygonum aviculare*; fin mars, commencement avril, puis août et septembre.
- asperaria.** — *Cistus monspeliensis* et *C. salvifolius*; du 1^{er} au 15 décembre; MILLIÈRE.
- dilucidaria.** — Chenille sur Joubarbe; BRUAND.
- olfuscaria.** — *Vicia cracca* d'après FISCHER; probablement polyphage; mange *Rumex*, *Plantago* et *Campanula*; se chrysalide en septembre. — *Gentiana lutea*; atteint toute sa grosseur en mai; MILLIÈRE.
- Zelleraria.** — Sur les plantes basses, sur les rochers; FREY.

DASYDIA

- tenebraria.** — Doit vivre de Lichens, bien qu'en captivité on l'ait élevée avec *Rumex scutatus*; juillet, août; ROD. ZELLER.

PSODOS

- alticolaria.** — Vit probablement de Cryptogames; œufs pondus à la fin de juillet; la chenille passe l'hiver sous la neige à 3.000 mètres d'altitude; MILLIÈRE, ROD. ZELLER.
- alpinata.** — Polyphage, préfère les *Leontodon*; fin juillet, août; d'autres passent l'hiver pour se métamorphoser au printemps.
- quadrifaria.** — *Rhododendron hirsutum*.

PYGMÆNA

- fusca.** — *Draba verna*, *Viola calcarata*, *Uva ursi* et plusieurs plantes herbacées; se transforme fin juillet.

FIDONIA

- carbonaria.** — *Salix*, *Betula alba*; juillet; MERRIN.
- famula.** — *Genista sagittalis* et *G. scoparia*; mai, juin, juillet, fin août, septembre et passe l'hiver.
- limbaria.** — *Spartium scoparium*; a toute sa croissance au milieu d'octobre. — Selon BERCE; juin, juillet, septembre et octobre.

ATHROOLOPHA

- pennigeraria.** — *Santolina chamæcyparissus*; printemps et automne.
— Selon DE GRASLIN, elle vit sur *Lavandula vera* et *L. pyrenaica*; en avril. — DONZEL dit que la chenille passe l'hiver et vit sur le *Thymus*.

EURRANTHIS

- plumistaria.** — *Dorycnium suffruticosum*; passe l'hiver en chrysalide; se métamorphose en juillet.

EMATURGA

- atomaria.** — *Alnus glutinosa*; différentes espèces de *Scabiosa*, *Artemisia campestris*; *Coronilla*, *Lotus* d'après BERCE; les unes hivernent, les autres sont à leur taille courant de l'été.

BUPALUS

- piniarius.** — *Pinus sylvestris*, *P. abies*; depuis le commencement d'août jusqu'au milieu d'octobre.

SELIDOSEMA

- tricetaria.** — Principalement *Dorycnium suffruticosum* et aussi sur plusieurs plantes basses.
tæniolaria. — *Genista sagittalis*, *Prunus spinosa*, *Spartium scoparium*, *Calluna vulgaris*; BERCE. — *Dorycnium* et *Scabiosa*; MARTORELL; en juin et juillet.
ambustaria. — *Hypericum perforatum*; A. KALCHBERG; chenille hiverne; mars et avril sous les plantes basses.

HALIA

- vincularia.** — *Rhamnus infectorius*, peut-être *Rhamnus catharticus*; se chrysalide premiers jours de juillet. — Juin et septembre; BERCE.
contaminaria. — *Quercus robur*; mai et juin, puis en septembre et octobre. — GUÉNÉE ne mentionne qu'une époque, septembre et octobre.
loricaria. — Vit sur les *Betula alba*?
wauaria. — *Ribes rubrum*, *R. grossularia*, *R. uva-crispa*; à toute sa taille fin mai, juin.

brunneata. — *Vaccinium myrtillus*; mai, elle s'enterre; TREITSCHKE.

DIASTICTIS

artesiaria. — *Salix alba*; mai et juin. — *Salix viminalis*; en juin; GUÉNÉE. — Fin août sur les *Salix*; DE PEYERIMHOFF.

PHASIANE

partitaria. — *Teucrium chamædrys*, probablement *Teucrium scordonia*; a son entier développement milieu d'octobre.

petraria. — *Pteris aquilina*; juin et juillet; STANTON.

scutularia. — *Rosmarinus officinalis*; sa vraie nourriture est le *Thymus vulgaris* et la *Lavandula spicata*; se métamorphose fin avril.

rippertaria. — *Salix viminalis* et *S. rosmarinifolia*; se transforme d'abord fin mai, puis fin septembre pour la seconde fois.

glarearia. — *Lathyrus pratensis*; CATAL. DE VIENNE. — GUÉNÉE prétend que la chenille est inconnue.

clathrata. — *Medicago sativa*, *Melilotus officinalis*, *Hedysarum onobrychis*; septembre et octobre à avril.

EUBOLIA

arenacearia. — *Coronilla varia*.

murinaria. — Différentes espèces de *Vicia*, principalement *Medicago sativa*; est polyphage; a toute sa taille en mai, puis en août et septembre.

catalaunaria. — Éclôt fin avril; fin mai, elle arrive à toute sa grosseur; vit sur les *Dorycnium*.

assimilaria. — *Genista corsica*; s'élève bien avec le *Genista tinctoria* et le *Spartium junceum*; a tout son développement en juin.

ENCONISTA

miniosaria. — Les *Genista scoparia* et *purgans*; sort de l'œuf commencement de mars, se métamorphose milieu avril. — *Calycotome intermedia*; OBERTHUR.

agaritharia. — Un *Genista*? un *Ulex*, peut-être le *provincialis*.

SCODIONA

emucidaria. — *Artemisia campestris*; vit depuis le mois de juillet, passe

l'hiver, se chrysalide mars ou commencement avril de l'année suivante.

belgaria. — *Calluna vulgaris*; hiverne et se chrysalide en avril et mai.

penulataria. — *Dorycnium suffruticosum*, quelquefois le *Plantago lanceolata* et certains *Genista*; n'atteint son entier développement que vers la fin de juin. — Se trouve toute l'année; MARTORELL.

conspersaria. — *Salvia pratensis*; TREITSCHKE; a toute sa taille au mois de juin. — DONZEL était porté à croire que cette espèce vivait de *Lavandula*.

lentiscaria. — Les *Helianthemum vulgare*, *valetinum* et *pulverulentum*; a toute sa taille en novembre.

CLEOGENE

lutearia. — Polyphage, préfère les *Plantago* et les *Leontodon*, et de ces plantes les feuilles sèches et flétries; la chenille vit de mai à novembre. — Passe l'hiver, selon MILLÈRE.

SCORIA

lineata. — Les *Rumex patientia* et *persicaria*, une foule de plantes basses; sort de l'œuf en juillet, passe l'hiver, a toute sa croissance en mai.

ASPILATES

gilvaria. — *Achillea millefolium*, *Biscutella didyma*; a toute sa taille fin juin, commencement juillet.

ochrearia. — Les *Scabiosa*, les *Lotus* et certaines Crucifères; passe l'hiver et n'atteint tout son développement qu'à la fin de mars.

strigillaria. — *Spartium scoparium*, *Alnus glutinosa*, *Vicia cracca*; *Calluna vulgaris*, selon BERCE; mai et août.

LIGIA

opacaria. — *Dorycnium suffruticosum* et sur plusieurs espèces de *Genista*; on la trouve parvenue à toute sa grosseur à la fin de mars et pendant tout le mois d'avril.

Jourdanaria. — *Dorycnium suffruticosum*. — *Thymus vulgaris*; le papillon éclôt en septembre; DAUB.

HELIOTHEA

discoidaria. — *Santolina chamæcyparissus*; passe l'hiver, arrive à toute sa taille en mars ou avril suivant.

APLASTA

ononaria. — *Ononis spinosa* ou *O. arvensis*; les œufs éclosent en juin, la chenille passe l'hiver et n'acquiert toute sa taille qu'en mars ou avril suivant. — Et aussi en septembre; GUÉNÉE.

STERRHA

saccharia. — Est probablement polyphage; MILLIÈRE l'a élevée sur des *Rumex* et un *Anthemis*; sa véritable nourriture serait le *Polygonum aviculare*; passe l'hiver, se chrysalide au printemps.

LYTHRIA

purpuraria. — *Polygonum aviculare*; mai et juin. — Sur les *Rumex*; mai et septembre; BERCE.

ORTHOLITHA

plumbaria. — Eclôt en automne, hiverne, arrive à toute taille en avril et reparait en juin; sur le Genêt, la Bruyère, le *Scabiosa succisa*. — *Cytisus scoparius*; MERRIN.

cervinata. — Plusieurs espèces de *Malva* ou *Althæa*, telles que les *Althæa rosea* et *officinalis* et *Malva alcea*; juin et juillet.

limitata. — *Bromus arvensis*; elle s'enterre, se métamorphose en juin. — Vit en avril et mai; BERCE.

meniata. — *Spartium scoparium*; mai et juin. — *Plantago*, *Scabiosa*, etc.; MARTORELL.

peribolata. — *Genista* et *Ulex*, principalement le *Genista scoparia*, éclôt milieu de novembre; est parvenue à toute sa taille fin avril, commencement de mai.

proximaria. — *Genista corsica* et un *Ulex*; parvenue à toute sa grosseur vers le milieu ou la fin de mars.

bipunctaria. — *Trifolium pratense*, *Lolium perenne*, et d'autres plantes herbacées; à toute sa taille au mois de juillet.

MESOTYPE

virgata. — *Galium verum*; TREITSCHKE. — Avril, mai, juin et septembre; MERRIN.

MINOA

murinata. — Principalement *Euphorbia cyparissias* et plusieurs autres espèces d'Euphorbes; juin et octobre.

ODEZIA

atrata. — *Chærophyllum sylvestre*; mai, fin juillet.

LITHOSTEGE

griseata. — *Sisymbrium sophia*; s'élève très bien avec l'*Isatis tinctoria*; se transforme vers le 15 août.

ANAITIS

præformata. — *Hypericum*; août et septembre.

plagiata. — *Hypericum perforatum*; mai et juillet. — *Scabiosa, Calendula, etc.*; MARTORELL.

simpliciata. — Les *Hypericum alpinum, perforatum et montanum*; fin juin, premiers jours d'août.

paludata. — *Oxycoccus palustris* et aussi *Vaccinium vitis-idaea*; juin; MERRIN.

CHESIAS

spartiata. — Principalement *Spartium scoparium* et différents *Genista*; mi-mai à fin juin.

rufata. — *Spartium junceum, Ulex, Coronilla, etc.*; MARTORELL. — *Cytisus scoparius*; juillet, août et septembre; MERRIN.

LOBOPHORA

polycommata. — *Lonicera xylosteum*; HUBNER. — *Lonicera periclymenum, Fraxinus excelsior*; juin; MERRIN. — *Ligustrum vulgare*; FREY.

sabinata. — *Juniperus sabinna*; FREY.

carpinata. — Principalement *Salix caprea*, les *Populus*, les *Salix*; s'enterre à la fin de juin. — Juillet et avril; BERCE.

halterata. — Plusieurs espèces de *Salix* et de *Populus* ; s'enterre à fin juin ; TREITSCHKE.

sexalisata. — *Salix caprea* et plusieurs espèces de *Populus* ; juillet et août.

viretata. — *Ligustrum vulgare* ; août et septembre ; HUBNER.

CHEIMATOBIA

brumata. — Toutes sortes d'arbres sauvages ou cultivés, dont elle mange les bourgeons ; a acquis toute sa croissance en mai.

boreata. — BERCE pense qu'elle vit sur le *Betula alba*.

TRIPHOSA

sabaudiata. — Sur les jeunes Aulnes ; juillet. — *Rhamnus catharticus* ; DONZEL.

dubitata. — Les *Rhamnus catharticus* et *frangula* ; mai.

EUCOSMIA

certata. — *Berberis vulgaris* ; en juin.

montivagata. — BERCE pense qu'elle doit vivre sur le *Berberis vulgaris*.

undulata. — Les *Salix alba*, *caprea* ; dans des feuilles repliées ; en septembre et octobre.

SCOTOSIA

vetulata. — *Rhamnus catharticus* et *R. frangula* ; juin ; MERRIN.

rhamnata. — Principalement les *Rhamnus catharticus* et *frangula*, et sur plusieurs plantes ; a deux apparitions. — Mai et juin ; MERRIN.

badiata. — Différentes espèces de *Rosa* ; a toute sa taille fin mai, juin. — *Cratægus oxyacantha* ; en juillet et août ; BERCE.

LYGRIS

reticulata. — *Impatiens noli-tangere* ; septembre, octobre.

prunata. — *Prunus domestica*, *P. spinosa*, *Cratægus oxyacantha*, Grosellier épineux et différentes espèces de plantes basses ; depuis mai jusqu'en juillet.

testata. — *Populus tremula*. — BERCE ajoute : probablement sur des plantes basses, peut-être les *Vaccinium*. — DONZEL ne cite que le *Populus tremula* ; juin. — *Salix* ; FREY.

- populata.** — *Populus tremula*, *Salix*, *Vaccinium*; mai, juin. — Au Simplon, sur le *Trollius europæus*; FREY.
associata. — *Ribes nigrum*; mai.

CIDARIA

- dotata.** — *Galium verum*; CATAL. DE VIENNE. — Les *Vaccinium*; DE GRASLIN. — *Galium* et *Cratægus oxyacantha*; mai; MERRIN.
fulvata. — Différentes espèces de Rosiers; se métamorphose en juin.
ocellata. — *Galium sylvaticum*; GOOSSENS. — *Galium verum*; Soc. BELGE. — Les *Galium* en général; en juin et en septembre.
bicolorata. — *Alnus glutinosa*, *Salix caprea*, *Prunus spinosa*, *Pyrus malus*; a toute sa taille à la mi-juin.
variata. — Les *Pinus abies*, *excelsa*. — *Larix, sylvestris*; février, mars, MERRIN; avril, mai. — Selon BERCE, sur les Pins et les Sapins; au printemps et à l'automne.
simulata. — *Juniperus communis*; juin et octobre; MERRIN.
juniperata. — *Juniperus communis*; a toute sa taille courant de juillet.
cupressata. — Divers *Cupressus* et le *Juniperus sabina*; éclôt en mai et ne se transforme qu'en octobre.
siterata. — Principalement *Tilia europæa*, *Quercus robur* et plusieurs espèces d'arbres; mai, juillet, août.
miata. — *Quercus robur*, *Alnus*, *Betula alba*; août.
tæniata. — En battant le Houx; août? MERRIN.
truncata. — *Rubus fruticosus*, *Rosa canina*, *Plantago lanceolata*; a toute sa taille en mai.
immanata. — *Betula alba*, *Prunus spinosa*, la Ronce, le Chèvrefeuille; *Dipsacus sylvestris*, selon Maurice SAND; avril et août.
firmata. — Les *Pinus sylvestris*, *Larix*, *abies*; avril, fin août. — Juillet; BERCE.
munitata. — *Senecio*; depuis septembre; passe l'hiver et se trouve en février; MERRIN.
olivata. — Selon RÉAUMUR, elle vit sur le *Fraxinus excelsior*. — *Galium mollugo*; depuis octobre à avril, très paresseuse; MERRIN.
viridaria. — Différentes espèces de *Galium*; été et automne. — Polyphage, sur plantes basses; FREY.
salicata. — *Helianthemum*, *Galium*, plusieurs espèces de Composées et

- de Crucifères en fleurs; *Salix viminalis*, selon DONZEL; juin, juillet, novembre, décembre et janvier.
- multistrigaria.** — Les *Galium*; mars et avril.
- didymata.** — *Chærophyllum sylvestre* et *C. temulum*, *Primula veris*, d'après MERRIN; avril.
- cambrica.** — *Sorbus aucuparia*; août et septembre; MERRIN.
- vespertina.** — *Sorbus aucuparia* et *S. aria*, *Corylus*, *Rhamnus* et *Populus*; FREY.
- fluctuata.** — *Brassica oleracea*, *Cochlearia armoracia*, *Tropæolum majus* et beaucoup de plantes basses; en juin, juillet et en automne. — GUÉNÉE ne mentionne que juin et juillet.
- neapolisata.** — *Alyssum maritimum*, *Lepidium ruderales*; automne.
- montanata.** — *Primula officinalis*; hiverne et arrive à toute sa taille fin avril, commencement de mai. — Au printemps et en été; BERCE.
- quadrifasciaria.** — *Plantago major*, *Taraxacum dens-leonis*, *Impatiens noli-tangere* et autres plantes basses; à toute sa taille fin mai, commencement de juin. — Avril et mai, puis en août; DONZEL.
- ferrugata.** — *Alsine media*; *Nepeta glechoma*, et *Galium* d'après MERRIN; en juin, commencement juillet, puis en septembre et octobre.
- unidentaria.** — *Alsine media*; en été et en automne; DONZEL. — Et aussi, selon HUBNER, *Impatiens noli-tangere*.
- suffumata.** — *Galium mollugo*; mai et juin. — A toute sa taille en automne; MERRIN dit qu'elle se chrysalide en février et mars.
- pomeriaria.** — *Impatiens noli-tangere*; HUBNER. — Est-elle distincte du *C. unidentaria*?
- designata.** — Sur le Peuplier; SEPP. — Aulne; Maurice SAND. — *Primula*? Crucifères; septembre; MERRIN.
- fluviata.** — *Anthemis maritima*, *Chrysanthemum segetum*, *Convolvulus lineatus*, *Alyssum maritimum*; éclôt fin février, à toute sa grosseur fin mars; MILLIÈRE.
- vittata.** — Sur les *Galium* secs; MILLIÈRE. — *Galium palustre*; août, septembre, avril; MERRIN.
- dilatata.** — *Quercus robur*, *Fagus sylvatica*, *Ulmus campestris*, *Carpinus betulus*, *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*; mai et juin.

- autumnata.** — Dont STAUDINGER ne fait qu'une variété, vit exclusivement sur *Betula alba*; GUÉNÉE.
- filigrammaria.** — *Vaccinium myrtillus* et *Salix*; MERRIN. — *Calluna vulgaris*; GUÉNÉE. — Mai, juin.
- casiata.** — *Saxifraga aizoides*; JOHN HELLINS. — *Vaccinium myrtillus* et *V. Vitis-idæa*; depuis septembre à avril; MERRIN.
- flavicinctata.** — *Saxifraga aizoides*; JOHN HELLINS. — Selon GUÉNÉE, elle vit sur la *Saxifraga petraea*; en mai.
- tophaceata.** — Les *Asperula* et les *Galium*; se transforme en juillet.
- incultaria.** — *Primula latifolia*; ROD. ZELLER; en octobre.
- verberata.** — Pins et autres arbres résineux; TREITSCHKE.
- uniformata.** — Plusieurs espèces de *Galium* notamment le *G. mollugo*; a toute sa taille commencement de juin.
- riguata.** — *Asperula cynanchica* et plusieurs espèces de *Rubiacées*; avril et mai, août et septembre. — Vit sur les *Crucifères*; MARTORELL.
- alpicolaria.** — *Gentiana punctata*; juin et juillet; ROD. ZELLER.
- picata.** — *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*; octobre.
- malvata.** — Les *Lavatera olbia*, *punctata*, *arborea*, les *Malva*; octobre, novembre jusqu'en février.
- basochesiata.** — Divers *Galium*, *Senecio vulgaris*, *Veronica pilosa*; peut-être ne sont-ce pas leurs plantes; MILLIÈRE n'indique que le *Rubia peregrina*; éclôt en janvier, a toute sa taille depuis la fin de novembre jusqu'au commencement de mai.
- cuculata.** — *Galium verum*; juillet et août; DONZEL.
- galiata.** — *Galium mollugo*; juillet et en automne. — *Galium verum*; BERCE.
- rivata.** — *Alchemilla vulgaris*; juin.
- sociata.** — *Alchemilla vulgaris*; s'enterre en juin.
- unangulata.** — *Alsine media*; juillet et août; MERRIN.
- alaudaria.** — *Atragene alpina*; FREY.
- albicillata.** — *Rubus cæsius*, *R. idæus*; depuis juillet jusqu'en septembre.
- procellata.** — *Clematis vitalba*, *Evonymus europæus*; août et septembre.
- thulearia.** — *Betula alba*.
- hastata.** — *Betula alba*; juillet, août.
- tristata.** — *Galium verum*; juin, août et septembre.
- luctuata.** — *Epilobium spicatum*; juin et septembre.

- molluginata** — *Galium mollugo*; pendant l'été.
- affinitata**. — Capsules des Caryophyllées. — Graines de *Silene* et *Lychnis*; août; MERRIN.
- alchemillata**. — *Lamium purpureum*; DONZEL. — *Alchemilla vulgaris*; ANNALES DE SOCIÉTÉ BELGE. — *Dianthus superbus*; M. SAND; septembre et juin.
- hydrata**. — *Silene nutans*, capsules; vit en été et en automne.
- unifasciata**. — *Odontites lutea*; octobre.
- adæquata**. — Sur les *Euphrasia*; FREY.
- albulata**. — *Rhinanthus crista-galli*; lie les sépales; juillet et août.
- candidata**. — *Carpinus betulus*, *Quercus robur*, selon BERCE; avril et juillet; GUÉNÉE. — Selon d'autres auteurs, arrive à toute sa croissance à fin août.
- testaceata**. — *Pinus picea*, *Fagus sylvatica*, *Alnus*; août.
- Blomeri**. — *Ulmus montana*; s'élève avec l'*U. campestris*; se transforme en octobre; MILLIÈRE.
- decolorata**. — Capsules du *Silene nutans*; juillet.
- luteata**. — *Acer campestre*; août à octobre; MERRIN.
- obliterata**. — *Betula alba*; août et septembre. — *Alnus viscosa*; en juin et septembre; GUÉNÉE, LE ROI.
- eximia**. — *Humulus lupulus*; à toute sa taille commencement de septembre.
- bilineata**. — Paraît se nourrir de toutes espèces de plantes basses, ANNALES BELGES; avril. — *Alsine media*; plantes basses; mars; MERRIN.
- sordidata**. — *Vaccinium myrtillus*, *Alnus*, *Corylus avellana*, *Prunus domestica*; *Salix caprea* d'après CONSTANT; mai et juin.
- trifasciata**. — *Alnus*; en septembre; HUBNER. — *Populus*, *Salix*; LE ROI.
- literata**. — *Salix*, *Alnus glutinosa*, *Vaccinium myrtillus*, etc.; septembre; MERRIN.
- capitata**. — *Impatiens noli-tangere*; avril; l'abbé FETTIG, DOUBLEDAY.
- siliceata**. — *Populus tremula*; DUPONCHEL. — DOUBLEDAY l'a élevée avec des *Epilobium*.
- corylata**. — *Tilia europæa*, *Quercus robur*; cesse de croître en août et septembre, passe l'hiver.
- berberata**. — *Berberis vulgaris*; à toute sa taille vers la mi-juillet; en juin et en août, selon BERCE.

- nigrofasciaria.** — *Rosa canina* et les *Lonicera*; a toute sa croissance fin juillet.
- rubidata.** — *Galium montanum*, *G. sylvaticum*, *Asperula odorata*; en société; août et septembre.
- sagittata.** — *Thalictrum flavum*; se nourrit aussi d'autres espèces de *Thalictrum*; août; MERRIN.
- conactata.** — Différentes espèces de *Chenopodium*; depuis août jusqu'en octobre.
- lapidata.** — Le Chêne vert; au printemps; MILLIÈRE. — Et sur d'autres arbres ou arbustes du nord de l'Europe; BERCE.
- aquata.** — *Clematis vitalba*, *Juniperus*; élevée de l'œuf; juin; puis en août et septembre, d'après BERCE.
- vitalbata.** — *Clematis vitalba*; en juin, puis en septembre et octobre.
- tersata.** — *Clematis vitalba*; en société; septembre, octobre et aussi en juin, selon BERCE.

COLLIX

- sparsata.** — *Lysimachia vulgaris*; passe l'hiver; TREITSCHKE.

EUPITHECIA

- oblongata.** — *Centaurea scabiosa*, *Ononis spinosa*, fleurs du *Quercus robur*, sur les *Galium* et les *Ombellifères*, *Inula viscosa*, *Senecio erraticus*, *Achillea ligustica*, *Arenaria maritima*, *Bidens tripartitus*, *Eupatorium corsicum*; juin, août et septembre.
- breviculata.** — *Clematis*; P. MABILLE.
- rriguata.** — *Quercus*, *Fagus*; rarement dans les feuilles; mai et juin; DIETZE.
- insigniata.** — *Pyrus amygdalus*, *P. malus*, *Cratægus*; juin.
- venosata.** — Les *Silene inflata*, *Tenoreana*, *maritima*, *Lychnis viscosa*; fleurs et semences; mai, juin, juillet.
- silenicolata.** — *Silene paradoxa*; dans les fleurs, rarement dans les semences; juin et juillet.
- alliaria.** — *Allium flavum*, dans les semences; commencement de septembre.
- subnotata.** — Différents *Scabiosa*; BORKHAUSEN. — Les *Chenopodium*; GUÉNÉE. — *Atriplex*, fleurs et semences; octobre et novembre.
- pulchellata.** — *Digitalis purpurea*, fleurs et semences en juillet.

- pyreneata.** — *Digitalis lutea*; juillet; GOOSSENS.
- linariata.** — *Digitalis grandiflora*, *Linaria vulgaris*; fleurs et semences. — Dans les semences seulement; STAUDINGER; août septembre et octobre. — Je l'ai trouvée en juin et commencement juillet.
- laquearia.** — Sur *Euphrasia* ou *Odontites lutea*, fleurs et semences; août, septembre et octobre.
- pusillata.** — *Pinus abies*, *P. sylvestris*, *Juniperus communis*; mai.
- abietaria.** — Selon DEGEER, intérieur des pommes encore vertes du *Pinus abies*; juillet.
- togata.** — *Pinus sylvestris* dans les semences STAUDINGER.
- debiliata.** — *Vaccinium myrtillus*, dans les feuilles, commencement du printemps. — *Vaccinium vitis-idaea*; avril; MERIRN. — Assemble deux feuilles, mange l'extrémité; GOOSSENS.
- coronata.** — *Clematis* et *Ombellifères*; août et septembre. — *Eupatorium cannabinum*; FOLOGNE. — *Aster*; MILLIÈRE. — *Achillea*, *Artemisia*; juin; STAUDINGER.
- rectangulata.** — Vit sur les arbres fruitiers, mais préfère les fleurs de *Pyrus malus*; hiverne, et ne parvient à toute sa taille qu'en mai ou juin.
- chlorata.** — *Prunus spinosa*; mai.
- scabiosa.** — *Asparagus officinalis*, *Crepis taraxacifolia*, *Centaurea nigra*, *Scabiosa*, *Solidago*, *Gentiana*, *Globularia*; septembre.
- denticulata.** — *Campanula rotundifolia*, semences; STAUDINGER.
- millefoliata.** — *Achillea millefolium*, dans les fleurs; en automne.
- biornata.** — *Artemisia*? STAUDINGER.
- santolinata.** — Sur le *Santolina*; en septembre et octobre; MABILLE.
- succenturiata.** — *Artemisia vulgaris*, *A. campestris*, dans les fleurs; septembre et octobre.
- subfulvata.** — *Artemisia vulgaris*; HUBNER. — *Prenanthes purpurea*, *Achillea millefolium*, feuilles, fleurs, semences; août et septembre. — GUENÉE n'en fait qu'une variété de la précédente.
- lentiscata.** — *Pistacia lentisus*? STAUDINGER.
- scopariata.** — Sur les *Erica scoparia*, *arborea* et *multiflora*, dans les fleurs; d'octobre à février, puis en juin; STAUDINGER.
- nanata.** — *Erica vulgaris*, dans les fleurs; octobre.
- innotata.** — Différentes espèces d'*Artemisia*, je l'ai principalement trouvée sur l'*A. vulgaris*; septembre, octobre, novembre et

- décembre. — *Artemisia campestris*, *A. absinthium*; MARTORELL.
- tamarisciata. — *Myricaria germanica*, dans les feuilles; juillet.
- fraxinata. — *Coriaria myrtifolia*; juin. — Selon STAUDINGER: *Fraxinus excelsior*, dans les feuilles. — *Cratægus oxyacantha*; GOOSSENS. — Août; BERCE.
- nepetata. — *Calamentha nepeta*, dans les fleurs; octobre novembre; GOOSSENS, MABILLE.
- Mayeri. — *Alsine verna* et probablement sur d'autres plantes basses; GUÉNÉE.
- pygmæata. — *Stellaria holostea*, *Cerastium tomentosum*, et aussi, dit-on, *Alsine media*, dans les fleurs et les semences; juin.
- ultimaria. — *Tamarix gallica*, se nourrit des fleurs; en automne.
- massiliata. — *Tamarix gallica*; DARDOUIN. — Selon MILLIÈRE, ce sont les Chênes verts qui nourrissent la chenille. — Sur les fleurs du *Quercus coccifera*; MARTORELL.
- Peyerimhoffata. — *Quercus coccifera*; STAUDINGER.
- isogrammaria. — *Clematis vitalba*, dans les calices; juillet et août.
- tenuiata. — Chatons du *Salix capræa*, tombés à terre. — *Salix*, dans les fleurs; STAUDINGER; printemps.
- subciliata. — *Acer campestre*; a toute sa taille du 12 au 15 juin; MILLIÈRE.
- plumbeolata. — *Clematis*, *Melampyrum pratense*, dans les fleurs; STAUDINGER. — Étamines dans sa jeunesse, et fleurs dans l'âge adulte; FOLOGNE, CREWE; juillet, août.
- valerianata. — *Valeriana officinalis*, fleurs et semences; adulte fin juillet.
- immundata. — *Actæa spicata*, dans les fruits.
- pernotata. — *Solidago virgaurea*, fleurs; STAUDINGER.
- cauchyata. — *Solidago virgaurea*, fleurs; STAUDINGER.
- satyrata. — Plusieurs espèces de plantes basses. — *Scabiosa succisa*, *Galium*, etc. — FREYER la représente sur le *Thymus vulgaris*. — *Cirsium*, *Peucedanum*, *Centaurea*, *Chrysanthemum*, *Helianthemum*, *Rhinanthus*, *Gentiana*, *Apargia*, *Galeopsis*; STAUDINGER; juin.
- (Var.) callunaria. — *Eupatorium cannabinum*, fleur; STAUDINGER.
- veratraria. — Capsules du *Veratrum album*, dans les semences, GUÉNÉE; août, passe quelquefois deux ans en chrysalide.
- helveticaria. — *Juniperus sabina*; ANDERREG. — Les *Juniperus*; septembre et octobre; MABILLE.

- castigata.** — Plusieurs plantes basses, tels que *Dianthus*, *Hyssopus*, *Aster*, *Solidago virgaurea*, *Hypericum*, *Scabiosa*, *Ononis*, *Achillea*; août et septembre.
- trisignaria.** — *Angelica sylvestris*; DOUBLEDAY. — Selon DE LA HARPE, sur l'*Heracleum sphondylium*, *Thysselinum palustre*, *Pastinaca sativa*, fleurs et semences. — La variété vit sur le *Selinum oreoselinum*; septembre.
- virgaureata.** — *Solidago virgaurea*, *Senecio jacobæa*, *S. palustris*, fleurs; en septembre. — Je ne l'ai jamais trouvé que sur les graines; fin septembre, octobre.
- vulgata.** — Les *Aster*, *Polygonum*, *Sedum*, *Rubus*, *Cucubalus*, etc.; juin, juillet. — *Cratægus oxyacantha*; CREWE.
- campanulata.** — *Campanula trachelium*, dans les semences, *Buplevrum falcatum*; septembre et octobre; MILLIÈRE.
- albipunctata.** — Sur les Ombellifères: *Cicuta vihosa*, *Eupatorium cannabinum*, *Heracleum sphondylium*, *Angelica sylvestris*, fleurs et semences; septembre. — GOOSSENS ne cite que l'*Angelica sylvestris*.
- actæata.** — *Actæata spicata*; STAUDINGER.
- assimilata.** — *Humulus lupulus*; octobre; GOOSSENS. — *Ribes nigrum*.
- minutata.** — *Calluna vulgaris*, *Eupatorium cannabinum*, *Achillea*, *Anthriscus*, dans les fleurs.
- Goossensiata.** — *Calluna vulgaris*; octobre et en juin; GOOSSENS.
- absinthiata.** — *Artemisia absinthium*, les *Solidago*, *Senecio*, *Myrica gale*; commencement octobre. — *Artemisia campestris*; STAUDINGER.
- expallidata.** — *Pimpinella saxifraga*, *Buplevrum falcatum*. — *Achillea*, *Senecio*; fleurs et semences; STAUDINGER; septembre et octobre.
- constrictata.** — *Euphrasia lutea*, fleurs et graines. — *Thymus serpyllum*; STAUDINGER; commencement septembre; dix-huit à vingt jours lui suffisent pour arriver à toute sa taille.
- euphrasiata.** — *Odontites lutea*, dans les fleurs; octobre, novembre.
- albifronsata.** — *Polygonum*; au mois de juin; DE GRASLIN.
- distinctaria.** — *Solidago*; MILLIÈRE. — *Peucedanum oreoselinum*, fleurs et semences; STAUDINGER; septembre.
- sextiata.** — *Thymus vulgaris*; graines fraîchement formées; depuis fin avril au 25 mai.

- indigata.** — *Pinus sylvestris*? *Juniperus*, *Cupressus*; septembre.
- altenaria.** — Doit vivre sur un Bouleau.
- lariciata.** — *Larix europæa*; mars. — En septembre; BERCE.
- silenata.** — *Silene inflata*; fin juillet; dans le calice, puis dans les capsules; STANDFUSS.
- cocciferata.** — Les *Quercus ilex*, *suber* et *coccifera*, et le plus souvent *Quercus robur*; dans les fleurs; avril, mai et juin; MILLIÈRE.
- albreviata.** — *Quercus robur*, etc.; en juin. — Dans les jeunes feuilles; STAUDINGER.
- dodonæata.** — Les *Quercus robur*, *ilex*, *suber*, *coccifera*, *Cratægus oxyacantha*, *Quercus pubescens* et *A. tozza*; se nourrit des fleurs; mai et juin.
- exiguata.** — *Berberis vulgaris*; DUPONCHEL, d'après TREITSCHKE. — *Cratægus oxyacantha*; FREYER. — *Cratægus*, *Salix*, *Ribes*, *Acer*, *Fraxinus*; STAUDINGER.
- lanceata.** — Sur les Conifères et Genevriers?
- provinciata.** — *Juniperus oxycedrus*; du 15 décembre au 15 janvier.
- phœniceata.** — *Juniperus phœnicea*; décembre, janvier et février.
- Mnemosyæata.** — *Juniperus*; en automne.
- oxycedrata.** — *Juniperus oxycedrus*; avril et mai, fin novembre, puis une deuxième génération succède bientôt; MILLIÈRE.
- unedonata.** — *Arbutus unedo*, fleurs; octobre et novembre; P. MABILLE. — Février et mars; MARTORELL.
- rosmarinata.** — *Rosmarinus officinalis*, dans les fleurs; éclôt fin décembre, commencement janvier; se métamorphose en avril.
- sobrinata.** — Les *Juniperus*, fleurs et feuilles; mars et avril. — *Juniperus communis*, seul; STAUDINGER.
- scoriata.** — *Juniperus communis*; STAUDINGER.
- Millierata.** — *Juniperus communis*, *J. macrocarpa*.
- erciata.** — *Erica arborea*; fleurs, novembre. — Mars et avril; MILLIÈRE.
- pumilata.** — *Globularia alypum*; est polyphage. — *Clematis*, *Anthriscus*, *Erica*, *Passerina hirsuta*, *Genista*, *Euphrasia*, *Arbutus*, *Rosmarinus*, *Vitex*, *Mercurialis annua*; STAUDINGER. — En mars; chrysalide en décembre. La chenille coïncide avec la floraison de la plante.
- primula.** — *Primula latifolia*; en automne; MILLIÈRE.

(A suivre, t. XXX.)