

# ANNALES

DE LA

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

---

*Année 1883*

(NOUVELLE SÉRIE)

TOME TRENTIÈME

---

LYON

H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

65, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

MÊME MAISON A GENÈVE ET A BALE

PARIS

J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEUR

19, RUE HAUTEFEUILLE

—  
1884

CATALOGUE  
DES  
CHENILLES EUROPÉENNES  
CONNUES

PAR  
GEORGES ROÜAST

Faculté de la Société Linnéenne de Lyon

---

PYRALIDINA

CLEDEOBIA

**angustalis.** — *Epilobium palustre*; TREITSCHKE. — Selon MILLIÈRE, elle doit se nourrir de racines de *Cryptogames* ou de très petites plantes basses qui y sont mêlées. — Milieu de juin.

**borgialis.** — Vit sur un *Ulex*; MARTORELL.

STEMMATOPHORA

**corticalis.** — *Euphorbia spinosa*; lie ensemble les feuilles; éclôt du 15 au 20 juillet, n'a son entier développement que pendant le courant de mai de l'année suivante; MILLIÈRE. — *Euphorbia serrata*; MARTORELL.

AGLOSSA

**pinguinalis.** — Beurre, lard et autres substances animales, graisses; dans les cuisines, offices; pas d'époques fixes.

**cuprealis.** — Vit aux dépens de toutes les substances animales desséchées; l'époque de la métamorphose n'est pas fixe.

ASOPIA

**glaucinalis.** — Extrémités des bourgeons de *Betula alba*; avril, mai, juin; MERRIN.

**farinalis.** — Hiverne dans la paille des granges; janvier et février.

## ENDOTRICHA

**flammealis.** — *Ligustrum vulgare*, d'après STEPHENS; mai. — Bruyères; MERRIN.

## TALIS

**quercella.** — *Quercus robur*; CATAL. DE VIENNE.

## SCOPARIA

**ambigualis.** — Mousses; avril et mai.

**cembrae.** — Les Mousses; *Hypnum elegans*, *Jungermannia dilatata*; mai; MERRIN.

**murana.** — Les Mousses; *Grimmia pulvinata*, *Bryum capillare*; mars, mai; MERRIN.

**lineola.** — Lichens sur *Prunus spinosa*, *Parmelia parietina* et *P. olivacea*; juin et juillet; MERRIN.

**resinea.** — Lichens sur le *Fraxinus excelsior*, *Stigoneura mammilosa* et *Oscillatoria autumnalis*; avril; MERRIN.

**truncicolella.** — Vit sous les Mousses qui croissent sous les pierres: *Hypnum elegans*, *Jungermannia dilatata*; avril et mai.

**cratægella.** — Dans la Mousse des arbres, dans un tube de soie; avril, mai.

**frequentella.** — Sur les Mousses; *Hypnum elegans* et *Jungermannia dilatata*; avril; MERRIN.

**angustea.** — Ronge les racines des Mousses et peut-être aussi les tiges récemment poussées; en hiver et au printemps.

## THRENODES

**pollinalis.** — *Genista tinctoria*, *Cytisus austriacus*; juin et juillet. — *Genista tinctoria* et *G. germanica*, *Cytisus nigricans*; GUÉNÉE.

## HERCYNA

**phrygialis.** — *Urtica* et autres plantes basses qui bordent les fossés et les marais.

## PHLYCTÆNODES

**pustulalis.** — *Anchusa officinalis*; mai.

## ODONTIA

**dentalis.** — *Echium vulgare* dans la nervure des feuilles basses et desséchées; mai et août.

## EURRHYPARA

**urticata.** — Plusieurs plantes basses, principalement les tiges de l'*Urtica urens*; a atteint toute sa taille en septembre, commencement octobre; hiverne.

## BOTYS

- cingulata.** — Elle jaunit les feuilles du *Salvia pratensis*; de septembre à avril; HEYDEN, RAGONOT.
- porphyralis.** — *Mentha aquatica* et *M. piperita*; TREITSCHKE.
- aurata.** — En société sur *Mentha aquatica*; mai. — *Origanum vulgare*; juin et juillet; GUÉNÉE,
- purpuralis.** — *Mentha arvensis* d'après HUBNER; juin et juillet; MERRIN.
- sanguinalis.** — *Rosmarinus officinalis*; au printemps et en automne. — Selon JOURDHEUILLE, sur les fleurs du *Thymus vulgaris*, dans un tube de soie. — Sur beaucoup de plantes sous-ligneuses de la famille des Labiées; MILLIÈRE.
- cæpitalis.** — Sous les feuilles de *Salvia pratensis* et de divers *Plantago*; juin; MERRIN.
- œrealis.** — *Helichrysum arenarium*; août; JOURDHEUILLE.
- alpinalis.** — Plusieurs *Senecio*; juin; MERRIN.
- lutealis.** — *Tussilago farfara*, etc.; mai; MERRIN. — *Rumex*; RAGONOT.
- polygonalis.** — *Polygonum aviculare*? CATAL. DE VIENNE. — Sur les fleurs de l'*Ulex nanus*, peut-être *Cytisus spinosus* et aussi plusieurs espèces de *Genista*; MILLIÈRE; en décembre, janvier et février. — *Genista tinctoria*; juillet; JOURDHEUILLE.
- auralis.** — Vit probablement sur le *Verbascum lychnitis*.
- flavalis.** — *Galium mollugo*; TREITSCHKE. — *Verbascum*; MARTORELL. — *Galium verum*; mai; MERRIN.
- asinalis.** — Au milieu de feuilles réunies de *Rubia peregrina*; janvier et février. — Dans les fleurs et les jeunes graines, d'octobre à mars; MERRIN.
- aurantiacalis.** — Vit sur les *Verbascum*? MARTORELL.
- repandalis.** — Sur les tiges du *Verbascum*, surtout sur les fleurs qu'elle enveloppe de fils; juillet, septembre.
- nubilalis.** — Tiges de l'*Humulus lupulus* et d'autres plantes analogues; à toute sa taille en automne; juin et juillet; JOURDHEUILLE. — Je l'ai trouvée en quantité innombrable dans les tiges du Maïs; elle vit deux ans.
- numeralis.** — Sur les Crucifères; MARTORELL.
- fuscalis.** — Fleurs et capsules des *Lathyrus pratensis* et des *Rhinanthus polyphage*; RAGONOT.

- terrealis.** — Sur les feuilles de *Solidago virgaurea*; juillet, septembre.  
— Fleurs; d'août à avril; MERRIN.
- diffusalis.** — *Marrubium vulgare*; passe l'hiver et ne se transforme qu'en avril.
- crocealis.** — Tiges de *Conyza squarrosa* et *Inula dysenterica*; juillet.  
— Entre les feuilles; avril; MERRIN.
- testacealis.** — *Conyza thapsoides*; en mai.
- stachydalis.** — *Stachys sylvatica*, *Parietaria officinalis*; août.
- sambucalis.** — *Sambucus nigra* et *S. ebulus*; elle ronge les feuilles sans les percer tout à fait; septembre et mai. — Juin et août; JOURDHEUILLE.
- verbascalis.** — *Verbascum thapsus*.
- rubiginalis.** — Dans les feuilles à demi plissées du *Betonica officinalis*; septembre.
- fulvalis.** — Sur les *Cornus*; juin.
- ferrugalis.** — Chardons et Artichauts; G. LAFAY. — Septembre; MERRIN.
- prunalis.** — *Prunus spinosa*, *Veronica officinalis*, *Urtica*, *Rubus idæus*, *Stachys*; est polyphage; mai et juin.
- olivalis.** — *Veronica officinalis* et diverses autres plantes basses; *Geum*, *Lychnis*; en mai et juin. — *Glechoma hederacea*; dans une toile sous les feuilles; MERRIN. — Polyphage; RAGONOT.
- institalis.** — *Eryngium spinosum* et *E. campestre*; elle roule les feuilles en spirale; se transforme commencement de juillet.
- ruralis.** — *Urtica dioica*, *Spiræa* entre les feuilles; a toute sa taille fin juin. — Mai; GUÉNÉE.

## EURYCREON

- nudalis.** — Sur les *Echium* et le *Camphorosma*; MARTORELL.
- sticticalis.** — *Artemisia campestris* et *A. vulgaris*, dans une toile; octobre.
- turbidalis.** — Extrémités des rameaux de l'*Artemisia campestris*, dans une toile légère; août; JOURDHEUILLE.
- palealis.** — Dans les Ombelles du *Daucus carota*; hiverne en terre; août.
- verticalis.** — *Spartium scoparium*; en juin. — Sur les Urticacées; RAGONOT.

## NOMOPHILA

**noctuella.** — Sur le *Polygonum* ; MARTORELL.

## PSAMOTIS

**pulveralis.** — *Mentha aquatica* ; août ; MERRIN.

## PIONEA

**forficalis.** — *Brassica oleracea*, *Cochlearia armoracia* ; en juin et juillet, puis en août et septembre.

## OROBENA

**extimalis.** — *Sisymbrium sylvestris*, *Iberis amara* ; hiverne dans une toile ; septembre et octobre.

**straminalis.** — Dans les tiges de blé ; mars.

**sophialis.** — DE TISCHER présume qu'elle vit sur le *Rubia tinctoria*.

**isatidalis.** — *Isatis tinctoria*, *Lepidium draba* et quelques autres Crucifères ; mars, avril, mai, juin.

## PERINEPHELE

**lancealis.** — *Alnus* ; se retire dans la tige du *Sium latifolium* ; en septembre. — Feuilles roulées des *Senecio sarracenicus* et *Eupatorium cannabinum* ; juillet ; JOURDHEUILLE.

## MARGARODES

**unionalis.** — *Peucedanum officinale* ; ZINCKEN. — Les *Olea*, de préférence l'*O. oleaster*. — Et aussi, dit MILLIÈRE, l'*Arbutus unedo*, *Jasminum fruticans*, *Ligustrum japonicum* ; toute l'année.

## ANTIGASTRA

**catalaunalis.** — *Linaria spuria* ; du 15 août au 15 octobre.

## METASIA

**carnealis.** — Dans les feuilles du *Marrubium* ; passe l'hiver en chrysalide ; MARTORELL.

## AGROTERA

**nemoralis.** — *Castanea vulgaris* ; C. LAFAURY. — *Chrysosplenium alternifolium* ; avril ; MERRIN.

## HYDROCAMPA

- stagnata.** — *Lemna, Potamogeton*; avril; MERRIN. — *Sparganium ramosum, S. simplex*; JEFFREY.  
**nymphæata.** — Sur les feuilles submergées des *Potamogeton natans, Nymphæa alba* et *Nuphar luteum*; mai. — En avril; GUÉNÉE.

## PARAPONYX

- stratiotata.** — *Stratiotes aloides, Ceratophyllum demersum, Callitriche verna, Nuphar, etc.* — *Nasturtium officinale*; MARTORELL; mai. — Mars et avril; GUÉNÉE.

## GATACLYSTA

- lemnata.** — Sur les Lentilles d'eau, dans les eaux stagnantes; la chenille a un fourreau de soie entouré de débris de la plante; mai. — Avril; GUÉNÉE.

## ACENTROPUS

- niveus.** — *Potamogeton pectinatus* et *P. lucens*; la chenille vit jusqu'à la fin de juin.

## CIRPPOPHAGA

- præata.** — Intérieur des Joncs. — *Scirpus lacustris*; RAGONOT.

## SCHÆNOBIUS

- gigantellus.** — *Arundo phragmites*; dans les jeunes pousses, puis dans la tige; depuis fin mai jusqu'à la fin d'août.  
**forficellus.** — Tiges des *Carex* et du *Poa aquatica*; milieu de juin.  
**mucronellus.** — *Arundo phragmites*; juin; MERRIN.

## CHILO

- phragmitellus.** — *Arundo phragmites*; dans le bas des tiges et dans les racines; se chrysalide ordinairement dans les tiges de l'année précédente; depuis l'automne jusqu'en juin suivant.  
**cicatricellus.** — Dans les tiges de *Scirpus lacustris*; juin.

## CALAMOTROPHA

- paludella.** — Feuilles du *Typha latifolia*; depuis juin jusqu'en juillet.

## ANCYLOLOMIA

**tentaculella.** — Selon MILLIÈRE, la chenille vit sur les Graminées.

## GRAMBUS

**hortuellus.** — Sur la Mousse épaisse des rochers, dans un tube de soie ; passe l'hiver, a toute sa taille en mars.

**falsellus.** — Sous la Mousse des murs, etc.; *Barbula muralis*, *Grimmia pulvinata*; février, juin.

**verellus.** — Mousses des arbres; mai? MERRIN.

**conchellus.** — La chenille ronge les Graminées près des Mousses; MILLIÈRE.

**myellus.** — Sous la Mousse des pierres; a toute sa croissance commencement de mars; TREITSCHKE.

**fascelinellus.** — Dans les racines et les tiges du *Triticum junceum*; juin, juillet; MERRIN.

**spuriellus.** — A la base des *Triticum*, dont elle ronge les racines; fourreau de soie et de sable; avril.

**culmellus.** — Mousses humides; mars; MERRIN.

**inquinatellus.** — *Barbula muralis*; juillet.

**contaminellus.** — La chenille, peu connue, est souterraine; P. MILLIÈRE.

**tristellus.** — Mousses humides; mars; MERRIN.

**luteellus.** — *Festuca ovina*; endroits sablonneux; juin.

## EROMENE

**bella.** — *Scabiosa affinis*; se chrysalide à la fin d'octobre. — *Scabiosa candidans*; sur les fleurs; MILLIÈRE.

**Ramburiella.** — La chenille doit également se nourrir de Scabieuses sauvages; MILLIÈRE.

## DIORYCTRIA

**sylvestrella (splendidella H. S.).** — Bois pourri, cônes, bourgeons; MERRIN. — Non aux dépens des feuilles et des bourgeons, mais de la partie ligneuse; MILLIÈRE.

**abietella.** — *Pinus sylvestris*, entre l'écorce et l'aubier; a toute sa taille vers la fin de juin.

## NEPHOPTERYX

- spissicella.** — *Quercus robur*; dans une toile, entre les feuilles; mai.
- rhenella.** — *Salix* et *Populus*, entre les feuilles, dans un tube de soie; août, commencement de septembre.
- genistella.** — *Genista corsica*; RAMBUR. — *Ulex*; de septembre à juillet; MERRIN.
- similella.** — Vit en petite société, sur le *Quercus robur*; juillet.
- albicilla.** — Vit entre les feuilles du *Salix capræa*; août.
- satureiella.** — Rive les feuilles terminales du *Satureia montana*; a toute sa taille vers le 20 ou 25 juin; MILLIÈRE.

## ETIELLA

- Zinckenella.** — *Colutea arborescens*, *Pisum*, gousses vertes, et aussi, selon MILLIÈRE, dans les gousses de l'Acacia cultivé; août et septembre.

## PEMPELIA

- semirubella.** — Racines de Graminées, sur les pentes sèches et gazonnées; dans une toile légère, sur le sol; mai.
- euphorbiella.** — *Euphorbia characias*; sous une toile légère; passe l'hiver et se chrysalide; mars, fin avril.
- cingillella.** — *Myricaria germanica*; sur les fleurs; se chrysalide fin juillet. — Juin; JOURDHEUILLE.
- hostilis.** — *Populus*, *Salix*; juillet à septembre; MERRIN.
- formosa.** — Sur l'*Ulmus campestris*; juin.
- betulæ.** — Entre les feuilles attachées du *Betula alba*; se chrysalide sur la terre; mai.
- gallicola.** — *Pistacia lentiscus*; galles; depuis octobre, jusqu'au printemps; MILLIÈRE.
- palumbella.** — Dans un tube de soie, sous les *Polygala*; mai.
- obductella.** — Feuilles attachées d'*Origanum vulgare* et *Mentha arvensis*; tombe à la moindre secousse; juin, juillet.
- adornatella.** — Mai et juin; MERRIN.
- subornatella.** — *Thymus*; ZELLER. — *Globularia vulgaris*; MANN. — Mai et juin; MERRIN.

## GYNANCYCLA

**canella.** — *Salsola kali*; août et septembre; MERRIN.

## HYPOCHALCIA

**ahenella.** — Dans un tube de soie, sous les feuilles radicales d'*Helianthemum vulgare* et d'*Artemisia campestris*; mai.

## EUCARPHIA

**farrella.** — *Anthyllis vulneraria*; janvier; on peut la trouver, dit MERRIN, hivernant dans des boules de sable.

**sareptella.** — Vit de racines de plantes herbacées qui croissent dans le sable; MILLIÈRE.

## BREPPIA

**compositella.** — Dans une toile, sous l'*Helianthemum vulgare* et l'*Artemisia vulgaris*; en juin.

## AGROBASIS

**obtusella.** — Sur les feuilles de Poirier; mai.

**porphyrella.** — *Erica scoparia*; lie les rameaux supérieurs dans un fourreau; passe l'hiver et n'a atteint toute sa taille qu'à fin mars.

**obliqua.** — Les *Cistus*, principalement le *C. albidus*; se métamorphose commencement d'avril; ronge les feuilles les plus récentes.

**consociella.** — *Quercus robur*; dans un tuyau de soie; mai, commencement de juin.

**tumidella.** — *Quercus robur*; mai, commencement de juin. — *Daphne gnidium*; MARTORELL.

**rubrotibiella.** — Vit en société, dans une toile, entre les feuilles du *Quercus robur*; juin.

## MYELOIS

**cribrum.** — Tiges des *Carduus* dont elle mange la moelle; ne s'y transforme pas; fin avril, mai.

**robiniella.** — *Robinia pseudo-acacia*; dans les gousses; se chrysalide du 15 au 20 août.

**astericella.** — *Asteriscus spinosus*; a toute sa grosseur dans les premiers jours de mai.

- legatella.** — *Rhamnus alaternus*; se transforme en terre; seconde quinzaine de mai.
- suavella.** — *Prunus spinosa*, *Rhamnus* et *Cratægus*, dans des tubes de soie; mai et juin.
- romanella.** — *Rhamnus alaternus* vieux et maladifs; mars et avril, jusqu'au mois de mai; lie les feuilles.
- advenella.** — Entre les fleurs de *Cratægus oxyacantha* qu'elle attache par des fils; endroits chauds et abrités; mai.
- epelydella.** — *Prunus spinosa* et *Cratægus oxyacantha*; dans des tubes de soie; juin, juillet.
- tetricella.** — Gousses du Caroubier?
- ceratonæ.** — *Ceratonia siliqua.* — Dans les siliques en hiver; se nourrit de la pulpe; MILLIÈRE.
- transversella.** — *Psoralea bituminosa*; vit en société sur les feuilles; en juillet.
- bituminella.** — *Psoralea bituminosa*; milieu de mars, à la mi-avril, a toute sa grosseur; MILLIÈRE. — Semble préférer la base de la plante plutôt que la feuille.

## ANCYLOSIS

- cinnamomella.** — Fourreau construit de grains de sable fin; la chenille passe l'hiver; vers le milieu ou la fin de mars, a toute sa taille; doit vivre de racines de Graminées; MILLIÈRE.

## ALISPA

- angustella.** — Fruits de l'*Evonymus europæus*; hiverne dans une toile; ne se transforme qu'au printemps; septembre.

## ZOPHODIA

- convolutella.** — *Ribes rubrum*; fruits à demi mûrs; juin.

## EUZOPHERA

- terebrella.** — Vit dans les cônes des pins; DE PEYERIMHOFF.
- pinguis.** — Sous l'écorce du *Fraxinus excelsior*; mai et juin; MERRIN.  
— Mange l'écorce verte et non pourrie.
- fuliginosella.** — Dans les feuilles sèches du *Betula alba*; avril.
- cinerosella (artemisiella ?).** — *Artemisia vulgaris* et *A. absinthium*; pendant l'hiver.

## HOMŒOSOMA

- nebulea.** — Dans les têtes de *Carduus nutans* ; août et septembre.
- nimbella.** — *Aster sinensis* ; commencement d'octobre. — Fleurs des *Hieracium*, *Solidago*, *Carlina* ; septembre.
- binævella.** — Dans les tiges et les têtes de *Cirsium lanceolatum*, *Carduus acanthoides* ; mai, juin.
- sinuella.** — Dans les tiges de *Chenopodium*, *Plantago lanceolata* ; septembre. — La chenille paraît polyphage ; elle lie, au printemps, les feuilles des plantes herbacées ; MILLIÈRE.

## EMATEUDES

- punctella.** — La chenille, dit MILLIÈRE, doit vivre, à la fin de l'hiver, de racines de Graminées.

## ANERASTIA

- lotella.** — Tiges et racines de *Festuca ovina* et *Aira canescens* ; avril ; MERRIN.
- transversariella.** — *Quercus robur* ; se chrysalide à la fin de juin.

## EPHESTIA

- elutella.** — Intérieur des maisons ; pain, dattes, fruits secs ; se transforme en automne. — JOURDHEUILLE ; août.
- ficella.** — Figues ; janvier.
- gnidiella.** — *Daphne gnidium* ; dans des paquets de feuilles terminales ; depuis le milieu de juillet jusqu'en novembre.
- interpunctella.** — Farine jaune, pain, biscuit, fruits secs.

## GALLERIA

- mellonella.** — Cire des ruches, vit dans des galeries ; août et mai. — Juin ; SOC. BELGE.

## APHOMIA

- sociella.** — Nids du *Bombus lapidarius* ; se transforme en automne. — Nids des Guêpes ; en septembre ; JOURDHEUILLE. — Suivant BRUYAT, elle vivrait en famille, aux dépens du liège, des livres.

## MELISSOBLAPTES

- bipunctanus.** — Dans les nids de Bourdons, en terre ; septembre.  
**anellus.** — Nids du *Bombus terrestris* ; ZINCKEN. — MILLIÈRE a trouvé la chenille sur l'*Inula helenium* ; passe l'hiver.  
**cephalonica.** — Raisins de Corinthe ; depuis novembre à janvier.

## ACHRŒA

- grisella.** — Dans les ruches des Abeilles ; juin. — Septembre ; JOURDHEUILLE.

## TORTRICINA

## RHACODIA

- caudana.** — Entre les feuilles attachées de *Populus tremula* ; mai.  
**effractana.** — *Salix capræa* ; mai.

## TERAS

- crisana.** — *Salix rabougris* et *Cratægus* ; juin à septembre ; MERRIN.  
**umbrana.** — *Salix capræa* et *Populus* ; JOURDHEUILLE. — Chenille, fin août, commencement de septembre ; DE PEYERIMHOFF.  
**hastiana.** — *Salix capræa*, *Populus* ; septembre. — *Salix alba* et *S. viminalis* ; au printemps ; MILLIÈRE.  
**maccana.** — *Myrica gale* ; mai, juin ; MERRIN.  
**pyrivorana.** — Feuilles du Poirier ; en juin ; RAGONOT.  
**mixtana.** — *Calluna vulgaris* ; JOURDHEUILLE. — Rameaux attachés ensemble.  
**logiana.** — Dans les feuilles pliées des *Viburnum opulus* et *V. lantana* ; juin, septembre. — Chenille commune, à la fin d'août ; DE PEYERIMHOFF.  
**permutatana.** — Mai ? MERRIN. — Sur les Rosiers ; RAGONOT.  
**variegana.** — *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha* ; arbres fruitiers ; lie les feuilles ; juin.

- boscana.** — Haies d'*Ulmus campestris*; juin.  
 (Var.) **parisiana.** — Entre les feuilles attachées d'*Ulmus campestris*; septembre.
- literana.** — *Quercus robur*; juin.
- niveana.** — Entre les feuilles du *Betula alba*; juin.
- lipsiana.** — Pommier sauvage, *Betula alba*, *Vaccinium vitis-idaea*; juin; MERRIN.
- sponsana.** — *Fagus sylvatica*, *Ulmus campestris*; juillet; MERRIN.
- ufana.** — *Salix caprea*; juin.
- Schalleriana.** — *Symphytum officinale*; mai; JOURDHEUILLE. — Je l'ai aussi trouvée sur les *Populus* et les *Salix*.
- comparana.** — *Comarum palustre*, *Fragaria vesca*, etc.; mai à juillet? MERRIN.
- aspersana.** — *Potentilla*, *Spiræa*, *Poterium*? juin.
- shepherdana.** — *Eupatorium cannabinum*, *Spiræa ulmaria*; mai, juin; MERRIN.
- ferrugana.** — Feuilles roulées de *Quercus robur* et de *Betula alba*; mai.
- Forskaleana.** — Sur l'*Acer campestre* et les *Rosa*; mai.
- holmiana.** — *Pyrus communis*, et plusieurs autres arbres fruitiers, Rosier, Aubépine, Prunellier; mai.
- contaminana.** — Poirier sauvage, Prunellier, Aubépine; mai.
- Lorquiniana.** — *Lythrum salicaria*; mai.

## TORTRIX

- piceana.** — *Pinus abies* et *Acer campestre*; atteint toute sa croissance en juin.
- podana.** — *Salix*, *Rosa*, *Berberis vulgaris*. — Mai et juin; MERRIN. — Doit vivre sur l'*Alnus glutinosa*; MILLIÈRE. — Polyphage; RAGONOT.
- cratægana.** — Sur les arbres fruitiers; printemps.
- xylosteanana.** — *Lonicera xylosteum* et plusieurs arbres fruitiers, *Quercus robur*. — Mai; MERRIN. — Juin; MILLIÈRE.
- rosana.** — *Betula alba*, *Acer campestre*, *Tilia europæa*, *Corylus avellana*, *Populus tremula*, *Fagus sylvatica*, *Cratægus oxyacantha*, *Ribes rubrum*, *Rosa*; à toute sa taille commencement de juin.

- sorbiana.** — *Pyrus domestica*, *Prunus cerasus*, *Quercus robur*; mai.
- Lafauryana.** — Sommet des tiges de *Myrica gale*; feuilles terminales, qu'elle réunit; fin juin, commencement juillet.
- semialbana.** — *Prunus cerasus*, *P. domestica* et *P. spinosa*; polyphage; a toute sa taille les quinze premiers jours de mai.
- corylana.** — Sur plusieurs espèces d'arbres, particulièrement : *Quercus robur*, *Betula alba*, *Corylus avellana*; bois feuillus; mai.
- ribeana.** — *Betula alba*, *Ribes rubrum*, *Ulmus campestris*; fin mai.
- cinnamomeana.** — *Fagus sylvatica*, *Larix europæa*, etc.; mai; MERRIN.
- hoparana.** — *Quercus robur*, *Fagus sylvatica*, *Betula alba*, *Salix capræa*, *Syringa vulgaris*; se transforme à la mi-juin.
- dumetana.** — Plantes basses; mai; MERRIN.
- lecheana.** — *Quercus robur*, *Acer campestre*; les arbres fruitiers; mai. — *Lonicera periclymenum*, *Salix*; avril; MERRIN.
- inopiana.** — Racines d'*Artemisia campestris*; septembre; MERRIN.
- histrionana.** — *Pinus picea*; juin.
- musculana.** — *Betula alba*, *Salix capræa*; septembre; passe l'hiver et se chrysalide en mars.
- unifasciana.** — *Ulmus campestris*, *Cratægus oxyacantha*; juin.
- strigana.** — *Artemisia campestris*; en juin et juillet.
- diversana.** — Polyphage, sur les arbres; mai.
- formosana.** — La chenille doit vivre, dit MILLIÈRE, à la fin de l'hiver, dans les fruits du *Pinus sylvestris*.
- cupressana.** — Sur le Cyprès; mai et juin. — *Juniperus oxycedrus*; MILLIÈRE.
- Mabilliana.** — *Pistacia lentiscus*; réunit les feuilles en paquet; en août; a plusieurs générations successives; RAGONOT.
- polytana.** — *Coriaria myrtifolia*; MARTORELL; en mai.
- cinctana.** — *Anthyllis vulneraria*; mai? MERRIN.
- rigana.** — Lie les feuilles des Clématites; au printemps; MILLIÈRE.
- ministrana.** — *Betula alba* et, ajoute JOURDHEUILLE, les *Rhamnus*; fin août jusqu'au milieu de septembre, octobre; passe l'hiver; se chrysalide fin mars.
- bifasciana.** — *Conus* et *Rhamnus*; dans les fruits; octobre.
- Conwayana.** — *Ligustrum* et *Berberis*; dans les baies; se chrysalide en dehors, sous une toile blanche; octobre.
- Bergmanniana.** — Rosiers des jardins; en avril et mai.
- Læfingiana.** — *Quercus robur*; entre les feuilles pliées; mai.

- viridana.** — Principalement *Quercus robur*; se transforme fin mai; ronge les feuilles.
- proaubana.** — *Arbutus unedo*, *Asphodelus ramosus*, *Rosmarinus officinalis*, plusieurs espèces d'*Euphorbia*, *Thymus vulgaris*, *Robinia pseudo-acacia*, *Rhus coriaria*, *Pistacia lentiscus*, *Passerina thymelæa*, *Smilax aspera* et diverses *Aristolochia*; janvier.
- croseana.** — *Pistacia lentiscus*, *Dorycnium suffruticosum*; feuilles en paquets; il faut la chercher seulement en mars et avril.
- Fosterana.** — *Hedera helix*, *Lonicera periclymenum*, etc.; mars, avril, mai, juin; MERRIN.
- viburniana.** — Dans les pousses des *Alisma plantago*, *Ranunculus acris*, *Caltha palustris*, *Ononis spinosa*; juillet.
- unicolorana.** — *Asphodelus ramosus*; mars; MILLIÈRE.
- paleana.** — *Plantago* et presque toutes les plantes basses; mai, juin; MERRIN.
- hyerana.** — Dans les tiges d'*Asphodelus ramosus*; vit aussi des feuilles; se métamorphose en avril, hors de la plante; MILLIÈRE.
- Rolandriana.** — *Veratrum album*; CATAL. DE VIENNE.
- angustiorana.** — *Laurus nobilis* observée aussi sur le *Prunus lauro-cerasus*; a toute sa grosseur en mars.
- pillariana.** — Polyphage, mais préfère la Vigne; on la trouve sur le *Stachys germanica*, *Asclepias vincetoxicum*, *Iris fœtidissima*. — Les œufs éclosent premiers jours d'août, les chenilles se cachent alors pour hiverner jusqu'au printemps; de fin avril, au commencement de mai; à Cannes, se chrysalide en juillet.
- grotiana.** — *Cratægus oxyacantha*; BERCHSTEIN; en septembre.
- gnomana.** — Polyphage; bois feuillus; mai.
- germingani.** — *Vaccinium uliginosum*; mai. — *Statice armeria*, *Asphodelus*, etc.; MERRIN.
- prodromana.** — *Potentilla anserina*; juillet.

## SCIAPHILA

- lengana.** — Presque toutes les plantes basses; mai et juin; MERRIN.
- penziana.** — Les *Sedum alsinefolium*, *album*, *stellatum* et quelquefois *Sempervivum arachnoideum*; juin et juillet.
- chrysantheana.** — Diverses plantes; juin; MERRIN.

- Wahlbomiana.** — *Solidago virgaurea*, *Melampyrum sylvaticum*, *Lysimachia vulgaris*; mai, juin.  
**nubilana.** — *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*; mai.

## DOLOPLOGA

- punctulana.** — Sur le *Ligustrum* et le *Lonicera xylosteum*; juillet.

## GHEIMATOPHILA

- tortricella.** — *Quercus robur*; juin et juillet.

## EXAPATE

- congelatella.** — Les *Salix*, principalement le *Salix purpurea*, Cerfeuil sauvage, arbres fruitiers; mai et juin; JOURDHEUILLE. — Pousses terminales du *Prunus spinosa* et du *Ligustrum vulgare*, *Ulmus*, *Mespilus*, *Rubus idæus*; FREY.

## OLINDIA

- ulmana.** — *Ficaria ranunculoides*; au commencement du printemps.

## COCHYLIS

- hamana.** — *Ononis repens*? mai et juin; MERRIN.  
**zoegana.** — Racines de *Scabiosa columbaria*, *Centaurea nigra*, etc.; avril; MERRIN.  
**procerana.** — Têtes de *Dipsacus*; en mars.  
**zebrana.** — Dans les fleurs d'*Helichrysum arenarium*; juillet.  
**Simoniana.** — Vit sur le *Dorycnium*; MARTORELLI.  
**maculosana.** — Framboisier; septembre; MERRIN. — Fleurs naissantes du *Chondrilla juncea*; mai; MILLIÈRE. — Graines de la Jacinthe des bois; *Endymion nutans*; RAGONOT. — La chenille hiverne et ne se transforme qu'au printemps.  
**Schreibersiana.** — Sous l'écorce des grands Peupliers et des Ormes; janvier et février.  
**griseana (ulana).** — Tiges de l'*Alisma plantago*; avril; MERRIN.  
**vectisana.** — *Plantago maritima*; mai et août; MERRIN.  
**cruentana.** — *Salix capræa*; avril et mai.  
**sanguisorbana.** — Dans les graines de *Sanguisorba officinalis*; juin.  
**ambiguella.** — Dévaste les vignes; au printemps dans les fleurs, à l'automne dans les grappes.

- straminea.** — Têtes de *Centaurea nigra*; septembre et octobre; MERRIN.
- alternana.** — Têtes de *Centaurea scabiosa*; septembre et octobre; MERRIN.
- hilarana.** — Tiges boursoufflées en forme de galle d'*Artemisia campestris*; à environ 3 centimètres de terre; mai.
- dipoltella.** — Dans les ombelles d'*Achillea millefolium* qu'elle attache par des fils; janvier et février.
- zephyrana.** — *Eryngium campestre*; tiges inférieures et racines; mai.
- æneana.** — Racines de *Senecio Jacobæa*; mars; RAGONOT.
- rutilana.** — *Juniperus*; dans une toile entre les aiguilles; mars.
- aleella.** — Racines de *Picris hieracioides*; de septembre à avril; MERRIN.
- badiana.** — Dans les racines et les tiges de *Trifolium* et de *Cirsium*; juillet.
- Kindermanniana.** — Dans l'extrémité des pousses d'*Artemisia campestris*; juin.
- sanguinana.** — Tiges d'*Eryngium campestre*; TREITSCHKE; passe l'hiver; a toute sa taille en juin.
- francillana.** — Dans les tiges mortes l'année précédente du *Daucus carota*, *Ferula nodiflora* et de *Eryngium campestre*; mai.
- flagellana.** — Dans les tiges mortes de l'année précédente.
- dilucidana.** — Tiges de *Pastinaca sativa*; septembre et octobre.
- Smeathmanniana.** — Ombelles de l'*Achillea millefolium*; hiverne; octobre; FOUCARD.
- moguntiana.** — Dans l'extrémité des pousses de l'*Artemisia campestris*; juin.
- implicitana.** — *Anthemis cotula.* — Fleurs de *Gnaphalium*, *Pyrethrum inodorum*, *Tanacetum*, *Artemisia*, *Solidago virgaurea*; octobre.
- ciliella.** — Graines de *Primula*; dans les prairies; juin.
- phaleratana.** — *Solidago virgaurea*; dans les fleurs réunies; octobre.
- purpuratana.** — Têtes de *Dipsacus*; printemps; FALLOU.
- roseana.** — Tiges de *Dipsacus*; d'octobre à avril; MERRIN.
- roseofasciana.** — *Cirsium*; MILLIÈRE.
- rupicola.** — *Chrysocoma linosyris*; dans les fleurs où elle hiverne; octobre.
- purpuratana.** — La chenille vit aux dépens du *Chondrilla juncea*; se tient parmi les fleurs, s'y transforme souvent; MILLIÈRE.

- Manniana.** — Dans les tiges de *Mentha sylvestris*; mai.  
**notulana.** — Tiges de *Mentha sylvestris*; endroits tourbeux; mai.  
**curvistrigana.** — Fleurs de *Lactuca muralis*; juillet; MERRIN.  
**ambiguana.** — Dans les chatons du *Betula alba*; mars.  
**hybridella.** — Tiges de *Carduus*; se chrysalide; septembre. — *Sonchus oleraceus*; G. BARRETT.  
**posterana.** — Dans les fleurs de *Centaurea*, *Carduus nutans*, *Lappa tomentosa*; se chrysalide en terre; octobre, juin; MILLIÈRE.  
**atricapitana.** — Tiges de *Senecio*; septembre.  
**dubitana.** — Fleurs de *Senecio Jacobæa*, *Cirsium lanceolatum*, *Picris hieracioides*, *Hieracium murorum* et *H. umbellatum*; juin, septembre.

## PHTEOCHROA

- rugosana.** — *Bryonia dioica*; dans les baies attachées; septembre; JOURDHEUILLE. — *Ecballion elaterium*; tiges; janvier; il est bon de chercher la chenille sur l'arrière-saison; MILLIÈRE.

## RETINIA

- duplana.** — Sapins; *inus sylvestris*; août; MERRIN. — Attaque le fruit; DUPONGHEL.  
**sylvestrana.** — Bourgeons de *Pinus sylvestris*; septembre; MERRIN.  
**pinivorana.** — Dans les bourgeons de *Pinus sylvestris*; avril.  
**turionana.** — Boutons et bourgeons du *Pinus sylvestris*; en mars et en avril.  
**buoliana.** — Bourgeons du pin qu'elle courbe et empêche de croître; mars, avril et mai.  
**tessulatana.** — Vit dans l'intérieur des cônes de Cyprès; en hiver; MARTORELL.  
**margarotana.** — Cônes des Pins; MARTORELL.  
**resinella.** — *Pinus sylvestris*; hiverne dans les amas de résine des Pins; elle a atteint toute sa taille en octobre; se chrysalide, janvier, février et mars.  
**pollinis.** — La chenille vit en mars et avril mêlée au pollen du *Pinus maritima*; MILLIÈRE.

## PENTHINA

- profundana.** — *Quercus robur*; juin.

- Schreberiana.** — Chenille sur *Prunus padus*; DE PEYERIMHOFF.
- salicella.** — Différentes espèces de *Salix* et de *Populus*; mai, juin.
- semifasciana.** — *Salix* à feuilles velues; juin.
- scriptana.** — *Salix*; mai.
- capreana.** — *Salix*; avril, mai.
- corticana.** — *Betula alba*; mai.
- betulæta.** — *Betula alba*; mai.
- sororculana.** — *Betula alba*; juillet.
- sauciana.** — *Vaccinium*; août; MERRIN.
- variegana.** — Toutes espèces d'arbres fruitiers, le *Quercus robur*, le *Prunus spinosa*; mai. — A deux époques; MILLIÈRE.
- pruniana.** — *Prunus domestica*, *P. spinosa*, *P. cerasus*; les arbres fruitiers, les *Salix*; commencement d'avril mai.
- ochroleucana.** — *Rosa centifolia*; mai.
- dimidiana.** — Bouleaux et Tilleuls; septembre.
- oblongana.** — Têtes de *Dipsacus*; mars
- sellana.** — Têtes de *Cirsium* et *Dipsacus*; juin. — Le *Dipsacus fullonum* particulièrement.
- gentiana.** — *Dipsacus fullonum*; hiverne de novembre à avril; MERRIN.
- nigricostana.** — Racines de *Stachys*; septembre, octobre à mars; MERRIN.
- fuligana.** — *Stachys*; mai; MERRIN.
- lapideana.** — Dans les racines de *Digitalis ambigua*; avril.
- postremana.** — Hiverne dans les racines d'*Impatiens*; s'y métamorphose; janvier et février.
- scitulana.** — Sur le *Vaccinium myrtillus*; mai.
- arbutella.** — *Vaccinium*; tord les bourgeons; avril; MERRIN. — *Arbutus unedo*; en hiver et au premier printemps; MILLIÈRE.
- myrgindana.** — Bourgeons de *Myrica* et de *Vaccinium*; avril; MERRIN.
- rufana.** — *Helianthemum vulgare*; avril; MERRIN.
- siriana.** — Racine du *Taraxacum dens-leonis*.
- branderiana.** — Entre les feuilles du *Populus tremula*; mai.
- astrana.** — *Polygonum bistorta*; juin et juillet.
- Schulziana.** — *Pinus sylvestris*; mai; MERRIN.
- arcuella.** — Troncs des *Corylus avellana* malades; TREITSCHKE.
- rivulana.** — *Galium*, *Alnus glutinosa*; avril? MERRIN.
- urticana.** — Sur plusieurs espèces d'arbres et arbrisseaux: *Ulmus campestris*, *Betula alba*, *Salix alba*, *Vaccinium myrtillus*, *Rubus fruticosus*; tout le mois de mai.

- lacunana.** — Polyphage ; mai.  
**bipunctana.** — Sur les *Vaccinium* ; mai.  
**hercyniana.** — Entre les aiguilles des Sapin ; se chrysalide en terre ; mai.  
**achatana.** — Entre les feuilles du *Cratægus oxyacantha* et des arbres fruitiers ; mai. — Haies, *Prunus spinosa* ; MILLIÈRE.  
**antiquana.** — Hiverne dans les racines du *Stachys arvensis* ; janvier et février.

## ASPIIS

- Uddmanniana.** — *Rubus idæus*, *R. fruticosus* ; dans les feuilles attachées ; mai, juin.

## APHELIA

- lanceolana.** — Tiges de Cypéracées ; avril ; MERRIN.  
**littorana.** — *Armeria plantaginea* ; mai et juin ; MERRIN.  
**venosana.** — *Cyperus longus* ; G. LAFAYE.

## EUDEMIS

- botrana.** — *Rosmarinus officinalis*, accidentellement ; sa vraie nourriture est la Vigne et le *Daphne gnidium* ; dans le milieu de la fleur. — En août et septembre ; MILLIÈRE.  
**artemisiana.** — *Anchusa officinalis*.  
**bicinctana.** — *Allium porrum*, dans les semences ; commencement juin, fin juillet, août ; G. ROUAST. — Graines de l'*Odontites lutea* et de l'*Allium schœnoprassum* ; MILLIÈRE.  
**statriceana.** — *Stactis cordata* ; mars, avril, mai, commencement de juin ; les générations se succèdent jusqu'à la fin d'août ; MILLIÈRE.  
**im oniana.** — *Stactis limonium* ; janvier, février, mars. — En été et en automne ; MILLIÈRE.  
**quaggana.** — *Senecio maritimus* ; dont elle ronge les étamines ; en juin ; la première génération ronge les feuilles en mars, et les fleurs, en mai.

## LOBESIA

- permixtana.** — ? *Anchusa officinalis* ; juin, septembre.

## ECCOPSIS

- atfasciana.** — Dans des tubes de soie, sous la Mousse des arbres ; mai.

## ACROCLITA

**consequana.** — *Euphorbia characias*; éclôt en novembre, a toute sa grosseur fin janvier ou commencement février; MILLIÈRE ajoute: et sur la plupart des *Euphorbia* du littoral. — Avril et juin; CATAL. ALPES-MARIT.

## PETALEA

**Klugiana.** — Dans les feuilles supérieures de *Pæonia rosea*; avril.

**festivana.** — Doit vivre, dit MILLIÈRE, aux dépens du *Corylus avellana*.

## GRAPHOLITHA

**grandævana.** — Racines des *Tussilago farfara* et *T. petasites*; mars, avril; MERRIN.

**lacteana.** — *Artemisia campestris*; dans une boursoufflure qu'elle produit dans la tige; octobre.

**Hohenwartiana.** — On croit qu'elle vit sur l'*Hypericum quadrangulum*; TREITSCHKE. — *Cirsium lanceolatum*; JOURDHEUILLE.

**Scopoliana.** — Hiverne dans les têtes de Chardons, s'y chrysalide; janvier et février, mai.

**æmulana (latiorana).** — *Solidago virgaurea*; dans les fleurs; se chrysalide sur terre; octobre.

**hepaticana.** — *Senecio sylvaticus* et *S. sarracenicus*; dans les tiges; octobre; JOURDHEUILLE.

**tedella.** — Entre les aiguilles des Pins et des Sapins, dans une toile; octobre.

**demarniana.** — Dans les chatons de *Betula* et de *Populus*; avril.

**subocellana.** — *Salix capræa*; sous les feuilles; mi-septembre, octobre.

**nisella.** — Sur les chatons de Peupliers et de Saules, puis devient polyphage; mai.

**Penkleriana.** — Chatons du *Corylus avellana* et des *Alnus*; bourgeons qui se flétrissent; mars, avril; RAGONOT.

**ophthalmicana.** — *Populus tremula*; mai.

**Solandriana.** — *Corylus avellana*, *Betula alba*, *Populus tremula*, *Salix capræa*, Peupliers et Aulnes; se transforme vers la fin de juin.

- semifusciana.** — *Spiræa ulmaria* et *Salix* malades ; juin ; MERRIN.
- sordidana.** — *Alnus* ; mai.
- bilunana.** — Chatons des *Alnus* et des *Betula* ; avril.
- tetraquetrana.** — *Betula alba* ; se transforme milieu de septembre.
- immundana.** — *Betula alba*, *Alnus glutinosa* et *A. incana* ; feuilles ; avril, mai.
- similana.** — *Betula alba*, *Corylus avellana*, *Alnus* ; mai.
- thapsiana.** — Vit en juillet, sur le *Thapsia garganica* et autres Om-bellifères.
- incarnatana.** — Chenille sur le *Betula alba*. — Mai ; MERRIN.
- suffusana.** — *Cratægus oxyacantha* ; mai ; GUÉNÉE.
- rosæcolana.** — *Rosa* ; mai ; MERRIN.
- tripunctana.** — Boutons de Rosiers ; commencement de juin.
- cynosbana.** — *Rosa canina* ; bourgeons ; avril, mai et juin.
- Pflugiana.** — Tiges des *Carduus* ; mars.
- cirsiana.** — Hiverne dans les tiges de *Cirsium palustre*, *Scabiosa*, *Carduus* ; s'y chrysalide ; janvier et février. — Mars, avril ; MERRIN.
- trigeminana.** — *Senecio* ; août et septembre ; MERRIN.
- brunnichiana.** — *Tussilago farfara* ; tiges ; en mars.
- turbidana.** — Racines de *Petasites vulgaris* ? avril ; MERRIN.
- fænella.** — Racines et rameaux de l'*Artemisia vulgaris* ; commencement du printemps ; se chrysalide dans les racines.
- citrana.** — *Achillea millefolium* ; RAGONOT ; septembre.
- pupillana.** — Tiges des *Carduus* ; mars. — *Artemisia absinthium* ; LINNÉE.
- incana.** — *Artemisia campestris* ; boursofflure des tiges ; octobre.
- conterminana.** — *Artemisia campestris*. — Sur les fleurs des *Lactuca virosa*, *scariosa*, et Salades des jardins ; juillet.
- Sapidiscana.** — *Solidago virgaurea*, *Chrysocoma linosyris* ; tubes de soie entre les fleurs ; octobre.
- hypericana.** — *Hypericum perforatum* ; dans les fleurs et les graines, entre les feuilles attachées ; mai, juin.
- albersana.** — *Lonicera periclymenum* ; octobre.
- tenebrosana.** — Dans les gousses des Pois et des Vesces ; septembre, octobre.
- nebritana.** — Dans les gousses de *Pisum sativum* ; août.
- roseticolana.** — En automne, dans les baies du Rosier ; DE PEYERIMHOFF. — Octobre ; JOURDHEUILLE.

- funebrana.** — Pruniers, Mirabelliers, Prunelliers, dont elle dévore les fruits; DE PEYERIMHOFF. — Dévore la chair de tous les fruits à noyaux, surtout les Prunes; août, septembre, octobre, et une autre génération en mai, dans les tiges.
- adenocarpi.** — Dans les gousses de l'*Adenocarpus complicatus*; en juin, puis en septembre; s'élève avec les gousses du *Sarothamnus scoparius*; RAGONOT.
- micaceana.** — *Ulex europæus*.
- succedana.** — Gousses de l'*Ulex*; en août. — Pousses de *Cytisus nigricans* dont elle mange les fruits verts, et aussi sur *Cytisus sagittalis* et *Ulex*; JOURDHEUILLE. — Larve au printemps, sur les *Cytisus*; MILLIÈRE.
- Servillana.** — *Salix capræa*; dans une boursofflure des branches, y hiverne et s'y chrysalide; octobre.
- microgrammana.** — *Ononis*? septembre; MERRIN.
- Strobilella.** — Dans les pommes de Pins; en automne; passe l'hiver et se chrysalide en juin.
- juniperana.** — Dans les graines de *Juniperus communis* et *J. oxycedrus*; janvier et février; s'y chrysalide vers la fin d'avril; MILLIÈRE.
- corollana.** — Hiverne dans une boursofflure qu'elle produit dans les branches du *Populus tremula*; janvier et février.
- cosmophorana.** — Sous les écorces de *Pinus abies*; en compagnie de la *Retinia resinella*; janvier, février, mars. — Selon MERRIN, elle ne vivrait pas que sur l'*Abies excelsa*, mais sur le Pin d'Ecosse et, dit-on, dans la résine.
- coniferana.** — Sous les écorces de *Pinus sylvestris*; janvier et février. — Mars, avril; MERRIN.
- pactolana.** — Sous les écorces de *Pinus abies*; janvier à mars.
- Weberiana.** — Vit aux dépens de la sève de plusieurs arbres fruitiers, tels que *Cerasus*, *Prunus*, *Armeniaca*, *amygdalus*; sous les écorces des arbres malades; avril, mai.
- ruffillana.** — Dans les ombelles des Carottes sauvages; s'y fait des tubes de soie et se nourrit des graines; septembre, octobre.
- weirana-hexana.** — *Fagus sylvatica*; août et septembre; MERRIN.
- nitidiana.** — *Quercus robur*; de septembre à mai; MERRIN.
- leplastriana.** — Tiges de *Brassica oleracea*; depuis octobre à mars, ou avril; MERRIN.
- uplicana.** — Dans l'aubier des *Pinus*; janvier et février.

- perlepidana.** — *Orobus niger* ; DE TISCHER. — Entre les feuilles ; se chrysalide en terre ; juillet.
- pallifrontana.** — Dans les gousses vertes de l'*Astragalus glycyphyllos* ; août.
- leguminana.** — *Alnus glutinosa* ; août ? MERRIN.
- dorsana.** — Dans les siliques des Pois et des Vesces ; septembre. — *Orobus tuberosus* ; mai, juin ; BARRETT.
- orobana.** — Gousses de *Vicia cracca* ; août et septembre ; MERRIN. — *Vicia sylvatica* ; BARRETT.
- aurana.** — Graines des Ombellifères ; juillet ; MERRIN.

## CARPOCAPSA

- pomonella.** — Intérieur des pommes, des poires et des noix ; la chenille hiverne ; a toute sa taille fin juillet, commencement d'août, septembre.
- grossana.** — Dans les faines ; septembre. — Glands des Chênes verts ; se chrysalide dans les feuilles sèches ; MILLIÈRE.
- splendana.** — Dans les châtaignes et les glands ; septembre. — Dans les glands tombés ; JOURDHEUILLE. — Les noix, les amandes, etc. ; MILLIÈRE.
- amplana.** — Dans les glands ; passe l'hiver dans la mousse et ne se chrysalide qu'en juin suivant.

## COPTOLOMA

- janthinana.** — Fruits malades du *Cratægus oxyacantha* ; septembre.

## PHTOROBLASTIS

- fimbriana.** — Dans le bois des Chênes pourris ; octobre.
- argyrana.** — Mousses des arbres et écorces ; octobre.
- costipunctana.** — Dans les galles du *Sorbus torminalis* ; à l'extrémité des rameaux des jeunes Chênes ; janvier, février.
- Juliana.** — Dans les glands ; RAGONOT.
- spiniana.** — *Cratægus oxyacantha*, *Prunus spinosa* ; mai ; MERRIN.
- populana.** — *Salix capræa* ; mai et juin.
- regiana.** — Sous l'écorce du Sycomore ; d'octobre à mars ; MERRIN.
- rheldiella.** — Dans les fruits verts, *Cratægus oxyacantha* ; septembre.

## TMETOCERA

**ocellana.** — *Carpinus betulus*; Chêne et Aulne; mai; arbres fruitiers.  
**lariciana.** — *Larix europæa*.

## STEGANOPTYCHA

- aceriana.** — Dans les bourgeons de *Populus* qu'elle creuse; mai.  
**incarnana.** — *Corylus avellana*, Cerisiers; mai. — Sur les *Populus* et les *Salix*; JOURDHEUILLE.  
**neglectana.** — Écorces des *Salix* et des *Populus*; mai; MERRIN.  
**simplana.** — *Populus tremula*; mai. — Chenille en octobre; DE PEYERIMHOFF.  
**nigromaculana.** — *Senecio*; août et septembre; MERRIN.  
**ramella.** — *Betula alba*, *Populus*; dans les chatons; avril.  
**altheana.** — Au cœur des plantes de *Lavatera arborea*; janvier et février; plie les feuilles dont elle se nourrit; MILLIÈRE.  
**oppressana.** — *Populus*; septembre; MERRIN.  
**corticana.** — *Quercus robur*; entre les fenilles et dans les galles du *Sorbus torminalis*; mai, juin.  
**signatana.** — *Prunus padus*; mai; MERRIN.  
**Ratzburgiana.** — *Abies excelsa*; pousses terminales et aiguilles; mai et juin; MERRIN.  
**nanana.** — Dans les aiguilles de Sapins, s'y chrysalide dans une toile blanche; octobre.  
**ustomaculana.** — *Vaccinium*; avril, mai; MERRIN.  
**vacciniana.** — *Vaccinium myrtillus*, *Berberis vulgaris*; entre les feuilles; octobre.  
**fractifasciana.** — Têtes de *Scabiosa*, prairies sèches; août.  
**quadrana.** — *Scabiosa arvensis*, *Centaurea cyanus*; mai; MERRIN.  
**mercuriana.** — *Dryas octopetala*; mai, juin et septembre; MERRIN.  
**cruciana.** — Dans les bourgeons des *Salix* et plus tard dans les rameaux; avril, mai.  
**trimaculana.** — Entre les feuilles d'*Ulmus campestris*; mai. — La chenille vit en mars; chaton de *Corylus avellana*; se transforme en terre; fin avril; MILLIÈRE.  
**minutana.** — *Populus alba*; se transforme au pied de l'arbre; à fin mai, commencement juin a toute sa grosseur; et aussi, dit MILLIÈRE, sur le *Salix viminalis*; lie les feuilles supérieures.

## PHOXOPTERYX

- Mitterbacheriana*. — *Quercus robur*; entre les feuilles où elle hiverne.
- upupana*. — *Quercus robur*, *Betula alba*; septembre; MERRIN.
- lætana*. — *Populus tremula*; août et septembre. — En mai; JOURDHEUILLE.
- tineana*. — Sur les *Cratægus*; octobre.
- curvana*. — *Pyrus malus* et *P. communis*, *Cratægus oxyacantha*;  
C. LAFAURY.
- biarcuana*. — *Salix*; août; MERRIN.
- diminutana*. — *Salix*; août; MERRIN.
- uncana*. — Sur les Bruyères; avril. — *Myrica gale*; MERRIN.
- unguicella*. — Sur les Bruyères; en avril.
- siculana*. — *Rhamnus frangula*, *Cornus*, *Ligustrum*; entre les rameaux; septembre et octobre. — Selon JOURDHEUILLE, en juin.  
— Passe l'hiver, se chrysalide au printemps. ANN. SOC. BELGE.
- comptana*. — *Potentilla cinerea*; entre les feuilles; octobre.
- lundana*. — *Trifolium*, *Vicia*; août à avril; MERRIN.
- myrtillana*. — *Vaccinium*; juillet, septembre; MERRIN.
- derasana*. — *Rhamnus frangula*; août, septembre; MERRIN.

## RHOPOBOTA

- nævana*. — *Vaccinium vitis*, *Vitis idæa* et *V. myrtillus*; polyphage; mai et juin.

## DICHORAMPHA

- Petiverella*. — *Achillea millefolium*; septembre, octobre, avril; MERRIN.
- alpinana*. — *Achillea millefolium*, racines; septembre, octobre.
- simpliciana*. — Dans les racines d'*Artemisia vulgaris*; janvier et février. — Avril; MERRIN.
- plumbagana*. — *Achillea millefolium*; septembre, octobre.
- acuminatana*. — *Chrysanthemum leucanthemum*; avril; MERRIN.
- consortana*. — Bourgeons de *Chrysanthemum*; avril; MERRIN.
- plumbana*. — *Artemisia abrotanum*; mai. — Gousses des Ajoncs; se chrysalide après l'hiver; JOURDHEUILLE.

## TINEINA

## CHOREUTIS

- dolosana.** — Feuilles minces de *Aristolochia clematidis* ; commencement juillet, mais plus particulièrement en septembre et octobre ; MILLIÈRE, DE PEYERIMHOFF.
- pretiosana.** — *Inula conyza*, principalement *I. Helenium* ; septembre, octobre ; MILLIÈRE.
- Bjerkandrella.** — *Inula conyza* ; du 15 au 30 septembre, quelquefois commencement octobre. — Feuilles radicales des *Carduus carlinæfolius* ; MILLIÈRE.
- Myllerana.** — Entre les feuilles de *Scutellaria galericulata* ; juin et août.

## SIMÆTHIS

- nemorana.** — Vit sur le Figuier ; juillet, commencement août ; ROUAST ; ronge la surface supérieure des feuilles.
- pariana.** — Pommier, Poirier ; ronge la surface supérieure des feuilles ; août et septembre. — Juin ; JOURDHEUILLE.
- oxyacanthella.** — Chenille sur les *Urtica* ; entre les feuilles légèrement attachées ; bois humides ; août. — Avril ; sur *Parietaria officinalis*.

## ATYCHIA

- funeris.** — Vit dans l'intérieur des racines des Graminées ; surtout les *Andropogon* ; avril et mai ; MARTORELL.

## TALÆPORIA

- pubicornis.** — Mai ; MERRIN.
- politella.** — Vit de Lichens de rochers et probablement de Lichens du *Fagus sylvatica* où on trouve les fourreaux ; avril et mai.
- pseudobombycella.** — Lichens des rochers, probablement Lichens des *Fagus sylvatica*, *Carpinus betulus* déjà gros ; hiverne, parvient à toute sa taille en mai et se chrysalide du 1<sup>er</sup> au 10 juin.

- conspurcatella.** — Sa chenille éclôt en été et doit se transformer en hiver; fourreau coniforme composé de soie et de grains de sable fin; MILLIÈRE.
- lapidella.** — Sur les rochers, les vieux murs, les troncs d'arbres, recouverts de Lichens; fourreau légèrement recourbé en corne; mai.
- tabulella.** — Sur les vieilles barrières; fourreau ovoïde, station horizontale; se chrysalide à la fin de mai; JOURDHEUILLE.

## SOLENOBIA

- clathrella.** — Fourreau gros et très renflé, de forme à peu près ovoïde, avec trois arêtes obtuses faiblement indiquées, presque triangulaire; Lichens des vieux bois et des pierres.
- pineti.** — Côté ombragé des vieilles palissades, sur les murs et les arbres au nord; se cache avec soin dans les moindres fissures; fourreau triangulaire; janvier et février. — Ecllosion fin mars, avril.
- triquetrella.** — Sur les Lichens des palissades, toujours près de la terre; fourreau triangulaire; janvier et février; JOURDHEUILLE. — Se chrysalide au mois d'avril; BRUAND.
- inconspicuella.** — Fourreaux à extrémité plus obtuse que celui du *S. triquetrella* et de couleur plus noirâtre; cela tient, dit BRUAND, probablement à la couleur même des rochers où ils vivent, et des Lichens dont ils se nourrissent.

## LYPUSA

- maurella.** — Sur les Lichens; avril.

## PSILOTHRIX

- Dardoinella.** — Fourreau fusiforme, recouvert de nombreuses petites feuilles sèches; semble polyphage; n'atteint toute sa grosseur qu'à la fin de juin, après avoir passé l'hiver.

## MELASINA

- ciliaris.** — *Hippocrepis comosa*; juin, juillet, août. — MILLIÈRE suppose qu'elle préfère les *Rumex* et les *Leontodon*; fourreau tubuliforme, atténué inférieurement, légèrement arqué, composé de grains de sable et de terre.

**lugubris.** — Sur plusieurs plantes basses et arbrisseaux ; elle préfère *Onobrychis sativa*, *Erica scoparia*, les *Cistus* ; fourreau allongé, cylindrique, tubuliforme, grisâtre, tissu de soie grise et recouvert de grains de sable et de parcelles rocheuses ; septembre ; passe l'hiver et a tout son développement fin mai ; à Cannes, fin juillet.

## DIPLODOMA

**marginepunctella.** — FOLOGNE croit qu'elle vit d'insectes ; selon JOURDHEUILLE, sur les Lichens au pied des arbres ; se cache dans les rides des écorces ; mai.

## XYSMATODOMA

**melanella.** — Sur les vieilles palissades, les troncs ; fourreau en mai et juin. — Ronge les Lichens des *Quercus robur* ; elle traîne un petit sac ou capuchon coniforme ; MILLIÈRE.

## EUPLOCAMUS

**anthracinalis.** — Racines pourries du *Fagus sylvatica* et les bois pourris ; janvier et avril.

## SCARDIA

**boleti.** — Champignons des *Salix*, *Tilia*, *Quercus* ; depuis l'automne jusqu'au printemps.

## MOROPHAGA

**morella.** — Dans une excroissance du Mûrier blanc ; BARTHELEMY.

## BLABOPHANES

**imella.** — Dans les débris animaux ; V. HEYDEN. — Étoffes de laines abandonnées dans les champs ; octobre.

**ferruginella.** — Vit au dépens des lainages ; FOUCARD. — Étoffes de laine ; JOURDHEUILLE ; en août.

**rusticella.** — Tapis, peaux ; en août. — Janvier et février ; MERRIN.

## TINEA

**fulvimitrella.** — Poils, plumes, ossements ; septembre.

- tapetzella.** — Étoffes de laines, fourrures, plumes, insectes, sabot pourri de cheval; passe l'hiver et se chrysalide au printemps suivant.
- arella.** — Chenille dans les bois pourri; juin et fin août; sur les lisières des forêts; H. FREY.
- corticella.** — Bolets, dans les Champignons du *Fagus sylvatica*; octobre.
- parasitella.** — Champignons du *Salix*, bois pourri; octobre. -- Avril; MERRIN.
- arcuatella.** — Dans les Bolets et le bois pourri; octobre.
- picarella.** — Vieux Bolets des *Quercus*; DE PEYERIMHOFF.
- nigrabella.** — Bolets des vieux *Fagus sylvatica*; octobre.
- quercicolella.** — Dans les Bolets ligneux du *Quercus robur*; octobre. — Suivant BRUYAT, dit MILLIÈRE, la chenille vit aux dépens des Champignons desséchés du Méléze, sur les troncs privés de vie.
- granella.** — Blé dans les greniers, bois pourri; mai. — Octobre; JOURDHEUILLE.
- cloacella.** — Blé, Orge, Seigle; mai; d'autres passent l'hiver. — Bois pourri; MERRIN.
- albipunctella.** — Branches pourries; avril; MERRIN.
- caprimulgella.** — Dans le bois pourri de *Fagus sylvatica*, *Quercus robur*; janvier et février.
- Roesslerella.** — Sur les rochers; mai.
- nigripunctella.** — Le fourreau se trouve sur les vieux murs; avril. — Selon H. FREY, qui lui attribue deux générations, elle vivrait sur le *Parietaria officinalis*; en juillet et mai.
- parietariella.** — Mousses sur les murs humides; sac cylindrique en soie recouvert en haut de parcelles végétales très minces.
- misella.** — Tiges des Fèves; septembre, octobre; MERRIN. — Dans les bûchers, où sa chenille, dit MILLIÈRE, vit aux dépens des petites mammifères morts, dont elle ronge les poils.
- fuscipunctella.** — Vit de débris de toute espèce; détritux et immondice; août
- pellionella.** — Préfère les fourrures, mais s'accommode de toute substance animale; sa transformation a lieu en juin et la seconde éclosion passe l'hiver et se chrysalide au printemps. — Se fait un tube de soie, dans les peaux, les lainages; août.
- pallescentella.** — Peau de lapin, de lièvre et de chat; mai, juin; MERRIN.
- merdella.** — Dans les fourrures; octobre, novembre; MERRIN.

- lapella.** — Dans les Bolets; octobre; nids d'oiseaux.  
**semifulvella.** — Intérieur des nids d'oiseaux; octobre.  
**vinculella.** — Rochers et vieux murs; fourreau aplati, couvert de sable; juillet. — Mars et avril; MILLIÈRE.  
**argentimaculella.** — Lichens des murs et des rochers ombragés; juillet.

## PHYLLOPORIA

- bistrigella.** — Jeunes *Betula alba*; fin juillet, commencement août.

## TINEOLA

- biselliella.** — Dans le crin des meubles, les lainages; se fait un fourreau composé de débris; a toute sa taille en mars. — JOURDHEUILLE; en août.  
**bipunctella.** — Insectes desséchés, lainages, etc. RAGONOT.

## MYRMEGOCELA

- ochraceella.** — Fourmilière; octobre. — Avril; MERRIN.

## LAMPRONIA

- morosa.** — Rosier sauvage; bourgeons; avril.  
**luzella.** — Mai; MERRIN.  
**prælatella.** — Fourreau plat, d'un vert blanchâtre; sous les feuilles de Fraisier et de Spirée. — *Fragaria vesca*, *Geum urbanum*; Soc. ENTOM. FRANÇ. — Selon RAGONOT, elle vit jusqu'au printemps.  
**rubiella.** — *Rubus idæus* et autres Ronces ainsi que les Rosiers; pousses terminales; en mai, après avoir passé l'hiver.

## INGURVARIA

- muscalella.** — Sous les feuilles sèches; dans sa jeunesse mine les feuilles du *Quercus robur*, *Cratægus oxyacantha*; tout l'hiver; au commencement d'octobre elle a toute sa taille; se chrysalide au printemps suivant. — *Rosa*; MERRIN.  
**pectinea.** — Sous les feuilles sèches, même en mai; les feuilles du *Betula alba*; puis se découpant un fourreau, se laisse tomber à terre; janvier et février. — Mai; JOURDHEUILLE.  
**Koernerella.** — Sous les feuilles sèches; mine en mai le *Fagus sylvatica*; il faut la chercher en automne ou en hiver.

**capitella.** — Les *Ribes*, dont elle dévore la moelle; mai.

**Ehmanniella.** — Sous les feuilles mortes du *Populus fastigiata*; se nourrit de diverses sortes de plantes; commencement du printemps. — D'octobre à février; MERRIN.

## CRINOPTERYX

**familiella.** — *Cistus salviæfolius*; a toute sa taille fin janvier, commencement février; mineuse d'abord, se fabrique ensuite un fourreau.

## NEMOPHORA

**Swammerdammella.** — Mine d'abord les feuilles du *Fagus sylvatica* et du *Quercus robur*; vit ensuite sur les plantes basses, dans un fourreau; mai.

**pilulella.** — Dans un fourreau de feuilles du *Vaccinium*; dans les bois de Pins, sous les pierres; janvier et février.

## ADELA

**fibulella.** — Dans un fourreau, au pied du *Veronica chamædryis*, après avoir vécu dans les capsules; janvier et février; il faut la chercher en août et septembre.

**rufimitrella.** — Sous les *Sisymbrium alliaria*, *Cardamine pratensis*. — Fourreaux bivalves, ovales et plats; janvier et février; il faut chercher la chenille en août et septembre.

**viollella.** — *Hypericum perforatum*; fourreaux bivalves, plats, bruns, rétrécis au milieu; août et septembre.

**Ochsenheimerella.** — Dans les feuilles sèches, sous les *Vaccinium*; janvier. — La chenille doit vivre, dit MILLIÈRE, sur l'*Abies pectinata*.

**Degeerella.** — *Anemone nemorosa*; TREITSCHKE; dans les feuilles sèches, dont elle se fait un fourreau; janvier et février. — Mars; MERRIN.

**croesella.** — Dans les feuilles sèches, dont elle se fait un fourreau; janvier et février.

**viridella.** — Sous les feuilles sèches du *Fagus sylvatica* et du *Corylus avellana*; janvier et février.

## NEMOTOIS

**metallicus.** — Sous les *Scabiosa*; endroits exposés au soleil; fourreaux  
Soc. — LINN. T. XXX.

plats, bivalves, formés de morceaux de feuilles; janvier et février; il faut la chercher dans les mois de septembre et d'octobre.

**cupriacellus.** — Sur *Sedum album* et *S. reflexum*; prairies tourbeuses; avril.

**fasciellus.** — *Ballota nigra*; fourreau plat, ovale, allongé, contracté au milieu; en automne ou au printemps.

**minimellus.** — *Scabiosa succisa*; *Sedum album* et *S. reflexum*; fourreau plat, bivalve, ovale, allongé; chenille blanchâtre, à tête noire et au deuxième segment noirâtre; octobre; passe l'hiver, se retrouve en avril.

#### OCHSENHEIMERIA

**taurella.** — Dans les tiges des Graminées; les tiges attaquées blanchissent; avril, mai.

**hederarum.** — Sur les Lierres des chemins creux et frais, aux dépens desquels doit vivre la chenille; MILLIÈRE.

**birdella.** — Graminées, intérieur des tiges; mi-mai. — Février; MERRIN.

**vaculella.** — Bois pourri.

#### TEICHOBIA

**verhuellella.** — Feuilles d'*Asplenium ruta-muraria* et *A. trichomanes*; plus tard, elle se fait un fourreau avec la graine et vit sous les feuilles; janvier et février.

#### ACROLEPIA

**arnicella.** — Mine les feuilles d'*Arnica montana*; se chrysalide sous la feuille; mai.

**vesperella.** — *Smilax aspera*; se métamorphose dans une feuille; en décembre, janvier et février.

**citri.** — Dans l'écorce du fruit du Cédratier; en octobre; MILLIÈRE, RAGONOT.

**assectella.** — Plants d'*Allium porrum* cultivé; feuilles et tiges; fin octobre et mai; G. ROUAST.

**pygmæana.** — *Solanum dulcamara*; mine les feuilles en produisant de grandes plaques brunâtres; se transforme dans un cocon brun,

tressé comme un filet, semblable à celui de l'*A. assectella*; septembre, octobre. — Juin, juillet et octobre; RAGONOT.

**granitella.** — *Inula helenium* et *I. dysenterica*, *Bupthalmum salicifolium*, *B. grandiflorum*; DE ROESLERSTAMM; juin.

**solidaginis.** — La chenille vit en février, à la manière des mineuses, sur les feuilles radicales de l'*Inula helenium*. — STAINTON l'a retrouvée sur l'*Inula dysenterica*; MILLIÈRE.

## ROESLERSTAMMIA

**erxlebella.** — *Tilia*; avril et juillet.

## SCYTROPIA

**cratægella.** — *Pyrus communis*, *Cratægus oxyacantha*, *Prunus spinosa*; vit en société; mai et juin.

## HYPONOMEUTA

**egregiellus.** — *Erica scoparia* et *E. arborea*, *Calluna vulgaris*; par petits groupes sur les rameaux; vers le 15 ou le 20 mars a atteint son entier développement.

**vigintipunctatus.** — *Sedum telephium*; dans les haies, les vignes, les endroits abrités; toile commune; juin et septembre. — Et aussi le *Sedum purpurascens*; MILLIÈRE.

**plumbellus.** — *Rhamnus frangula* et d'autres arbustes plantés en haies, *Evonymus europæus*; mai.

**irrorellus.** — Pruniers; mai.

**padellus.** — Dans une toile, sur les haies de *Prunus spinosa*, *Cratægus oxyacantha*; mai.

**rorellus.** — *Quercus robur*, arbres fruitiers, *Salix*; juin.

**malinellus.** — Pommier.

**cagnagellus.** — *Evonymus europæus*.

**evonymellus.** — *Prunus padus*; couvre de ses toiles les rameaux; depuis mai jusqu'en juillet.

## SWAMMERDAMIA

**combinella.** — *Prunus spinosa*; toile commune, s'y transforme; septembre, octobre.

**cæsiella.** — *Betula alba*, feuilles; en petites colonies; juillet, septembre, octobre.

- griscocapitella.** — *Betula alba*; FISCHER DE ROSLERITAMM.  
**oxyacanthella.** — Dans une toile légère, sur le *Prunus spinosa* et *Cra-*  
*tægus oxyacantha*; mai. — Octobre; DE PEYERIMHOFF.  
**lutarea.** — *Sorbus aucuparia*.  
**pyrella.** — *Pyrus malus*, *Prunus communis*, *P. spinosa*; sous des fils  
de soies blanches, rongéant la surface de la feuille; juillet et  
septembre.  
**spiniella.** — *Prunus spinosa*.  
**conspersella.** — *Empetrum nigrum*.  
**alpicella.** — *Prunus spinosa* et *P. domesticus*?

## PRAYS

- curtisellus.** — *Fraxinus excelsior*; jeunes pousses non épanouies; mars,  
avril et mai.  
**oleellus.** — Se nourrit du parenchyme de la feuille de l'Olivier; se  
change en chrysalide à la fin de mars; ensuite dans le fruit, à  
l'automne.

## PARADOXUS

- osyridellus.** — *Osyris alba*; en avril et mai; MILLIÈRE.

## ATEMELIA

- torquatella.** — *Betula alba*; sur les feuilles, en société, où elle forme  
une large boursoufflure brune; octobre. — Aussi sur l'Orme;  
RAGONOT.

## ZELLERIA

- hepariella.** — *Fraxinus excelsior*?  
**phillyrella.** — *Phillyrea angustifolia*, quelquefois les *P. media* et  
*latifolia*; éclôt vers le 15 ou 30 janvier, atteint son entier déve-  
loppement dès la fin de février; MILLIÈRE.  
**oleastrella.** — *Olea europæa*; lie les feuilles; novembre ou décembre;  
MILLIÈRE.  
**saxifragæ.** — *Saxifraga aizoon*; fin mai, commencement de juin.

## ARGYRESTHIA

- ephippella.** — Différentes espèces d'arbres et d'arbustes, principalement  
*Corylus avellana*, *Prunus spinosa*; feuilles réunies; mai. —

Dévore les bourgeons des *Cratægus oxyacantha*, *Prunus spinosa* et des arbres fruitiers ; JOURDHEUILLE.

- nitidella.** — *Sorbus* et plusieurs espèces de *Prunus*. — Bourgeons de *Cratægus oxyacantha*, *Pyrus malus* ; avril ; JOURDHEUILLE.
- semitestacella.** — Bourgeons de *Fagus sylvatica* ; avril.
- albistria.** — Dans les pousses de *Prunus spinosa* ; mars.
- spiniella.** — *Sorbus aucuparia* ; mai, juin ; MERRIN.
- conjugella.** — *Sorbus aucuparia* ; août ; MERRIN.
- semifusca.** — *Betula alba*, *Sorbus aucuparia*, *Prunus spinosa* ; mai ; MERRIN.
- mendica.** — Vit sur le *Sorbus* et plusieurs espèces de *Prunus*, notamment le *P. spinosa* ; mars, avril.
- glaucinella.** — Dans l'écorce du *Quercus robur*, *Æsculus hippocastanum*, etc. ; mars, avril ; MERRIN.
- retinella.** — Bourgeons de *Salix* et de *Betula alba* ; avril. — Mai ; MERRIN. — MILLIÈRE dit qu'elle lie les feuilles.
- abdominalis.** — Dans les aiguilles du *Juniperus communis* ; avril.
- dilectella.** — Graines de *Juniperus communis* ; mai ; MERRIN.
- Andereggiella.** — *Pyrus malus* ; mai ; MERRIN.
- cornella.** — Vit sur le *Prunus spinosa*, *Pyrus malus* et *P. communis*, *Corylus avellana* ; en juin et juillet.
- sorbiella.** — Boutons des *Sorbus aucuparia* et *S. aria*, l'*Amelanchier* et le *Cotoneaster* ; au printemps.
- pygmæella.** — Pousses de *Salix* non encore développées ; se chrysalide sur la terre ; mai et juin.
- Gædartella.** — Après avoir vécu dans les bourgeons, fin avril jusqu'au milieu de mai, elle se retire sous l'écorce pour se transformer.
- Brockeella.** — Chatons du *Betula alba* ; mars, avril ; MERRIN.
- arceuthina.** — Dans les aiguilles de *Juniperus*, et à l'extrémité des rameaux dont le sommet est desséché ; janvier à avril.
- illuminatella.** — Dans les aiguilles et les bourgeons de Pins et de Sapins ; janvier et février.
- certella.** — Dans les aiguilles et les bourgeons de Pins et de Sapins ; janvier et février.
- aurulentella.** — Feuilles de *Juniperus* ; août ; MERRIN.

## CEDESTIS

- gysseleniella.** — Entre les aiguilles de *Pinus sylvestris*, dans une toile

janvier et février. — JOURDHEUILLE; octobre. — Mars; MERRIN.

**farinatella.** — Mine les aiguilles de Pins et de Sapins. — JOURDHEUILLE; octobre. — Mars, avril; MERRIN. — Janvier et février.

## OCNEROSTOMA

**piniariella.** — Entre les aiguilles de *Pinus sylvestris*, qu'elle mine à partir de l'extrémité, en se rapprochant de la base; avril. — Juin; MERRIN.

## EIDOPHASIA

**messingiella.** — *Cardamine amara*; avril, mai; MERRIN.

## PLUTELLA

**porrectella.** — *Hesperis matronalis*; mars, avril, mai et juillet.

**cruciferarum.** — Vit sur un grand nombre de plantes Crucifères, les *Brassica*, principalement les *Navets*; juillet.

**annulatella.** — *Cochlearia*; juin; MERRIN.

**dalella.** — *Arabis*; juin; MERRIN.

## CEROSTOMA

**vitella.** — *Ulmus campestris*; mai et juin; JOURDHEUILLE.

**sequella.** — *Salix caprea*; mai. — Sur le *Salix alba*, selon JOURDHEUILLE.

**radiatella.** — *Quercus robur*; commencement de juin.

**parenthesella.** — *Carpinus betulus*, *Fagus sylvatica*; entre les feuilles; mai, commencement de juin.

**sylvella.** — *Quercus robur*; juin.

**lucella.** — *Quercus robur*; juin.

**alpella.** — *Quercus robur*; juin.

**persicella.** — Sur le Pêcher; lie les feuilles; juin.

**asperella.** — *Quercus robur*; HUBNER. — Suivant TREITSCHKE, elle vit de préférence sur les arbres fruitiers, *Prunus domestica*, *Pyrus communis*; a toute sa taille fin mai, juin.

**scabrella.** — *Pyrus malus*; mai; HENRICH FREY.

**horridella.** — *Prunus spinosa*; juin et août.

**nemorella.** — *Lonicera periclymenum*, et *L. caprifolium*.

**falcella.** — *Lonicera periclymenum*, et *L. caprifolium*; selon FREY, elle vit aussi sur le *Lonicera xylosteum*; en mai.

**dentella.** — *Lonicera xylosteum* et *L. periclymenum*; mai; se transforme premiers jours de juin. — Camécérisier; DE PEYERIMHOFF.

## THERISTIS

**mucronella.** — *Evonymus europæus*; dans une toile, en société; a toute sa taille fin juin, commencement juillet.

## ORTHOTÆLIA

**sparganella.** — *Iris pseudo-acorus*, les *Sparganium simplex*, *natans*, *ramosum*; mai, juin et juillet.

## DASYSTOMA

**salicella.** — *Salix caprea*; en automne, subit sa métamorphose. — Feuilles attachées de *Salix triandra*; JOURDHEUILLE. — *Populus tremula*; FETCHER. — *Alnus* et *Acer campestre*; FREY. — Polyphage.

## CHIMABACCHE

**phryganella.** — Polyphage, sur bois feuillus; juin. — *Quercus robur*, dont elle lie les feuilles; *Alnus*, *Fagus sylvatica*; FREY.

**fagella.** — *Fagus sylvatica*, *Quercus robur*, plus souvent *Populus tremula*, quelquefois *Rosa canina*; août et septembre. — Mai; JOURDHEUILLE. — *Vaccinium myrtillus*, *Carpinus betulus*, *Betula alba*, etc.; RAGONOT; très polyphage.

## SEMIOSCOPIIS

**avellanella.** — En mars et avril, sur le Bouleau et le Cerisier; FREY.

## EPIGRAPHIA

**Steinkellneriana.** — *Cratægus oxyacantha*, *Prunus spinosa*, *Sorbus*; juillet, août et septembre.

## PSECADIA

**sexpunctella.** — *Echium vulgare*; sur les fleurs; août.

**pusiella.** — *Lithospermum purpureo cæruleum*, *Pulmonaria officinalis*, *Urtica*; mai. — Selon MILLIÈRE, *Cerithe major*,

*Borrago officinalis*; éclôt au printemps; dès la mi-avril a acquis toute sa grosseur.

- bipunctella.** — *Echium vulgare*, *Lithospermum*; juillet, août, septembre ou octobre, suivant les auteurs. — *Echium calycinum*; MILLIÈRE.
- funerella.** — *Symphytum officinale* ou autres Borraginées. — Selon MILLIÈRE : *Lithospermum purpureo-cæruleum*. — Selon STANTON : *Pulmonaria saccharata*; juillet, août et septembre.
- decemguttella.** — *Lithospermum officinale*; vit isolée sous les feuilles; septembre.
- pyrausta.** — *Thalictrum aquilegifolium*; juillet; MERRIN.

## EXCERETIA

- allisella.** — *Artemisia vulgaris*; fin mai.

## DEPRESSARIA

- costosa.** — Extrémités des pousses du *Spartium scoparium*; mai, juin.
- flavella.** — *Centaurea jacea*, *C. nigra*; prairies humides; chenille noire; se fait un tube avec les feuilles; mai.
- pallorella.** — *Centaurea scabiosa*; se fait un tube avec les feuilles; mai, juillet.
- culcitella.** — *Chrysanthemum corymbosum*; mai.
- umbellana.** — *Ulex europæus* et *U. nanus*; dans une toile tubuleuse; juin ou juillet. — Les *Genista*; MILLIÈRE.
- assimilella.** — *Spartium scoparium*, *Genista pilosa*; mars, avril, mai. — Chenille à la fin de l'hiver, dit DE PEYERIMHOFF.
- nanatella.** — *Carlina vulgaris*; dans un tube de soie et de feuilles; terrains incultes; avril, mai.
- putridella.** — *Peucedanum officinale*; mai.
- atomella.** — *Genista tinctoria*; avril ou mai; et aussi, dit MILLIÈRE, *Calycotome spinosa*.
- scopariella.** — *Spartium scoparium*; avril, mai.
- rutana.** — *Ruta angustifolia*; se nourrit bien en captivité avec le *Ruta graveolens*; pendant l'hiver et au commencement du printemps; mai et septembre.
- arenella.** — *Centaurea scabiosa*, *Sonchus carolina*; ZINCKEN. — *Centaurea nigra*, *Carduus lanceolatus*, *Arctium lappa*, *Serratula*; juillet et août.

- propinquella.** — *Cirsium lanceolatum*, *Arctium lappa* et les Centaurees; roule les feuilles en tube; milieu avril jusqu'au 25 mars.  
— En août; DE PEYERIMHOFF.
- subpropinquella.** — *Centaurea cyanus*; chenille sur les *Centaurea*; FOUCARD. — *Cirsium lanceolatum*, *Onopordon acanthium*; STANTON. — Sa transformation a lieu à la mi-juin et juillet.
- laterella.** — *Centaurea cyanus*; mai et juin; FREY.
- carduella.** — *Cirsium lanceolatum*, etc.; fin mai, commencement de juin.
- zephyrella.** — *Anthriscus vulgaris*, *Chærophyllum* et autres Umbellifères; juin; MERRIN.
- silerella.** — *Siler aquilegifolium*; commencement de juin.
- feruliphila.** — *Ferula nodiflora*, *Seseli tortuosum*; c'est à fin avril qu'il faut la rechercher; MILLIÈRE. — *Heracleum fœniculum*.
- yeatiana.** — *Daucus carota*; juin; MERRIN.
- ocellana.** — *Betula alba*, *Salix caprea*; se chrysalide fin août. — Dans les jeunes pousses de *Salix*; en juin; JOURDHEUILLE.
- alstræmeriana.** — *Conium maculatum*; extrémités des feuilles liées ensemble; fin juin, commencement juillet.
- purpurea.** — Dans les ombelles de *Daucus carota* et *Torilis anthriscus*; s'y chrysalide; août.
- liturella.** — *Hypericum perforatum* et *H. hirsutum*; pousses terminales réunies en tête; se transforme commencement de juin.
- conterminella.** — Pousses de *Salix*; juin.
- impurella.** — Sur les *Vaccinium*, *Conium maculatum*, *Cicuta virosa*; juillet.
- applana.** — *Cicuta major*, *Daucus carota*, *Ægopodium podagraria*, les *Chærophyllum bulbosum*, sylvestre et *temulum*, *Torilis anthriscus*, *Enanthe crocata*, *Angelica sylvestris*; en juin et septembre. — En juillet; JOURDHEUILLE.
- ciliella.** — *Angelica sylvestris*.
- cotoneastri.** — *Cotoneaster*; juillet.
- capreolella.** — *Daucus carota*; juin.
- rotundella.** — *Daucus carota*; mai; MERRIN.
- nodiflorella.** — *Ferula nodiflora*; lie les feuilles ténues; arrivée à toute sa taille fin mars ou milieu avril; MILLIÈRE.
- angelicella.** — Sommités de l'*Angelica sylvestris*; a été observée sur l'*Heracleum sphondylium* et le *Sium angustifolium*; fin mai,

- commencement de juin. — *Ægopodium podagraria*; JOURDHEUILLE.
- cnicella.** — *Eryngium campestre*; sommités ramassées et décolorées; en petite société; mai.
- sarracenella.** — *Senecio sarracenicus*; plie les feuilles sur leur longueur; juin.
- parilella.** — *Peucedanum oreoselinum* et *P. cervaria*; bois, feuilles tordues et attachées ensemble; juin.
- hippomarathri.** — *Seseli hippomarathrum*; avril, mai.
- ferula.** — Feuilles réunies en paquet de *Ferula nodiflora*; février jusqu'en mars; doit éclore en janvier.
- furvella.** — *Dictamnus fraxinella*; feuilles attachées; mai, juin. — *Dictamnus albus*; JOURDHEUILLE.
- depressella.** — Fleurs et capsules des graines de *Daucus carota*, *Pastinaca sativa*, *Pimpinella saxifraga*, *Peucedanum oreoselinum*; juillet et août.
- pimpinella.** — Ombelles du *Pimpinella saxifraga*; août et septembre.
- libanotidella.** — *Athamanta libanotis*; la variété se prend sur le *Laserpitium hirsutum*; juillet et août.
- badiella.** — Fleurs du *Pastinaca sativa*; en juillet.
- heracliana.** — *Heracleum sphondylium*; ombelles; sur les graines vertes; se chrysalide fin juin, commencement juillet. — Août; JOURDHEUILLE.
- emeritella.** — *Tanacetum vulgare*; feuilles attachées ensemble; fin juin, commencement juillet.
- Hoffmanni.** — *Athamanta libanotis*; pentes arides; sur les feuilles contournées; mai.
- olerella.** — Pousses de l'*Achillea millefolium*; fin juin, commencement juillet.
- albipunctella.** — *Anthriscus sylvestris*; juin et juillet, feuilles enroulées en forme de tube à leurs extrémités.
- Weirella.** — *Anthriscus sylvestris*; mai et juin; MERRIN.
- pulcherrimella.** — *Bunium flexuosum*, *Pimpinella*; juin.
- Douglasella.** — *Daucus carota*; mai; MERRIN.
- ululana.** — *Jurinea cyanoides*, *Carum bulbocastanum*, ombelles; commencement juillet. — Mai; JOURDHEUILLE.
- chærophylli.** — *Chærophyllum temulum* et *C. bulbosum*, ombelles; juin et juillet.

- absinthiella.** — *Artemisia absinthium* ; juin.  
**artemisiæ.** — *Artemisia campestris* ; fin mai, commencement de juin.  
**Heydenii.** — *Heracleum austriacum*, ombelles ; juillet.  
**nervosa.** — *Enanthe crocata* ; lieux marécageux ; en société sur les sommets ; juin.  
**ultimella.** — *Pastinaca sativa* ; juin ; MERRIN.  
**dictamnella.** — *Dictamnus albus* ; en juin.

## PSORICOPTERA

- gibbosella.** — *Quercus robur* et *Salix* ; bord de la feuille roulée ; juin.

## GELECHIA

- pinguinella.** — *Populus fastigiata* et *P. tremula*, *Salix* ; mai, juin ; bord des feuilles, réuni par de la soie sur toute leur longueur.  
**nigra.** — Feuilles roulées de *Populus* et de *Salix* ; mai.  
**muscosella.** — Feuilles roulées de *Populus* et de *Salix* ; mai.  
**cuneatella.** — *Salix* ; juillet ; MERRIN.  
**rhombella.** — *Pyrus malus* et *P. communis* ; sur les écorces ; se chrysalide en mai.  
**hippohaella.** — *Hippophae rhamnoides* ; pousses terminales ; juillet.  
**soroculella.** — Entre les feuilles de *Salix* ; juin.  
**flavicomella.** — *Prunus spinosa*, dans un abri de feuilles desséchées ; septembre et octobre. — Mai et septembre ; JOURDHEUILLE.  
**velocella.** — *Rumex acetosella* ; racines ; avril ; MERRIN.  
**peliiella.** — *Rumex acetosella* ; endroits sablonneux ; feuilles liées à la tige ; fin mai.  
**ericetella.** — *Calluna vulgaris*, *Erica tetralix*, *E. cinerea* ; entre les rameaux qu'elle réunit. — Dans un tuyau de soie sur les rameaux ; octobre ; JOURDHEUILLE. — En automne ou au printemps. — De septembre en mars ; MERRIN.  
**infernalis.** — Lie les feuilles radicales de l'*Inula helenium* ; février ; MILLIÈRE.  
**lentiginosella.** — *Genista tinctoria* et *G. germanica* ; fin mai, juin. — Pousses de *Cytisus sagittalis* ; JOURDHEUILLE.  
**plutelliformis.** — *Tamarix gallica* ; sur les feuilles ; en automne.  
**mulinella.** — *Ulex europæus*, *Spartium scoparium* ; dans les fleurs ; trou rond au pétale postérieur ; avril, mai.

- malvella.** — Intérieur des semences de l'*Althæa rosea* et des *Malva*; juillet et septembre.
- longicornis.** — *Erica cinerea*; juillet? MERRIN.
- diffinis.** — Tiges et graines de *Rumex acetosa*; coteaux arides; juin.
- electella.** — *Pinus abies*; mai; FREY.
- scalella.** — *Quercus robur*.
- oxycedrella.** — Ronge les fruits du *Juniperus oxycedrus*; a tout son développement en mars ou avril; MILLIÈRE.
- lugubrella.** — Doit vivre, selon MILLIÈRE, sur plusieurs espèces de Légumineuses; a été élevée sur les *Dorycnium*.
- maculatella.** — *Coronilla varia*; dans les feuilles; bois exposés au soleil; fin mai, commencement de juin.

## BRACHMIA

- mouffetella.** — *Lonicera periclymenum* et *L. xylosteum*, *Symphoria racemosa*; fin mai, commencement juin. — Avril; MERRIN.
- ulcinella.** — *Ulex parviflorus*; éclôt en décembre; a achevé de croître à la fin de janvier; se chrysalide en terre, et aussi sur l'*Ulex provincialis*. — Sur les fleurs; MILLIÈRE.
- nigricostella.** — *Medicago sativa*; feuilles attachées; septembre. — Juin, septembre; MERRIN.
- lathyri.** — *Lathyrus palustris*; feuilles rongées vers le pétiole; toile de soie blanche entourant la chenille; août et septembre.

## BRYOTROPHA

- figulella.** — *Silene nicænsis*; février; MILLIÈRE.
- affinis.** — Vit de Mousses; il faut chercher la chenille par la pluie ou la rosée; janvier, février et mars; suivant d'autres auteurs, avril, mai.
- domestica.** — Vit de Mousses (*Barbula muralis*), sur les murailles; mars, avril.
- basaltinella.** — Mousses; mai? MERRIN.

## LITA

- psillella.** — Jeunes pousses d'*Artemisia campestris* qui jaunissent au sommet; en mai.
- solanella.** — *Solanum tuberosum*; dans le tubercule.

- epithymella.** — *Solanum nigrum*, dont elle lie les feuilles; fin septembre, octobre.
- artemisiella.** — *Thymus serpyllum*; STANTON; fin mai, commencement de juin.
- atriplicella.** — Semences de *Chenopodium album*; dans un tube de soie, le long des murs et dans les jardins; mai et juin.
- ocellatella.** — Fleurs; *Beta maritima*; mai, juin.
- instabilella.** — *Plantago maritima*; avril.
- salinella.** — La chenille se nourrit de Salsolées; en hiver; MILLIÈRE.
- halimella.** — *Atriplex halimus*, *Salsola*; MARTORELL; atteint toute sa croissance commencement février; lie les feuilles en mars et avril; MILLIÈRE.
- obsoletella.** — Dans la moelle des tiges de *Chenopodium* et *Atriplex*; lieux abrités; juin, juillet et août.
- acuminatella.** — *Carduus nutans*, *Cirsium lanceolatum*, *C. palustre*, *Centaurea scabiosa*; mine les feuilles et en sort pour se chrysalider; juillet, septembre.
- Æthiops.** — *Erica cinerea*; entre les rameaux; lieux humides; commencement de juillet.
- Brahmiella.** — Extrémités des pousses de *Jurinea cyanoïdes* qui blanchissent au sommet; mai, octobre. — *Jurinea pyrenaica*; MIL.
- Hubneri.** — Pousses réunies de *Stellaria holostea*; juin.
- Knaggsiella.** — Capsules des graines de *Stellaria holostea*; juin; MERRIN.
- maculea.** — *Stellaria holostea*; endroits abrités; pousses terminales flétries; fin mai.
- fraternella.** — *Stellaria uliginosa*, quelquefois sur les pousses du *Cerastium vulgatum*; avril, mai.
- viscariella.** — *Lychnis dioica* et *L. viscaria*; pousses contournées et plissées; commencement de mai.
- tricolorella.** — *Stellaria holostea*; endroits abrités; mars et avril.
- costella.** — *Solanum dulcamara*; plaques brunâtres, sur les feuilles un peu plissées, attaquant même les baies et l'intérieur de la tige; fin août, commencement septembre.
- hyoscyamella.** — *Hyoscyamus albus*; MILLIÈRE; la chenille, mine et contourne les feuilles; avril.
- maculiferella.** — *Cerastium semidecandrum*; feuilles réunies; commencement de mai.

- junctella.** — La chenille enfoncée dans le sable vit de racines; février et mars; MILLIÈRE.
- marmorea.** — *Cerastium vulgatum*; dunes; fin mars, commencement avril. — Juin; JOURDHEUILLE.
- provincialis.** — *Silene nicæensis*; MILLIÈRE.
- vicinella.** — ? *Coronilla emerus*; juin; ANN. SOC. ENT. DE FRANCE.
- Fischerella.** — *Saponaria officinalis*; pousses déformées; milieu de mai.
- cauligenella.** — *Silene nutans*, dans une boursofflure qu'elle produit à l'intérieur des tiges; mi-juin.
- gypsophila.** — Galles du *Gypsophila saxifraga*.
- leucomelanella.** — *Silene maritima*, sur les côtes; dans les pousses flétries; fin mai.
- Tischeriella.** — Entre deux feuilles pliées de *Silene nutans*; mai.

## TELEIA

- vulgella.** — *Cratægus oxyacantha*, *Prunus domestica*; feuilles tendres attachées ensemble; avril, mai.
- scriptella.** — *Acer campestre*; fin août, septembre.
- tamariciella.** — *Tamarix gallica*; octobre. — En juin, puis en septembre; MILLIÈRE.
- sequax.** — *Helianthemum vulgare*; pousses réunies; fin mai, commencement de juin.
- cisti.** — Mai; MILLIÈRE.
- fugitivella.** — *Corylus avellana*, *Acer campestre*, *Ulmus campestris*; commencement de mai; FREY.
- proximella.** — *Betula alba*; feuilles roulées; septembre et octobre. — Mai, octobre; JOURDHEUILLE.
- notatella.** — *Salix caprea*; feuilles attachées; septembre.
- triparella.** — *Quercus robur*; dans un tissu entre les feuilles appliquées l'une sur l'autre; fin juillet, mi-septembre, octobre.
- luculella.** — Dans le bois pourri; février, mars; MERRIN.
- dodecella.** — Dans les jeunes pousses de *Pinus sylvestris*; avril, mai; STAINTON.
- unedella.** — Vit dans les toiles de *Liparis chrysorrhæa*; MILLIÈRE.

## RECURVARIA

- leucatella.** — *Cratægus oxyacantha*, *Sorbus aucuparia*, *Pyrus malus*, *Prunus spinosa*; fin mai, commencement de juin.

**nanella.** — Dans les fleurs de *Pyrus communis* ; avril, mai. — *Sorbus* et autres arbres fruitiers, ajoute MILLIÈRE.

## ARGYRITIS

**pictella.** — *Cerastium triviale* ; mai.

## NANNODIA

**stipella.** — *Chenopodium album*, *Atriplex* ; dans les feuilles ; juin, septembre et octobre.

**Hermannella.** — *Chenopodium Bonus-Henricus* et *Atriplex* ; juillet, août, septembre et octobre.

## APODIA

**bifractella.** — *Conyza squarrosa*, *Inula dysenterica* ; se nourrit de graines ; octobre, novembre et décembre, jusqu'en janvier et février. — D'octobre à mars ; MERRIN.

## SITOTROGA

**cerealella.** — Froment, Orge, Seigle ; d'octobre à mars ; MERRIN.

## PTOCHENUSA

**subocellea.** — Sommités desséchées de l'*Origanum vulgare* ; dans un fourreau ; août, septembre, jusqu'en janvier et février. — *Satureia montana* ; juin et septembre ; MILLIÈRE.

**inopella.** — *Inula dysenterica* ; chenille sur les fleurs ; on reconnaît sa présence aux fleurons qui s'élèvent au centre ; en août ; se chrysalide dans la fleur ou dans les graines. — *Helichrysum arena-rium* ; juillet.

## PARASIA

**paucipunctella.** — Dans les graines d'*Anthemis tinctoria* et *Centaurea paniculata* ; janvier et février.

**lappella.** — Dans les semences d'*Arctium lappa* ; janvier et février.

**carlinella.** — Réceptacles du *Carlina vulgaris* ; passe l'hiver, se transforme en juin et juillet. — D'après JOURDHEUILLE, se transforme en mars. — *Centaurea nigra* et réceptacles des Chardons ; MERRIN.

- Metzneriella.** — Semences des *Centaurea nigra*, *C. scabiosa*; janvier et février. — D'octobre à mars; MERRIN.
- neuropterella.** — Dans les têtes de *Cirsium acaule*; s'y chrysalide en juillet; peut se récolter en janvier et février. — Avril; MERRIN.

## CHELARIA

- Hübnerella.** — *Corylus avellana*. — *Betula alba*, *Fraxinus excelsior*; endroits ombragés; juin; JOURDHEUILLE.

## ERGATIS

- brizella.** — *Statice armeria*; dans la tige, sous le réceptacle; septembre et octobre, jusqu'en janvier et février, puis fin juin et juillet.
- subdecurtella.** — *Lythrum salicaria*; juin; MERRIN.
- ericinella.** — *Erica vulgaris*; dans une toile légère; depuis la mi-juin jusqu'en juillet.
- staticella.** — Vit au printemps, après avoir passé l'hiver sur le *Statice cordata*; se transforme fin mai; MILLIÈRE.

## DORYPHORA

- pulveratella.** — Dans les Luzernes; fin de septembre; DE PEYERIMHOFF.
- morosa.** — Pousses attachées de *Lysimachia vulgaris*; passe l'hiver; se prend en mai.
- farinosæ.** — *Primula farinosa*; plaques pâles à la face supérieure des feuilles, d'autres feuilles sont pliées en deux; commencement de mai.
- arundinetella.** — *Carex riparia*; se trouve rarement sur le *Carex paludosa*; galeries sur les feuilles; fin mars, avril. — Dans les feuilles de *Carex*; juillet; JOURDHEUILLE.

## MONOCHROA

- tenebrella.** — Racines et tiges de *Rumex acetosella*; avril; MERRIN.

## LAMPROTES

- atrella.** — Tiges d'*Hypericum*; mai, juin; MERRIN.
- rhenanella.** — Sous les feuilles de *Convolvulus sepium* qui paraissent desséchées; juillet.

## ANACAMPSIS

- patruella.** — Lie les feuilles et les fleurs de l'*Helianthemum guttatum*; MILLIÈRE.
- sircomella.** — *Cerastium vulgatum*; juin? MERRIN.
- coronillella.** — *Coronilla varia*, *Genista tinctoria*, peut-être *Onobrychis sativa*; commencement de mai.
- biguttella.** — Pousses de *Genista tinctoria* et de *Medicago sativa*; juin.  
— Feuilles réunies; octobre; JOURDHEUILLE. — *Dorycnium suffruticosum*; mars; MILLIÈRE.
- sangiella.** — *Lotus corniculatus*; mai; MERRIN.
- anthyllidella.** — *Anthyllis vulneraria*, *Onobrychis sativa*, *Trifolium pratense*, *Lathyrus*; avril, mai et juillet. — Sur les *Lotus*, dont elle blanchit les feuilles après les avoir liées; MILLIÈRE.
- psoralella.** — *Psoralea bituminosa*; mine les feuilles de plusieurs plantes herbacées, éclôt fin octobre, a toute sa grosseur fin février. — Mars et avril; MILLIÈRE.
- albipalpella.** — *Genista anglica*; prairies sylvatiques; juin.
- ligulella.** — *Lotus corniculatus*; mai.
- vorticella.** — *Lotus corniculatus*, *Genista*; mai.
- tæniolella.** — *Lotus corniculatus*, *Trifolium filiforme*, *Medicago minima*, etc.; fin mai, commencement de juin.
- lamprostoma.** — *Convolvulus arvensis*? MARTORELL.

## ACANTHOPHILA

- alacella.** — Lichens des arbres; juin; MERRIN.

## TACHYPTILIA

- populella.** — *Populus tremula*, *Betula alba*, *Salix* et *Populus*; mai.
- scintillella.** — *Helianthemum vulgare*; pousses attachées; mai, juin.
- temerella.** — *Salix caprea*, *Salix fusca*; jeunes feuilles liées ensemble; mai, juin.
- subsequella.** — Pousses de *Prunus spinosa*; mai.

## BRACHYGLOSSATA

- antirrhinella.** — *Antirrhinum asarina* et *A. cymbalaria*; éclôt en mars ou avril; se métamorphose fin mai; MILLIÈRE.

## GERATOPHORA

- lutatella.** — Roule les Graminées en spirale ; avril.  
**triannulella.** — Plie les bords des *Convolvulus* ; juin.  
**rufescens.** — Différentes petites Graminées qu'elle roule en spirale ; talus herbeux ou le long d'un fossé ; avril, mai et juin.

## RHINOSIA

- ferrugella.** — *Campanula persicifolia*, *Scabiosa columbaria* ; mai.  
**flavella.** — Replie les feuilles des *Trifolium pratense* et *T. procumbens*, et du *Lotus corniculatus* ; RAGONOT.

## GLEODORA

- striatella.** — Hiverne dans les tiges de *Tanacetum vulgare* et *Anthemis tinctoria* ; janvier et février.  
**anthemidella.** — La chenille doit vivre sur les chardons sauvages ; MILLIÈRE.  
**Kefersteiniella.** — *Carlina* ; MARTORELL.

## MESOPHLEPS

- corsicellus.** — Abondante en hiver sur tous les *Cistus*, notamment le *C. salvifolius*, *Helianthemum italicum* ; ronge les graines sèches ; MILLIÈRE.

## YPSOLOPHUS

- renigerellus.** — *Urtica*.  
**ustulellus.** — *Betula alba* ; hiverne entre deux feuilles attachées ; JOURDHEUILLE. — *Corylus avellana*, *Carpinus betulus* ; septembre ; STAINTON. — AVRIL ; MERRIN.  
**fasciellus.** — *Prunus spinosa* ; commencement de septembre. — *Rubus*, dont elle plie les feuilles ; octobre ; JOURDHEUILLE.  
**limosellus.** — *Trifolium medium* et *T. pratense*, les *Lotus* ; commencement de juin.  
**Schmidiellus.** — *Origanum vulgare* ; dans les feuilles pliées ; juin.  
**juniperellus.** — *Juniperus communis* ; STAINTON ; juin.  
**marginellus.** — *Juniperus communis* ; STAINTON ; entre les aiguilles, dans une toile lâche ; juin. — *Juniperus oxycedrus* ; MILLIÈRE.

## NOTHRIS

- verbascella.** — *Verbascum thapsus*; en société dans une toile, dans les fleurs; juillet et mars; ces dernières passent l'hiver.
- declaratella.** — *Scrophularia canina*; mai; ROUAST. — *Scrophularia aquatica*; MABILLE.
- senticella.** — *Juniperus phænicea* et *J. oxycedrus*; fin décembre et premiers jours de janvier; MILLIÈRE.
- sabinella.** — *Juniperus sabina*; juin; FREY.

## SOPHRONIA

- humerella.** — *Artemisia campestris*; mai; MERRIN.

## ANARSIA

- spartiella.** — *Ulex europæus*, *Genista*; feuilles roulées et pousses brunies; mai.
- lineatella.** — Dans les jeunes pousses des arbres fruitiers à noyau, surtout les Pêchers; l'extrémité des tiges se flétrit; mai.

## EPIDOLA

- barcinonella.** — Se nourrit de Graminées, et, suivant MARTORELL, *Scabiosa*; a toute sa taille pendant le mois de mai.

## PLEUROTA

- aristella.** — Chenille polyphage, ronge la base des plantes herbacées, se transforme dans les feuilles sèches; avril; MILLIÈRE.
- bicostella.** — *Erica cinerea*; de novembre à avril, mai; MERRIN.

## APLOTA

- palpella.** — Bois pourri et Lichens des arbres; mai.

## HYPERCALLIA

- citrinalis.** — *Polygala chamæbuxus*, etc.; lie ensemble plusieurs feuilles terminales, se fixe au-dessus des feuilles pour se chrysalider; mai.

## GARGINA

**quercana.** — *Fagus sylvatica*, peut-être *Quercus robur*, *Pyrus malus* et *P. communis*; se change en chrysalide commencement de juin. — *Arbutus unedo*; MARTORELL. — STAINTON représente cette larve sur le *Sorbus torminalis*. — MILLIÈRE dit que la variété *purpurana* semble plutôt vivre sur l'*Arbutus unedo*.

## ENICOSTOMA

**lobella.** — *Prunus spinosa*; sous les feuilles des arbres fruitiers et surtout sous celles du Pêcher cultivé en espalier; septembre.

## ANCHINIA

**daphnella.** — Sur les *Daphne*; mai.

**crystalis.** — *Daphne mezereum*; CATAL. DE VIENNE. — *Daphne cneorum*; mai; HUBNER. — *Daphne gnidium*; lie le sommet des rameaux; MILLIÈRE.

**laureolella.** — *Daphne gnidium*; mai; RAGONOT.

## HARPELLA

**forficella.** — Sous l'écorce du *Betula alba*, *Alnus glutinosa*, *Corylus avellana*, *Quercus robur*, tiges pourries du *Fagus sylvatica* et des *Salix*; commencement de février jusqu'en avril et mai.

**Geoffrella.** — Sous les écorces, dans les bois; avril.

**bractella.** — Sous l'écorce du *Carpinus betulus*; FABRICIUS. — Sous les écorces malades des *Quercus robur*, *Fagus sylvatica*, *Populus*; avril; JOURDHEUILLE. — Bois pourri; MERRIN.

## DASYCERA

**sulphurella.** — Sous l'écorce des arbres, ou celle qui reste sur les po-  
teaux; mars. — Bois pourri; avril; MERRIN.

**oliviella.** — Bois pourri.

## ÆCOPHORA

**tinctella.** — Bois pourris, Lichens des arbres; mai; FREY.

**unitella.** — Sous l'écorce des arbres morts; avril, mai.

**flavifrontella.** — *Fagus sylvatica*. — Selon JOURDHEUILLE, vit en avril

et mai, à la manière des *Adela*, dans un fourreau découpé dans une feuille, sous les feuilles sèches.

**pseudopretella.** — Pois secs et autres graines, etc.; janvier à avril;

MERRIN.

**stipella.** — Sous l'écorce du *Pinus sylvestris*; avril.

**cinnamomea.** — Sous l'écorce du *Pinus sylvestris*; avril.

**angustella.** — Bois pourri de *Populus* et de *Pyrus malus*; deuxième quinzaine de mai; FREY.

**minutella.** — Semences de Céleri, dans les jardins; octobre. — Mars; MERRIN.

**lambdella.** — *Carpinus betulus*, *Æsculus hippocastanum*, *Alnus campestris*.

**Schæfferella.** — Sous les écorces; avril; JOURDHEUILLE.

**grandis** — Sous l'écorce des *Quercus* malades.

#### BLASTOBASIS

**anthophaga.** — Doit vivre, d'après MILLIÈRE, sur l'*Osyris alba*.

#### GLYPHIPTERYX

**thrasionella.** — Tiges des Cypéracées; mai.

**Haworthana.** — *Eriophorum angustifolium*; fin mars, avril.

**equitella.** — *Sedum acre*, pousses; fin mai.

**schæmicoella.** — *Schænus nigricans*, têtes; avril, mai.

**Fischeriella.** — *Dactylis glomerata*, têtes; juillet.

#### GRACILARIA

**alchimiella.** — Mine les feuilles du *Quercus robur*; feuilles roulées en cornet; juillet et septembre. — Dans un cône formé par le bord plié de la feuille du *Quercus robur*; août; JOURDHEUILLE.

**flava.** — Ronge les bouchons dans les caves.

**stigmatella.** — *Salix caprea*, *Populus*, *Salix*; août, septembre et octobre. — Feuilles roulées; juin, juillet; JOURDHEUILLE.

**bimidactylella.** — *Acer pseudo-platanus*; roule la feuille en dessous; juillet et août.

**fidella.** — Chenille sur l'*Humulus lupulus*; dans les bois humides; DE PEYERIMHOFF.

- falconipennella.** — *Acer campestre*, *Alnus glutinosa*, feuilles roulées; juillet; JOURDHEUILLE.
- semifascia.** — *Acer campestre*; dans une partie de la feuille roulée en cornet; juillet.
- populetorum.** — Feuilles roulées du *Betula alba*; juillet.
- elongella.** — Vit entre les deux épidermes de l'*Alnus glutinosa*; feuilles roulées en long; deux générations; mai, juillet.
- juglandella.** — La chenille dévaste les feuilles de *Juglans regia*; au printemps, les roule en cornet; MILLIÈRE.
- rufipennella.** — Dans une feuille roulée d'*Acer pseudo-platanus*; août; HENRICH FREY.
- tringipennella.** — *Plantago lanceolata*; feuilles plissées; épiderme de la face supérieure détaché et d'un brun pâle; mars, avril et fin juin, commencement juillet, octobre; se transforme dans la mine; JOURDHEUILLE.
- limosella.** — *Teucrium chamædrydrys*; feuilles boursoufflées; se métamorphose en dehors; fin juillet et fin septembre. — Août et septembre; JOURDHEUILLE.
- roscipennella.** — *Chenopodium*; feuilles roulées; août.
- syringella.** — *Syringa vulgaris*, *Ligustrum vulgare*, *Fraxinus excelsior*; jardins; se métamorphose en dehors de la feuille; juin et août, septembre. — Juin, juillet, août; JOURDHEUILLE.
- phasianipennella.** — Les *Polygonum hydropiper* et *persicaria*, les *Rumex acetosella* et *obtusifolius*, *Lythrum salicaria*; RAGONOT. — Dans les feuilles; la chenille se découpe une lanière qu'elle roule en cornet sous le reste de la feuille; août et septembre.
- auroguttella.** — Dans les feuilles d'*Hypericum* roulées en cornet; septembre; JOURDHEUILLE. — Avril; MERRIN. — Selon d'autres auteurs, sur les *Hypericum perforatum* et *pulchrum*; fin juin et fin septembre, octobre.
- omissella.** — *Artemisia vulgaris*, feuille gonflée; surface supérieure de la feuille jaunâtre et pommelée de taches blanches; commencement juillet ou en septembre.
- ononidis.** — Feuilles de *Trifolium* et d'*Ononis*; feuilles décolorées; fin avril, commencement mai.
- Hoffmanniella.** — *Orobus niger*; feuilles boursoufflées, pommelées en dessous, dans les allées et sous les lisières des bois; fin juillet, commencement août. — Septembre, octobre; JOURDHEUILLE.

- imperialiella.** — *Symphytum officinale*.
- pavoniella.** — *Bellidiastrum Michellii*; août, septembre, octobre. —  
*Aster amellus*; JOURDHEUILLE.
- Kollariella.** — *Genista tinctoria*, *Spartium scoparium*; feuilles minées  
d'un gris jaunâtre; fin juin ou commencement octobre.
- scalariella.** — La chenille en hiver sur la plupart des Borraginées des  
terres incultes, principalement dans les feuilles d'*Echium vul-*  
*gare*; s'y transforme; MILLIÈRE.

## CORISCIUM

- Brongniardellum.** — Mine pâle dans les feuilles du *Quercus robur*; juin.  
— *Quercus coccifera*; mai; RAGONOT.
- cuculipennellum.** — Extrémité des feuilles du *Ligustrum vulgare*, et du  
Lilas; juin. — Septembre; JOURDHEUILLE.

## ORNIX

- guttea.** — *Pyrus malus*; dans les jardins; partie de la feuille repliée  
en dessous et attachée; juillet, août.
- interruptella.** — *Salix fusca*.
- Pfaffenzelleri.** — *Cotoneaster vulgaris*.
- loganella.** — *Betula alba*; août.
- polygrammella.** — *Betula nana*.
- petiolella.** — *Pyrus malus*; grandes plaques membraneuses très blanches;  
septembre, octobre.
- fagivora.** — *Fagus sylvatica*, *Carpinus betulus*; feuilles décolorées et  
brunâtres, bord plié en bas et attaché à la feuille; septembre.
- carpinella.** — *Carpinus betulus*; RAGONOT.
- anglicella.** — *Cratægus oxyacantha*; une partie du sommet de la feuille  
repliée en dessous; juillet, août et septembre. — *Sorbus tormi-*  
*nalis*; FLETCHER.
- avellanella.** — *Corylus avellana*; feuilles repliées en dessous; juillet,  
septembre et octobre.
- finitimella.** — *Prunus spinosa*, et, suivant le professeur FREY, *Corylus*  
*avellana*; septembre et octobre.
- torquillella.** — *Prunus spinosa*; feuilles roulées, bouts réunis, sommet  
décoloré; juillet et septembre.
- scoticella.** — *Sorbus aucuparia*, *S. aria*; bord replié, solidement  
attaché; août et septembre.

- betulæ.** — *Betula alba*, jeunes arbres; feuilles repliées en dessous et solidement attachées; juillet, septembre et octobre.  
**scutulatella.** — *Betula alba*; septembre; MERRIN.  
**anguliferella.** — *Pyrus communis*.

## GOLEOPHORA

- juncicolella.** — *Calluna vulgaris*, *Erica cinerea*, feuilles; le fourreau ressemble à une jeune pousse et s'attache à la tige; a tout son développement fin mars, commencement avril.  
**laricella.** — *Larix europæa*, au milieu des jeunes pousses; les sommets des feuilles se flétrissent; passe l'hiver sans manger; a atteint tout son développement en avril ou mai.  
**badiipennella.** — Fourreau très commun sur les feuilles et sur le tronc d'*Ulmus campestris*; FOUCARD.  
**milvipennis.** — Fourreau aplati en forme de couteau, sur les feuilles de *Betula alba*; mai, octobre.  
**limosipennella.** — *Ulmus campestris*; fourreau dentelé, taches d'un jaune brun; en juillet, elle cesse de manger et ne se chrysalide qu'en avril.  
**ochripennella.** — *Ballota nigra*; mai. — Fourreau droit, étroit, duveteux, brun grisâtre, plus large antérieurement que postérieurement. — JOURDHEUILLE ajoute *Stachys sylvatica*, *Lamium album* et *L. purpureum*; taches d'un brun blanchâtre; juillet.  
**cornuta.** — Fourreau sur le *Betula alba*, et en octobre sur le *Rhamnus frangula*; FOUCARD.  
**lithargyrinella.** — *Salix caprea*; mai.  
**olivaceella.** — *Stellaria holostea*, *Cerastium arvense*; mai et juin.  
**solitariella.** — *Stellaria holostea*; taches blanches très apparentes; a toute sa taille fin mai, commencement de juin; passe l'hiver.  
**flavipennella.** — *Salix*; mai et juin.  
**lutipennella.** — Fourreau jaune clair, sur le *quercus robur*; mai.  
**fuscedinella.** — Plantations d'*Alnus* et dans les jardins fruitiers; mai — Selon d'autres auteurs, vit aussi sur le *Fagus sylvatica*, *Betula alba*, *Cratægus oxyacantha*.  
**Binderella.** — Feuilles d'*Alnus*; fourreau en mai; SOC. ENT. FRANCE. — *Rosa*; BRUAND.  
**idæella.** — Feuilles de l'Airelle rouge.  
**viminetella.** — *Salix caprea* et *S. viminalis*; fourreau de couleurs

diverses, construit de morceaux successivement ajoutés, bout anal brun, bout antérieur vert assez pâle; mai.

**glitzella.** — Feuilles de l'Airelle rouge; fin avril.

**vacciniella.** — Sur les fruits murs du *Vaccinium myrtillus*; juillet; JOURDHEUILLE.

**vitisella.** — *Vaccinium vitis-idaea*; sur la feuille; fourreau noirâtre en pistolet, surface extérieure ridée d'une manière bizarre; a tout son développement vers la fin d'avril.

**orbitella.** — Plantations d'*Alnus* et dans les jardins fruitiers; mai et juin.

**siccifolia.** — *Cratægus oxyacantha*, *Pyrus malus*, *Betula alba*; grandes taches brunes sur les feuilles; le fourreau ressemble à une feuille sèche; ordinairement sous la feuille; a toute sa taille au mois d'août, mais ne se chrysalide qu'au printemps suivant.

**gryhipennella.** — Rosier, Églantier; commence à manger en septembre et octobre, passe l'hiver sans manger, reprend de la nourriture et se chrysalide dès le premier printemps.

**nigricella.** — *Fagus sylvatica*, *Betula alba*, fourreau court, brun clair; mai et juin. — Sous les arbres fruitiers; SOC. ENT. FRANCE.

**paripennella.** — Feuilles du *Prunus spinosa*, *Corylus avellana*, *Pyrus malus*, *Cratægus oxyacantha*, *Cornus*, *Rubus* et *Rosa*; fourreau assez petit, orné de plusieurs rides formées de morceaux de l'épiderme de la feuille; octobre, passe l'hiver, se chrysalide en mai; il faut la chercher en septembre et octobre.

**ledi.** — *Viburnum lantana* et *V. opulus*, *Tilia europæa*, *Ledum palustre*, *Cornus*, *Rhamnus*; fourreau cylindrique, un peu courbé antérieurement, dont les côtés sont fort ridés et dont le dos est quelquefois muni de plusieurs protubérances; août et septembre. — Fourreau sur *Betula alba*, haies de *Cratægus oxyacantha*; trouvé également sur *Rosa*; FOUCARD.

**albitarcella.** — *Glechoma hederacea*, *Origanum vulgare*; avril et mai.

**fuscocuprella.** — *Corylus*, *Ulmus campestris*, *Alnus glutinosa*, *Betula alba*; septembre à mai; MERRIN.

**alcyonipennella.** — Les *Centaurea nigra*, *jacea* et *scabiosa*; fourreau court, cylindrique, d'un brun noirâtre avec une strie oblique, blanchâtre de chaque côté; mai, après avoir passé l'hiver. — Septembre; JOURDHEUILLE.

- melilotella.** — *Melilotus officinalis*; août.
- deauratella.** — *Centaurea jacea*; mai.
- chalcogrammella.** — *Cerastium arvense*; fourreau brun orangé obscur, un quart de pouce de long; octobre, avril ou mai.
- hemerobiella.** — Arbres fruitiers; *Pyrus communis*, *P. malus*, *Cerasus vulgaris*; fourreau brun, raide, d'un demi-pouce de long, bien plus grand que celui du *C. nigricella*; passe l'hiver, arrive à toute sa taille fin mai, commencement de juin.
- anatipennella.** — *Prunus cerasus* et *P. spinosa*, *Betula alba*, *Fagus sylvatica*, *Quercus robur*, *Salix*, *Cratægus oxyacantha*, *Tilia europæa*; fourreau en statures perpendiculaires; mai et commencement de juin.
- ibipennella.** — *Betula alba*; fourreau noir en crosse horizontale, sans appendice; mai.
- palliatella.** — *Quercus robur*; commencement de juin. — *Betula alba*, *Corylus avellana*, *Carpinus betulus*; FOUCARD.
- carrucipennella.** — Feuilles du *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, *Salix*; perce la feuille en entier; fourreau en forme de pistolet, avec des protubérances de chaque côté du dos; fin mai, commencement de juin.
- serratulella.** — *Serratula mollis* et *S. cyanoides*; fourreau cylindrique, derrière, long d'un demi-pouce, d'un brun ocracé en dessus aplati, avec une strie blanchâtre en dessous; mai, juin.
- auricella.** — *Stachys recta*, *Betonica officinalis*, *Teucrium scorodonia*; fourreau ocracé, assez gros en forme de sac, d'un aspect assez informe; mai.
- virgatella.** — *Salvia pratensis*; fourreau presque aplati latéralement, à peu près circulaire, et ressemblant beaucoup à un morceau de feuille flétrie; mai ou juin.
- serenella.** — *Astragalus glycyphyllos*, dans les bois, *Colutea arborescens*, dans les jardins; fourreau blanchâtre, courbé; mai.
- coronilla.** — Plusieurs plantes Légumineuses: *Coronilla varia*, *Lathyrus pratensis* et *L. sylvestris*, *Spartium scoparium*, *Astragalus glycyphyllos*; sous les feuilles; mai.
- vulnerariæ.** — La chenille, dit MILLIÈRE, doit vivre sur les *Helianthemum*. Selon FISCHER, le papillon ne vole que là où croît l'*Anthyllis*.
- albicosta.** — *Ulex europæus*, sur les gousses; fourreau court, cylin-

drique, duveteux ; fin août, commencement de septembre, passe l'hiver, se chrysalide commencement de mai.

**pyrrhulipennella.** — *Calluna vulgaris*, *Erica cinerea* ; sur les pousses terminales ; fourreau long, grêle, noir, luisant, aplati, un peu courbé ; avril et mai.

**ditella.** — *Artemisia campestris* ; fourreau noir, luisant, atténué aux deux bouts, mais beaucoup plus gros au milieu et avec une carène saillante en dessous ; automne et printemps.

**vibigerella.** — *Artemisia campestris* et sur quelques autres plantes ; en automne ; passe l'hiver et arrive à toute sa taille en mai suivant.

**gypsophila.** — *Gypsophila fastigiata* ; difficile à élever ; septembre.

**congeriella.** — En mars, sur le *Dorycnium suffruticosum* ; MILLIÈRE.

**binotapennella.** — ? Mai.

**ballotella.** — *Teucrium scorodonia* ; mai et juin. — Sur les plants de *Ballota nigra* qui poussent entourés d'arbres ; juillet, août ; JOURDHEUILLE.

**Wockeella.** — *Betonica officinalis*, *Stachys hirta*, *Ranunculus acris* ; mai ; fourreau long, aplati, assez raide, un peu courbé à son bout postérieur.

**leucapennella.** — *Silene nutans*, *Lychnis viscaria* ; emploie les capsules comme fourreau ; août.

**saturatella.** — *Genista scoparia* ; mai.

**discordella.** — *Lotus corniculatus* ; endroits abrités ; passe l'hiver, a acquis son complet développement avril, fin mai.

**genistæ.** — *Genista anglica*, bruyères marécageuses où elle forme des taches d'un vert blanchâtre ; avril, mai.

**bilinæatella.** — *Sarothamnus scoparius* ; mai.

**onobrychiella.** — *Genista tinctoria* ; mai.

**niveicostella.** — *Sarothamnus scoparius* ; mai, octobre. — Juin ; MERRIN.

**albicostella.** — *Potentilla cinerea* ; avril, septembre.

**trifariella.** — *Spartium scoparium*, *Genista pilosa*, *Cytisus capitatus* ; fourreau presque aussi large que long, ressemblant à un paquet de feuilles sèches, les feuilles ne tenant sur le fourreau que d'un côté ; septembre.

**conspicnella.** — Les *Centaurea scabiosa*, *nigra* et *jacea* ; fourreau noir, courbé, plus large et plus grand que celui d'*Alcyonipennella* ;

— passe l'hiver, mange de nouveau au printemps et n'atteint son développement que fin mai, commencement de juin. — **JOURDHEUILLE** indique septembre.

- spumosella.** — La chenille ronge, au printemps, le parenchyme des feuilles de *Dorycnium suffruticosum*; le fourreau est relativement grand, festonné sur la carène et d'un blanc pur; **MILLIÈRE**.
- cælebipennella.** — *Artemisia campestris* et *A. vulgaris*; endroits sablonneux; fourreau noir, luisant, très large, assez plat; se trouve aussi sur le *Gnaphalium arvense*; mai. — Selon **MILLIÈRE**, la chenille se trouve en mars sur l'*Helichrysum angustifolium*.
- Lugduniella.** — Les *Vicia cracca* et *sepium*; fourreau noirâtre, en pistolet, à grandes oreilles, lâches, grisâtres de chaque côté; fin mai, commencement de juin.
- vibicella.** — *Genista tinctoria* et *G. sagittata*; bois bien abrités; fourreau noir, luisant, a l'aspect d'un légume; mai et juin.
- lixella.** — Graminées des pentes arides des terrains crétacés; fourreau blanchâtre; avril et mai. — Dans son jeune âge, sur le *Thymus serpyllum*. — *Holcus lanatus*; **STANTON**.
- ornatipennella.** — Mine les feuilles de plusieurs Graminées; au printemps, la chenille a acquis la moitié de son développement; mai.
- ochrea.** — *Helianthemum vulgare*; fourreau ocracé, duveteux, d'un pouce de long; octobre et mai, endroits secs, rocailleux.
- helianthemella.** — Mine les feuilles de l'*Helianthemum tuberaria*. — *H. guttatum*; **MILLIÈRE**; parvenue à toute sa grosseur les premiers jours de mai.
- Giraudi.** — La chenille vit, au printemps, sur les *Dorycnium*; la carène du fourreau est festonnée; **RAGONOT**, **MILLIÈRE**.
- vulpecula.** — La chenille vit, en mai, sur l'*Helichrysum italicum*? dont elle blanchit les feuilles en dessous; **MILLIÈRE**.
- saponariella.** — *Saponaria officinalis*; septembre. — Très visible à cause des taches blanches de la feuille; hiverne; ne mange plus au printemps; août; **JOURDHEUILLE**.
- musculella.** — *Dianthus superbus* et *D. carthusianorum*; août; hiverne, et en avril reprend une nouvelle nourriture.
- onosmella.** — *Echium vulgare*; fourreau gris-blanchâtre, hérissé; se chrysalide en mai et juin.
- inflata.** — *Silene inflata*; fourreau cylindrique, blanc sur les côtés des capsules; août. — **AVRIL**; **MILLIÈRE**.

- chamædriella.** — *Teucrium chamædrydys*; long fourreau brun, avec dentelures dirigées vers le bout; avril, mai.
- therinella.** — Sur les *Cirsium palustre* et *C. arvense*; prairies tourbeuses; septembre.
- troglyodytella.** — *Eupatorium cannabinum*, *Tanacetum vulgare*, *Hieracium murorum*, *Achillea millefolium*, *Solidago virgaurea*; mai et juin.
- chrysanthemi.** — *Chrysanthemum corymbosum*.
- lineolea.** — *Ballota nigra*, *Teucrium scorodonia*, *Stachys recta*, le long des haies; fourreau allongé taches brunes sous la feuille; à toute sa taille commencement de juin. — *Stachys sylvatica*.
- calycotomella.** — *Calycotome spinosa*; en hiver; fourreau long, de forme aiguë à l'extrémité; MILLIÈRE.
- nutantella.** — Capsules des *Silene nutans* et *otites*, en dedans d'abord, puis en dehors; août, passe l'hiver, se chrysalide en mai et donne son papillon à la fin de juin.
- lineariella.** — *Aster amellus*; septembre et octobre.
- pappiferella.** — *G. naphalium dioicum*, sur les coques rouges; juin.
- dianthi.** — Sur les capsules de *Dianthus carthusianorum*; juillet; JOURDHEUILLE.
- succursella.** — *Artemisia campestris*; juin.
- silenella.** — *Silene otites*, graines; septembre.
- odorariella.** — *Serratula cyanoides*; endroits abrités; fourreau brunâtre, droit, assez mince, avec des stries longitudinales plus pâles; mai ou juin.
- millefolii.** — *Achillea millefolium*; fourreau blanc, laineux, long de quatre à cinq lignes; fin mai, commencement de juin.
- gnaphalii.** — Feuilles intérieures du *Graphalium arenarium*; fourreau court, brun, un peu duveteux; mai et juin,
- argentula.** — Pied de l'*Achillea millefolium*, dans les fleurs flétries; fourreau blanchâtre, cylindrique, assez court. — Sur les graines; JOURDHEUILLE; septembre ou octobre, ne se chrysalide qu'au printemps suivant.
- tanaceti.** — *Tanacetum vulgare*, difficile à élever; s'échappe par les moindres fissures; juin.
- granulatella.** — Semences de l'*Artemisia vulgaris*; septembre et octobre.
- virgaureæ.** — Semences du *Solidago virgaurea*; ne se nourrit que

jusqu'en septembre ou octobre ; passe l'hiver sans manger et se chrysalide en mai suivant ; fourreau ressemblant à de grandes graines au milieu des soies de l'aigrette.

**otitæ.** — *Silene otites* et *S. nutans*, feuilles, surtout celles de la base ; taches d'un blanc verdâtre ; mai.

**laripennella.** — *Chenopodium album* ; fourreau formé de petites graines attachées ensemble ; septembre, octobre.

**flavaginella.** — *Chenopodium album* ; fourreau formé de graines ; septembre, octobre.

**salinella.** — *Atriplex patula*, sur les graines encore vertes ; septembre, octobre.

**artemiscolella.** — *Artemisia vulgaris*, fleurs desséchées ; fourreau en graines ; septembre.

**murinipennella.** — Graines des *Luzula*. — *Luzula pilosa* ; RAGONOT. — Le fourreau ressemble à la graine de la plante ; en juin, elle a atteint tout son développement, mais ne se chrysalide qu'au printemps suivant.

**Cœspititiella.** — Semences des *Juncus conglomeratus, effusus, glaucus* et *squarrosus* et *Luzula pilosa* ; four, cylindrique, ocracé, blanchâtre ; passe l'hiver ; vers la fin de mai elle se change en chrysalide. Août et septembre ; JOURDHEUILLE.

**Wilkinsonella.** — *Betula alba* ; août et septembre ; MERRIN. Est-ce une nouvelle espèce ?

#### GONIODOMA

**auroguttella.** — Dans les tiges d'*Atriplex*, four. formé de capsules ; janvier et février. Août en novembre pénètre dans la moelle ; s'y transforme en juin ; JOURDHEUILLE.

#### CHAULIODUS

**illigerellus.** — *Egopodium podagraria* ; dans les feuilles réunies ; fin mai, commencement de juin.

**daucellus.** — *Daucus carota* ; janvier, février et mars ; lie les feuilles après les avoir dépouillées de leur parenchyme ; DE PEYERIMHOFF.

**chœrophyllellus.** — *Chœrophyllum sylvestre* et *anthriscus sylvestris*,

*Heracleum sphondylium*, *Anglica sylvestris*, *Daucus carota* ;  
feuilles roulées et ombelles ; juin, septembre ; JOURDHEUILLE.

**Staintoniellus.** — *Osyris alba* ; mai ; fleurs.

## L A V E R N A

**idæi.** — *Epilobium angustifolium*.

**conturbatella.** — *Epilobium spicatum*. ROSLERSTAMM ; sur l'*E. angustifolium* ; STAINTON. — Selon M. JOURDHEUILLE : sur l'*Epilobium montanum* ; se métamorphose fin mai ; commencement de juin.

**propinquella.** — *Epilobium hirsutum* ; bords des ruisseaux ; commencement du printemps.

**lacteella.** — *Epilobium hirsutum* ; en août selon FREY.

**miscella.** — *Helianthemum vulgare* ; mai.

**rhamniella.** — *Rhamnus frangula* et *catharticus* ; fin mai.

**fulvescens.** — *Epilobium hirsutum* ; depuis juin jusqu'en août. Juin, septembre ; JOURDHEUILLE.

**ochraceella.** — Lie le sommet des jeunes tiges, *Epilobium hirsutum* ; mai.

**Raschkiella.** — *Epilobium angustifolium* ; mine les feuilles, dans les clairières humides ; juin, octobre.

**Schranckella.** — *Epilobium alsinifolium* et *parviflorum* ; dans les feuilles ; juillet. Avril, mai, juillet ; MERRIN.

**decorella.** — Les *Epilobium montanum*, *parviflorum*, *palustre*, *hirsutum*, *alpinum* ; juin, juillet et août ; *Epilobium tetragonum* ; JOURDHEUILLE.

**subbistrigella.** — *Epilobium montanum* ; juin, juillet et août ; et aussi l'*E. palustre*, dans les siliques ; MILL.

**Hellerella.** — Baies du *Cratægus oxyacantha* et fruits de *Prunus spinosa* ; février ; MERRIN.

**vinolentella.** — *Pyrus malus*.

**vanella.** — *Tamarix germanica* ; sur les fleurs en été ; MILLIÈRE.

**epilobiella.** — *Epilobium hirsutum*, *Circæa lutetiana* ; feuilles terminales ; juin, juillet. *Epilobium montanum* ; dans les capsules, et mine blanchâtre sur les feuilles ; JOURDHEUILLE.

**phragmitella.** — *Typha latifolia* ; en société ; fin de l'hiver ; commencement du printemps.

## CHRYSOCLISTA

- Linneella.** — Dans l'aubier des arbres malades ; janvier et février ;  
 JOURDHEUILLE. — Sous l'écorce du *Tilia intermedia* ; avril ;  
 MERRIN.
- terminella.** — *Circæa lutetiana* ; mines spirales ; mi-septembre.
- aurifrontella.** — Dans les rejetons du *Cratægus oxyacantha* ; septembre  
 à mars ; MERRIN.

## ÆCHMIA

- dentella.** — Têtes de *Chærophyllum* et *angelica sylvestris* ; juillet ;  
 MERRIN.

## TINAGMA

- Herrichiellum.** — *Lonicera periclymenum* ; mine les feuilles ; juillet et  
 août ; *Lonicera xylosteum* ; JOURDHEUILLE.
- transversellum.** — Les *Thymus* fleuris doivent nourrir la chenille ;  
 MILLIÈRE.

## DOUGLASIA

- ocnerostomella.** — Tiges d'*Echium vulgare* ; avril ; MERRIN.

## PERITTIA

- obscurepunctella.** — *Lonicera periclymenum* ; juillet ; MERRIN.

## HEYDENIA

- profugella.** — Graines des *Gentiana* ; septembre.
- fulvigutella.** — *Angelica sylvestris* ; septembre ; MERRIN.

## ASYCHNA

- modestella.** — Graines de *Stellaria holostea* ; juin ; MERRIN.
- orotella.** — *Polygonum aviculare* ; dans des gales en forme de gous-  
 ses ; sur les tiges ; parmi les semences ; automne ; depuis octo-  
 bre à mars, avril ; MERRIN.

## OCHROMOLOPIS

**ictella.** — *Thesium montanum* et *pratense* ; dans les pousses réunies ; mai.

## STAGMATOPHORA

**Dohrnii.** — Chenille rouge les feuilles de *Betonica officinalis* ; MILLIÈRE.

**Heydeniella.** — Dans les feuilles de *Betonica officinalis* et sous l'épiderme *Stachys sylvatica* ; août.

**pomposella.** — Dans les feuilles d'*Helychrisium arenarium* ; s'y transforme dans une toile blanche ; mai.

**Graborviella.** — La chenille vit en mars et avril sur plusieurs espèces de *Labiées* notamment la *Lavandula stoechas* ; MILLIÈRE.

**serratella.** — Autour des racines de *Linaria genistifolia* ; janvier et février.

**albiapicella.** — La chenille rouge au premier printemps les fleurs de la *Globularia vulgaris* ; MILLIÈRE.

## BUTALIS

**argyrogrammos.** — La chenille rouge les graines de *Carlina lanata* ; MILLIÈRE.

**obscurella.** — Sur le *Dorycnium* ; MARTORELL. — On trouva la chenille sur les Légumineuses herbacées ; MILLIÈRE.

**grandipennis.** — *Ulex europæus*, *Cytisus sagittalis* ; dans une toile très visible ; janvier, février, mars, avril, suivant les auteurs.

**fuscœnea.** — Sur l'*Helianthemum vulgare* ; juin ; avril ; MERRIN.

**senescens.** — *Thymus serpyllum* ; mai ; MERRIN. — On trouve la chenille en hiver sur les *Cistus*, notamment le *Monspeliensis* ; MILLIÈRE.

**dorycniella.** — *Dorycnium suffruticosum*, *Coronilla mimina* ; subit sa métamorphose en mai ; MILLIÈRE.

**Knochella.** — *Cerastium semidecandrum* ; sous une grande toile mince ; près des racines ; juin.

**cistorum.** — Ronge en hiver et au printemps les feuilles du *Cistus salvifolius* ; MILLIÈRE.

**chenopodiella.** — *Chenopodium* ; sur les pousses et les fleurs qu'elle couvre de soie, depuis octobre jusqu'en janvier et février. — *Chenopodium* et *Atriplex* ; avril ; MERRIN.

- dissimilella.** — La chenille lie au printemps les feuilles de l'*Helianthemum guttatum*, et du *Cistus salvifolius* ; MILLIÈRE.
- inspersella.** — *Epilobium montanum* ; sur les fleurs entre les feuilles ; en société, dans une toile blanche ; juin.
- heleniella.** — Sur l'*Inula helenium* ; en juin ; MILLIÈRE.
- insulella.** — *Epilobium* ; juin, juillet.
- cicadella.** — *Scleranthus communis* et *perennis* ; dans des tubes de soie, dévore les feuilles radicales ; mai.

## BRYOPHAGA

- acanthella.** — Lichen des murailles commencement de juin ; sous double et triple toile ; ROUAST.

## AMPHISBATIS

- incongruella.** — *Erica* et *Calluna* ; septembre ; MERRIN.

## PANGALIA

- Leuwenhøckella.** — Entre l'écorce des mézères ; janvier et février.

## ENDROSIS

- lacteella.** — Champignons du *Betula alba*, et d'autres arbres, ainsi que dans le bois pourri et même dit on de substances très diverses ; tout l'été et une grande partie de l'automne ; juillet ; JOURDHEUILLE.

## SCHRECKENSTEINIA

- festaliella.** — Sous les feuilles de *Rubus*, endroits ombragés des bois ; septembre.

## HELIODINES

- Roesella.** — *Chenopodium Bonus-Henricus* ; se chrysalide en juillet, sous une toile légère, sur l'épinard des jardins ; JOURDHEUILLE.

## STATHMOPODA

- pedella.** — *Alnus glutinosa* ; fruits ; fin septembre.
- Guerinii.** — *Pistacia terebinthus* ; septembre et octobre.

## COSMOPTERYX

- lienigiella.** — *Arundo phragmites* ; feuilles ; mines, longues et plates ; septembre.

**scribaiella.** — *Arundo phragmites* ; RAGONOT.

**Schmidiella.** — *Vicia sepium* ; août, septembre ; dans les feuilles. —  
Juillet, août ; JOURDHEUILLE.

**eximia.** — *Humulus lupulus* ; en août ; mine en hicroglyphe sur une  
nervure ; RAGONOT.

**orichalcea** — *Festuca arundinacea* ; août, septembre.

**Druryella-Hierochloæ.** — Août, septembre ; MERRIN. — *Hierochloa aus-  
tralis* ; RAGONOT.

## B A T R A C H E D R A

**præangusta.** — Dans les chatons tombés de *Populus* et de *Salix* ; avril.  
— Entre les feuilles de *Populus* et de *Salix* ; JOURDHEUILLE. —  
Juin ; MERRIN.

## A N T I S P I L A

**Pfeifferella.** — *Cornus sanguinea* ; juin, juillet et août ; mine ovale  
sur les feuilles de *Cornus*. — Septembre ; JOURDHEUILLE.

**Trectschkiella.** — *Cornus sanguinea* ; passe l'hiver avant de se chrysa-  
liser ; juin, milieu de juillet, jusqu'en octobre ; ANN. SOCIÉTÉ  
ENTOM. FRANCE.

**Rivillei.** — *Vitis vinifera* ; juillet.

## H E L I O Z E L A

**sericiella.** — *Quercus robur* et *Q. pedunculata* ; août. — *Corylus  
avellana* ; MERRIN.

**stannella.** — *Quercus robur* et *Q. pedunculata* ; septembre ; MERRIN.

**resplendella.** — Feuilles d'*Alnus glutinosa* ; mine ovale près du pétiole ;  
juillet, août et septembre.

## S T E P H E N S I A

**brunnicbiella.** — *Chenopodium vulgare* ; mine les feuilles, les brunit et  
les dessèche ; se chrysalide sous une autre feuille ; août. —  
Avril, juillet ; MERRIN.

## E L A C H I S T A

**quadrella.** — *Luzula pilosa* ; endroits ombragés ; mai.

**trapeziella.** — *Luzula pilosa* ; d'octobre à mars. — Avril ; MERRIN.

**tetragonella.** — *Carex montana* ; bois montueux ; fin avril jusqu'à  
fin mai.

**magnificella.** — *Luzula pilosa* ; mine, à la manière des *Lithocolletis*,  
la face supérieure de la feuille ; avril.

- gleichenella.** — Quelques *Carex* à feuilles étroites ; affectionne surtout le *Carex stellutata* ; passe l'hiver ; arrive à toute sa taille, en mars et avril. — *Luzula* et *Carex* ; MERRIN. — *Carex basilaris* ; MILLIÈRE.
- apicipunctella.** — Sur les *Aira* ; d'octobre à avril ; MERRIN.
- albifrontella.** — *Holcus mollis*, *Aira cæspitosa*, *Dactylis glomerata*, etc. ; feuilles à l'abri des haies ou dans les bois remplis de buissons ; avril, commencement de mai.
- cinereopunctella.** — *Carex glauca* ; endroits abrités, sur les collines crayeuses ; mine longue, droite, étroite ; mars, commencement d'avril.
- luticomella.** — *Dactylis glomerata* ; dans les feuilles et surtout les tiges qui se flétrissent et se colorent en jaune ; en captivité, il faut élever la plante chez soi ; avril.
- atricomella.** — *Dactylis glomerata* ; dans les feuilles, le long des haies et des palissades, endroits abrités ; taches blanchâtres presque linéaires ; fin mars, jusqu'au milieu de mai.
- Kilmunella.** — *Carex riparia* ; avril, juillet ; MERRIN.
- poæ.** — *Poa aquatica* ; feuilles peu décolorées, étangs ; avril, juillet et août.
- airæ.** — *Aira cæspitosa* ; bois abrités ; feuilles minées ; fin avril, commencement de mai.
- perplexella.** — *Aira cæspitosa* ; juin. — Avril ; MERRIN.
- subnigrella.** — *Bromus erectus* ; sur les collines crétacées ; mines longues, d'un vert jaunâtre, plus ou moins teintées de pourpre ; avril et juillet.
- incertella.** — Dans les feuilles de *Poa* ; mars.
- exactella.** — Dans les feuilles de *Poa* ; mars.
- nigrella.** — Sur une espèce de Graminées, probablement *Poa trivialis* ; avril et juillet ; FREY.
- Gregsoni.** — *Poa* ; dans les feuilles, taches pâles, larges ; mars, commencement d'avril.
- stabilella.** — *Aira cæspitosa*.
- Bedellella.** — *Avena pratensis* et aussi sur une autre Graminée dont STAINTON ignore le nom ; sommet miné, face inférieure pourprée, terrains crétacés ; avril et juillet.
- pullicomella.** — Mine la feuille de l'*Avena flavescens* sur toute sa largeur ; mars.

- obscorella.** — Dans les extrémités des feuilles d'*Holcus mollis*.
- arundinella.** — Feuilles de *Carex*.
- consortella.** — Sur une Graminée indéterminée; FREY.
- bifasciella.** — Feuilles d'*Aira* et de *Festuca*; endroits ombragés, mine d'un blanc jaunâtre, descendante; avril.
- Megeriella.** — *Melica uniflora*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus asper*, *Aira cæspitosa*; endroits abrités, près des haies; mine allongée, d'un brun pâle, un peu foncée; mars, avril.
- adscitella.** — *Sesleria cærulea*, *Aira cæspitosa*, *Brachypodium sylvaticum*; extrémité minée de haut en bas, mine large, terrains crétacés; mai.
- tæniatella.** — *Brachypodium sylvaticum*; près des haies; mine allongée, d'un brun blanchâtre foncé; octobre et novembre. — *Aira cæspitosa*; ANN. SOC. BELGE. — De septembre à avril; MERRIN.
- chrysodesmella.** — Dans l'extrémité des feuilles de *Carex montana* et de *Brachypodium pinnatum*; avril.
- gangabella.** — *Dactylis glomerata*; la mine fait paraître les feuilles renflées; de novembre à fin avril.
- zonariella.** — *Aira cæspitosa*; aussi, dit-on, sur les *Dactylis glomerata* et l'*Holcus mollis*; lieux abrités; sommet miné; avril à fin juin.
- serricornis.** — *Carex*; avril et août; MERRIN.
- cerusella.** — *Arundo phragmites*; dans les feuilles; grandes plaques blanchâtres, sur la face supérieure; avril, juillet et août.
- utonella.** — *Carex glauca*; localités arides et exposées au soleil; mai.
- rhynchospora.** — *Eriophorum* et *Carex*; juin; MERRIN.
- paludum.** — *Carex intermedia*; prairies tourbeuses; mine très longue; juin. — Et ajoute MERRIN: *Carex paniculata* et *C. paludosa*; avril.
- eleochariella.** — *Eriophorum* et *Carex*; mai; MERRIN.
- biatomella.** — *Carex glauca*; dans les feuilles des plantes un peu rabougries, tout à fait à découvert, sur les pentes crayeuses; mars, avril, juin et juillet.
- pollinariella.** — *Avena flavescens*; lisières des bois; avril.
- subocellea.** — La chenille vit en automne sur les *Origanum*, *Thymus*, *Asteriscus*, etc.; MILLIÈRE.
- disertella.** — *Brachypodium sylvaticum* et *Holcus mollis*; mine longue, comme celles des *Lithocolletis*; mai et juin.

- rufocinerea.** — *Holcus mollis*; touffes abritées près des haies; mines larges, aplaties; pendant l'hiver jusqu'en mars et avril.
- triatomea.** — Sur une Graminée; mai et juin.
- distigmatella.** — *Festuca ovina*; mai.
- argentella.** — *Dactylis glomerata*, et quelques espèces de *Bromus* avril et mai.

## URODELLA

- cisticolella.** — La chenille vit en hiver dans un petit fourreau portatif sur le *Cistus monspeliensis* et très rarement sur le *C. salviifolius*; MILLIÈRE.

## BEDELLIA

- somnulentella.** — *Convolvulus arvensis*; mine large, transparente et plate; août, septembre; JOURDHEUILLE. — Et aussi à Cannes sur le *Convolvulus althæoides*, à l'arrière-saison et en hiver; MILLIÈRE.

## ÆNOPHILA

- flava** (V.). — Chenille dans les vieux bouchons; au premier printemps; ROUAST.

## LITHOCOLLETIS

- roboris.** — *Quercus robur* et *Q. pedunculata*; inf. mine visible des deux côtés de la feuille; à la fin de l'automne, en septembre; JOURDHEUILLE. — Octobre et novembre; FOUCARD.
- Amyotella.** — *Quercus robur* et *Q. pedunculata*; inf. à la fin de l'automne. — Septembre et octobre; JOURDHEUILLE.
- hortella.** — *Fagus sylvatica*, *Salix caprea*, *Quercus robur* et *Q. pedunculata*; septembre et octobre; de PEYERIMHOFF et JOURDHEUILLE.
- sylvella.** — *Acer campestre*; inf.; juillet et octobre. — Mai; ANN. SOC. BELGE.
- pseudoplatanella.** — *Acer pseudoplatanus*; RAGONOT.
- teniculella.** *Acer pseudoplatanus*; RAGONOT.
- helianthemella.** — *Helianthemum vulgare*; inf.; lieux secs et rocheux; se chrysalide sous une autre feuille; juillet, septembre et octobre; STAUDINGER. — Vit en mai sur l'*Helianthemum guttatum*; MILLIÈRE.
- abrasella.** — *Quercus robur* et *Q. pedunculata*; inf.; STAUDINGER.
- Cramerella.** — *Quercus robur* et *Q. pedunculata*; inf.; STAUDINGER. — octobre, juillet et septembre; MERRIN.
- enella.** — *Carpinus betulus*; inf.; en hiver. — En automne; de PEYERIMHOFF. — Juillet, septembre; MERRIN.

- Heegeriella.** — *Quercus robur* et *Q. pedunculata*; inf.; mine petite, courbe le bord de la feuille; octobre; JOURDHEUILLE.
- alniella.** — *Alnus glutinosa*; inf.; mine ovale, entre deux nervures latérales, sous la feuille; juillet, octobre.
- alpina.** — *Alnus viridis*; FREY.
- strigulatella.** — *Alnus incana*; inf.; *Alnus glutinosa*: FOUCARD. — En automne, octobre; JOURDHEUILLE.
- nigrescentella.** — Larve inconnue; STAUDINGER.
- irradiella.** — *Quercus robur*; juillet, septembre; MERRIN.
- lautella.** — Divers *Quercus* et particulièrement *Q. pedunculata*; inf.; mine le long de la nervure médiane; octobre.
- sublantella.** — *Quercus*, *species?* STAUDINGER.
- Bremiella.** — *Vicia sepium*, *V. angustifolia*, *Trifolium medium*, *Medicago sativa*; inf.; feuilles d'un blanc verdâtre et contournées en dessous; juillet, septembre.
- insignitella.** — Les *Trifolium pratense*, *medium* et *repens*; *Medicago*; inf.; en automne; juillet, octobre; JOURDHEUILLE.
- alnivorella.** — Surface inférieure de l'*Alnus glutinosa*; septembre et octobre, puis en juin.
- ulmifoliella.** — Intérieur des feuilles de *Betula alba*; inf.; mai, juin, juillet, septembre et octobre. — La chenille mine les feuilles des *Genista germanica* et *tinctoria*; MILLIÈRE.
- spinotella.** — *Salix caprea*; inf.; en automne. — Juillet, octobre; JOURDHEUILLE.
- alnivorella.** — *Alnus glutinosa*; LAFAY.
- fraxinella.** — *Genista germanica* et *G. tinctoria*; sup.; la feuille est entièrement minée en hiver; septembre; JOURDHEUILLE.
- cavella.** — *Betula alba*; juin, octobre.
- viminetorum.** — *Salix viminalis*; sup.; septembre et octobre; JOURDHEUILLE. — *Quercus robur*; mine blanchâtre, souvent plusieurs dans la même feuille; juin. — Inf.; selon STAUDINGER.
- salicicolella.** — *Salix caprea* et plusieurs autres espèces de *Salix*; inf.; feuille contournée et pliée en dessous; mi-juin et mi-juillet, très abondante en septembre et octobre.
- salictella.** — Les *Salix purpurea*, *viminalis*, *amygdalina*, etc.; inf.; en automne.
- dubitella.** — *Salix caprea*; inf.; septembre, octobre et juin.
- Mannii.** — *Quercus robur*; inf.; WOCKE.

- pomifoliella.** — *Pyrus malus* cultivé et sauvage; inf. en hiver; juillet, octobre; JOURDHEUILLE. — Fin mars, avril; DE PEYERIMHOFF.
- cerisoella.** — Mine en dessus, sur les folioles du *Sorbus* cultivé; MILLIÈRE, DE PEYERIMHOFF.
- sorbi.** — *Sorbus aucuparia* et *S. torminalis*; juillet et septembre; JOURDHEUILLE. — En hiver et en automne; DE PEYERIMHOFF.
- torminella.** — *Sorbus torminalis* et *S. aucuparia*; inf.; feuilles tachées en dessus, se courbant en dessous; juillet et octobre.
- cydoniella.** — *Cydonia vulgaris*, *Pyrus communis*; inf.; la variété se prend sur le *Prunus mahaleb*; en hiver.
- cerasicolella.** — *Prunus avium* et *P. cerasus*; inf.; en hiver. — Juillet, octobre; JOURDHEUILLE.
- spinicoella.** — *Prunus spinosa* et *P. domestica*; inf.; et aussi Mirabellier, Pêcher, Abricotier, etc; inf.; juillet et fin septembre, octobre.
- padella.** — *Prunus padus*, inf.; en automne.
- oxyacanthæ.** — *Cratægus oxyacantha*; inf.; en automne. — Octobre; JOURDHEUILLE.
- faginella.** — *Fagus sylvatica*; inf.; feuilles présentant un petit pli entre deux nervures latérales; juillet, septembre et octobre.
- coryli.** — *Corylus avellana*; sup.; grandes taches blanchâtres sur le dessus, la feuille se courbant en haut; juillet, septembre et octobre. — Inf.; JOURDHEUILLE.
- carpinicolella.** — *Carpinus betulus*; inf. en juillet et septembre, octobre. — Sup.; JOURDHEUILLE.
- leucographella.** — La chenille mine en hiver les feuilles du *Calycotome spinosa*; MILLIÈRE.
- ilicifoliella.** — *Quercus robur*; inf.; WOCKE.
- caudiferella.** — *Quercus ilex*; RAGONOT.
- distentella.** — *Quercus robur* et *Q. pubescens*; inf.; en automne; MILLIÈRE.
- triguttella.** — Mai, juin, septembre et octobre; MERRIN.
- lantanella.** — *Viburnum lantana*; inf.; *Viburnum tinus* et *V. opulus*; MILLIÈRE; on voit en dessous une légère courbure. — Juillet et septembre ou octobre; avril; MERRIN.
- Junoniella.** — *Vaccinium vitis-idaea*; inf.; avril, mai et juillet.
- quinqueguttella.** — *Salix repens*; inf.; mai, juin, septembre, octobre.
- belotella.** — *Quercus ilex*, *Q. pubescens*; inf.; avril; MILLIÈRE.
- Parisiella.** — *Quercus pubescens* et *Q. robur*; inf.; WOCKE.

- quercifoliella.** — *Quercus robur* et *Q. pedunculata*; en automne.
- Messaniella.** — Les *Quercus robur*, *pubescens*, *ilex* et *suber*. *Fagus*, *Castanea vesca*, *Carpinus betulus*; inf.; mars, avril, juillet, octobre.
- platani.** — *Platanus*; STAUDINGER.
- Hesperiella.** — *Quercus coccifera*? inf.; STAUDINGER ET WOCKE.
- delitella.** — *Quercus robur* et *Q. pubescens*; inf.; WOCKE.
- quinquenotella.** — Tiges des *Genista sagittalis*; grandes taches blanches; avril et commencement de mai, août.
- scopariella.** — *Sarothamnus*? WOCKE.
- ulicicolella.** — *Ulex europæus*; septembre; MERRIN.
- Staintoniella.** — *Genista pilosa*; taches blanches; sup.; commencement du printemps jusqu'en mai, puis en août; JOURDHEUILLE.
- connexella.** — *Salix fragilis* et *S. alba*; inf.; STAUDINGER. — Les *Populus nigra*; octobre; DE PEYERIMHOFF.
- viminiella.** — *Salix caprea* et quelques autres espèces de *Salix*; inf.; septembre et octobre, puis fin juin, commencement de juillet.
- corylifoliella.** — Presque tous les arbres fruitiers, principalement: *Pyrus communis* et *P. malus*, *Sorbus aucuparia* et *S. torminalis*, *Cratægus oxyacantha*; sup.; inf.; grandes taches blanches, la feuille courbe en haut; juillet, septembre et octobre; JOURDHEUILLE.
- betulæ.** — *Betula alba*, *Pyrus malus* et *P. communis*; sup.; la chenille hiverne dans sa demeure; octobre; JOURDHEUILLE.
- caledoniella.** — *Cratægus oxyacantha*, *Betula alba*; juillet, septembre; MERRIN.
- suberifoliella.** — *Quercus suber*; inf.; STAUDINGER.
- nicellii.** — *Corylus avellana*; inf.; en hiver. — Octobre; JOURDHEUILLE.
- dunningiella.** — *Corylus avellana*; octobre; MERRIN.
- Froelichiella.** — *Alnus glutinosa*; inf.; en hiver. — En automne; DE PEYERIMHOFF. — Mine allongée, non ovale; juillet; JOURDHEUILLE.
- Stettinensis.** — *Alnus glutinosa*; sup.; taches d'un vert pâle, froncées, placées sur une nervure; juillet, octobre.
- Kleemannella.** — *Alnus glutinosa*; en hiver. — Juillet, septembre; MERRIN.
- Schreberella.** — *Ulmus campestris* en haies et en buissons; inf.; juillet fin septembre, commencement octobre.
- emberizæpunella.** — Différentes espèces de *Lonicera*; inf.; dans les bois

- et dans les jardins; la feuille se plisse droit et non obliquement; juillet, septembre; JOURDHEUILLE.
- tristigella.** — *Ulmus campestris*; commencement de l'été et octobre; FREY.
- Millierella.** — *Celtis australis*; inf.; MILLIÈRE..
- scabiosella.** — *Scabiosa columbaria*; inf.; feuille tachetée de pourpre en dessus, mine en dessous; au printemps et commencement août.
- trifasciella.** — Différentes espèces de *Lonicera*; inf.; lieux peu ombragés; mars, avril, juillet, octobre. — Septembre; ROUAST.
- agilella.** — *Ulmus campestris*; inf.; le long de la nervure médiane; août.
- pastorella.** — *Salix purpurea*, *S. viminalis*, etc.; inf.; mine très petite, bord à peine plié, juillet; JOURDHEUILLE. — Août, en automne; DE PEYERIMHOFF.
- populifoliella.** — Les *Populus pyramidalis*, *nigra*, *canadensis*; juillet et octobre.
- chiclanella.** — *Populus alba*; inf.; STAUDINGER.
- apparella.** — *Populus*; septembre et octobre.
- tremulæ.** — *Populus*; *Populus tremula*; inf.; juin. — Septembre; DE PEYERIMHOFF. — Août, septembre, octobre; JOURDHEUILLE.
- comparella.** — *Populus alba*; inf.; août et septembre.
- adenocarpî.** — *Adenocarpus hispanicus*; inf.; STAUDINGER.
- triflorella.** — *Cytisus triflorus*; décembre et mars.
- parvifoliella.** — *Adenocarpus parvifolius*; LAFAURY. — Mine la face supérieure des feuilles; septembre et octobre, puis en mai et juin.

## TISCHERIA

- complanella.** — *Quercus robur*; taches blanches, très apparentes, face supérieure de la feuille; septembre, passe l'hiver, se chrysalide au printemps suivant.
- dodonæa.** — *Quercus robur*, *Castanea vulgaris*; décembre. — Octobre; JOURDHEUILLE. — D'octobre en mars, avril; MERRIN.
- marginæa.** — *Rubus fruticosus*, *Rosa*; taches blanchâtres en forme de corne de bélier, sur la feuille. — Les chenilles en hiver et en juillet. — Octobre; JOURDHEUILLE. — En automne et en février; DE PEYERIMHOFF.
- Heinmanni.** — *Rubus*; octobre; WOCKE.
- gaunacella.** — *Prunus spinosa*; octobre. — Tout l'hiver; JOURDHEUILLE.

**angusticollella.** — Les *Rosa* ; grandes plaques d'un brun blanchâtre ; septembre, octobre.

## LYONETIA

**Clerkella.** — Sur les feuilles de *Prunus cerasus*, *Betula alba*, *Pyrus malus* ; la chrysalide sur la feuille, dans un léger cocon. — *Pyrus communis*, dans les bois ; DE PEYERIMHOFF. — Presque tous les arbres fruitiers ; RAGONOT. — Mai, jusqu'en octobre.

**prunifoliella.** — A l'extrémité des pousses de jeunes *Prunus spinosa* et *P. domestica*, *Cratægus oxyacantha*, *Pyrus malus*, etc. ; août septembre. — Juillet ; JOURDHEUILLE. — Grandes plaques d'un blanc verdâtre ; RAGONOT.

**daphneella.** — *Daphne gnidium* ; feuilles minées ; mai ; RAGONOT.

## PHYLLOGNISTIS

**suffusella.** — Mine très entortillée, sur les feuilles de *Populus alba* et *P. tremula* ; dans les bois et les bosquets ; mai, août.

**saligna.** — Mêmes mœurs sur *Salix viminalis* ; mai, août.

## CEMIOSTOMA

**susnella.** — *Populus tremula* et autres *Populus* ; se chrysalide en dehors de la mine ; juillet, août.

**spartifoliella.** — *Spartium scoparium* ; mine l'écorce des tiges ; tout l'hiver et le printemps. — Avril ; MERRIN.

**Wailesella.** — *Genista tinctoria* ; mine en automne jusqu'aux gelées.

**laburnella.** — *Cytisus laburnum* ; grosse plaque d'un vert pâle sur les feuilles ; fin juin, commencement de juillet et fin septembre. — Commencement d'octobre, et même en novembre ; DE PEYERIMHOFF.

**lotella.** — *Lotus major* ; juillet, août ; MERRIN.

**scitella.** — *Cratægus oxyacantha*, *Pyrus malus* et *P. communis* ; dans les jardins fruitiers ; taches brunes renflées, plus foncées au milieu ; depuis juillet jusqu'en septembre.

**lustratella.** — Feuilles d'*Hypericum perforatum* et *H. montanum* ; juin, septembre.

## BUCCULATRIX

**nigricomella.** — *Chrysanthemum leucanthemum* et *C. sinense* ; lieux arides ; sous les feuilles ; avril, juillet ; JOURDHEUILLE.

- cidarella.** — *Alnus*; sur les jeunes arbres; face supérieure de la feuille; août et septembre.
- ulmella.** — *Quercus robur* et *Ulmus campestris*; sous les feuilles; mine petite, entortillée, près de la nervure médiane; première quinzaine de septembre ou d'octobre, et en juillet.
- cratagi.** — *Cratægus oxyacantha*, et *Ulmus campestris*; FOUCARD.  
— Sous la feuille; août; JOURDHEUILLE.
- demaryella.** — *Betula alba*; mine dans l'angle laissé par la rencontre de la nervure principale et d'une nervure latérale, sur la surface supérieure; août.
- maritima.** — *Aster Tripolium*; marais salants; avril ou mai; juillet; JOURDHEUILLE.
- Boyerella.** — Chenille sous les feuilles d'*Ulmus campestris*; septembre.
- Lavaterella.** — *Lavatera olbia*; mine les feuilles en dessus, s'y transforme sous triple toile; novembre et décembre; MILLIÈRE.
- frangulella.** — Toutes les espèces de *Rhamnus*, principalement le *R. frangula*; août et septembre, se chrysalide février et mars.
- Ratisbonensis.** — *Artemisia campestris*; taches brunâtres; mi-mai.
- artemisiæ.** — Pousses d'*Artemisia campestris*; le cocon est attaché aux rameaux; avril et mai.
- gnaphaliella.** — *Gnaphalium arenarium*; endroits sablonneux; feuilles décolorées; chenille au cœur de la plante; fin mai.
- thoracella.** — Feuilles de *Tilia europæa*; mine à l'angle de la côte principale et des nervures; adulte, la chenille vit extérieurement; fin août, commencement de septembre. — Juin et octobre; JOURDHEUILLE.
- cristatella.** — *Achillea millefolium*; fin avril, commencement de mai.

## OPOSTEGA

- auritella.** — *Caltha palustris*; mai; MERRIN.

## TRIFURCULA

- immundella.** — *Cytisus scoparius*; avril et mai; MERRIN.

## NEPTIGULA

- pomella.** — *Pyrus malus*; en automnè.
- pygmæella.** — *Cratægus oxyacantha*; dans les jardins et les bois; ligne roussâtre sous la nervure principale; juillet, octobre.

- Æncella.** — *Pyrus malus*, cultivé; à la chute des feuilles.
- ruficapitella.** — Les *Quercus robur*, *pedunculata* et *suber*; juillet et mi-octobre à mi-novembre.
- samiatella.** — *Quercus robur* et *Q. pedunculata*; WOCKE.
- atricapitella.** — Mine les feuilles de *Quercus robur* et *Q. pedunculata*; septembre et juin. — Juillet, octobre; JOURDHEUILLE.
- ilicivora.** — *Quercus ilex*; fin mars; MILLIÈRE, DE PEYERIMHOFF.
- basisuttella.** — *Quercus robur* et *Q. pedunculata*; en octobre?
- rhamnella.** — *Rhamnus catharticus*.
- tiliæ.** — *Tilia sylvestris*, *T. europæa*; à la chute des feuilles taches brunâtres; juillet, septembre, octobre; STAUDINGER.
- anomalælla.** — *Rosa*; mine tortueuse, brune, remplie d'excréments; juillet et octobre.
- lonicerarum.** — *Lonicera xylosteum*, *L. caprifolium*; galerie près du bout de la feuille, s'élargissant ensuite sur le disque; octobre; STAUDINGER.
- viscerella.** — *Ulmus campestris*; dans les bois; taches couleur de boue; fin septembre, commencement d'octobre.
- aucupariæ.** — *Sorbus aucuparia*; juillet, septembre, octobre; JOURDHEUILLE.
- minuscolella.** — Feuilles des *Pyrus communis*, surtout sauvages; ligne centrale d'excréments noirs; juin et août. — Octobre; DE PEYERIMHOFF; d'après cet auteur elle aurait trois générations.
- tristis.** — *Betula nana*; WOCKE.
- paradoxa.** — *Cratægus oxyantha*; WOCKE.
- sanguisorbæ.** — *Sanguisorba officinalis*; WOCKE.
- pyri.** — *Pyrus communis*; WOCKE.
- oxyacanthella.** — *Cratægus oxyacantha*; dans les bois. — *Pyrus malus*; FOUCARD. — Longues lignes entortillées; juillet, fin septembre et octobre.
- desperatella.** — *Pyrus malus*; fin octobre.
- suberivora.** — *Quercus suber*; mine les feuilles en mars; MILLIÈRE.
- Nylandriella.** — *Sorbus aucuparia*; WOCKE.
- aceris.** — Les *Acer campestre*, *platanoïdes* et *pseudo-platanus*; fin septembre. — *Acer campestre*; octobre; JOURDHEUILLE.
- regiella.** — *Cratægus oxyacantha*; septembre.
- pretiosa.** — *Geum urbanum*; WOCKE.
- æneofasciella.** — *Agrimonia eupatoria*, *Tormentilla erecta*; chenille

- d'un vert jaune, tête jaunâtre, lignes plus sombres sur le dos; octobre.
- fragariella.** — *Fragaria vesca*, à l'ombre; cocon sous la feuille; octobre; JOURDHEUILLE.
- tormentillella.** — *Tormentilla erecta*; WOCKE.
- gai.** — Deux fois par an sur les feuilles de *Geum rivale*; WOCKE.
- dryadella.** — *Dryas octopetala*; WOCKE.
- splendidissimella.** — Les *Rubus idæus*, *fruticosus* et *cæsius*; octobre.
- aurella.** — *Rubus idæus*, *Geum urbanum*, *Fragaria vesca*; commencement du printemps, octobre; JOURDHEUILLE. — Toute l'année; ROUAST. — *Rubus fruticosus*, seulement; FOUCARD, WOCKE.
- nitens.** — *Agrimonia eupatoria*; juin, juillet.
- comari.** — *Comarum palustre*.
- gratiosella.** — *Cratægus oxyacantha*; printemps et été. — En automne; DE PEYERIMHOFF, JOURDHEUILLE.
- ulmivora.** — *Ulmus campestris*; septembre, octobre.
- prunetorum.** — *Prunus spinosa*; plaques brunes; octobre. — *Prunus domestica*; plus rarement sur le *Prunus padus*; DE PEYERIMHOFF. — Septembre et juin; ANN. SOC. BELGE.
- marginicolella.** — *Ulmus campestris*; dans les bois; mine brune, longue, sinueuse; juillet, septembre et octobre.
- speciosa.** — *Acer pseudo-platanus*; WOCKE.
- mespilicola.** — *Amelanchier vulgaris*, *Sorbus aria*; MARTORELL. — Juillet et octobre; FREY.
- acetosæ.** — *Rumex acetosa* et *R. acetosella*; taches d'un rouge assez vif; endroits abrités, terrains crétacés; juillet et de nouveau en septembre et octobre.
- alnetella.** — *Alnus glutinosa*; mine longue et étroite; octobre.
- lediella.** — *Ledum palustre*; WOCKE.
- dulcella.** — *Fragaria vesca*; WOCKE.
- continuella.** — *Betula alba*; octobre; JOURDHEUILLE.
- centifoliella.** — *Rosa centifolia*; mine contournée, dont les excréments n'occupent pas toute la largeur; commencement d'octobre.
- microtheriella.** — *Corylus avellana*, *Carpinus betulus*; se trouve en juillet, septembre et octobre.
- inæqualis.** — *Fragaria vesca*; WOCKE.
- betulicola.** — *Betula alba*; octobre.

- plagicolella.** — *Prunus spinosa* et *P. domestica*; taches blanchâtres, rondes; juillet, août, septembre et octobre.
- ignobiliella.** — *Crataegus oxyacantha*; taches pâles, mines noirâtres; juillet, août, octobre.
- poterii.** — *Poterium sanguisorba*; plantes abritées; juin.
- geminella.** — *Sanguisorba officinalis*; WOCKE.
- filipendulæ.** — Feuilles de *Spiræa filipendula*; WOCKE.
- distinguenda.** — *Betula alba*; WOCKE.
- Tengstroemi.** — *Rubus chamæmorus*; WOCKE.
- glutinosa.** — *Alnus glutinosa*; octobre.
- luteella.** — *Betula alba*; STAUDINGER. — Juillet et septembre; MERRIN.
- sorbi.** — *Sorbus aucuparia*; juillet.
- turicella.** — *Fagus sylvatica*; septembre, octobre et en juin.
- hemargyrella.** — *Corylus avellana*, *Carpinus betulus*; juin, juillet, septembre, octobre. — *Corylus avellana*; octobre; JOURDHEUILLE.
- argentipedella.** — *Betula alba*; plaques d'un brun clair, avec la partie centrale d'un brun foncé; octobre, novembre.
- Tityrella.** — *Fagus sylvatica*; feuilles abritées; mines longues, tortueuses, pâles; juillet et commencement d'août.
- Freyella.** — *Convolvulus sepium* et *C. arvensis*; octobre.
- malella.** — *Pyrus malus*, sauvage et cultivé; juillet et fin septembre jusqu'au milieu d'octobre.
- agrimoniella.** — *Agrimonia eupatoria*, feuilles radicales; se métamorphose dans la mine; octobre; JOURDHEUILLE.
- Schleichiella.** — *Sanguisorba officinalis*; WOCKE.
- atricollis.** — *Pyrus malus* sauvage, *Crataegus oxyacantha*; mine étroite d'abord, puis formant une tache d'un brun verdâtre sur les feuilles; octobre.
- angulifasciella.** — Feuilles du *Rosa canina*, dans les haies; plaques grandes, irrégulières; novembre.
- rubivora.** — *Rubus cæsius*; dans les bois humides; octobre. — *Rubus fruticosus*; FOUCARD.
- arcuatella.** — *Potentilla fragariastrum*, *Fragaria vesca*; fin juin, commencement octobre.
- aterrima.** — *Crataegus oxyacantha*; WOCKE.
- obliquella.** — *Corylus avellana*; octobre; JOURDHEUILLE.
- myrtillella.** — *Vaccinium myrtillus*; juin, septembre, octobre.

- salicis.** — *Salix caprea* et *S. viminalis* ; taches d'un jaune brun ; juin, juillet, septembre et octobre.
- suberis.** — *Quercus suber* ; mine en février et mars ; DE PEYERIMHOFF.
- castanella.** — *Castanea vulgaris* ; octobre ; MERRIN.
- carpinella.** — *Carpinus betulus* ; lieux ombragés ; octobre ; JOURDHEUILLE.
- floslactella.** — Feuilles du *Corylus avellana*, *Carpinus betulus* ; mines étroites ; juillet, fin septembre et octobre.
- fagella.** — *Fagus sylvatica* ? WOCKE.
- lapponica.** — *Betula alba* ? WOCKE.
- diversa.** — *Salix viminalis* ? WOCKE.
- vimineticola.** — *Salix viminalis* ; FREY.
- helianthemella.** — *Helianthemum vulgare* ; juin et juillet.
- septembrella.** — *Hypericum pulchrum* et *H. perforatum* ; endroits ombragés ; mine courbée, noirâtre, entortillée, le cocon est dans la mine ; de septembre à décembre.
- catharticella.** — *Rhamnus catharticus* ; mine ondulée, d'un gris verdâtre ; commencement de juillet jusqu'au commencement d'août et de nouveau en octobre. — Mine en mars sur *Rhamnus alaternus* ; MILLIÈRE.
- intimella.** — *Salix* ; septembre ; MERRIN.
- Weaweri.** — *Vaccinium vitis-idaea* ; feuilles inférieures tuméfiées ; avril et mai.
- sericopeza.** — *Acer pseudo-platanus* ; le cocon sur le tronc. — *Acer campestre* et *A. platanoides* ; WOCKE ; juin.
- decentella.** — *Acer pseudo-platanus* ; le cocon d'un jaune brun sur les écorces ; en octobre.
- trimaculella.** — Les *Populus nigra*, *pyramidalis* et *tremula*. — *Populus alba* ; FOUCARD. — Mine ondulée, irrégulière, pâle ; juillet et octobre.
- promissa.** — *Pistacia lentiscus*, *Rhus cotinus* ; février ; MILLIÈRE.
- cistivora.** — *Cistus monspeliensis* et *C. salviifolius* ; mine, en février ; MILLIÈRE, DE PEYERIMHOFF.
- assimilella.** — *Populus alba* ; septembre. — *Populus tremula* ; octobre ; DE PEYERIMHOFF.
- subbimaculella.** — *Quercus robur* et *Q. pedunculata* ; octobre et novembre.
- bistrimaculella.** — *Betula alba* ; octobre.
- argyropeza.** — *Populus tremula* ; taches brunâtres, près du pétiole ;

- apicella.** — *Populus tremula* ; octobre ; JOURDHEUILLE.  
**turbidella.** — *Populus nigra* et *P. alba* ; WOCKE.  
**hannoverella.** — *Populus pyramidalis* ; WOCKE.  
**pulverosella.** — *Pyrus communis* sauvage ; mine plate, large ; juin, juillet. — *Pyrus malus* ; STAUDINGER et WOCKE.  
**cryptella.** — *Lotus corniculatus* ; fin septembre et octobre ; FREY.  
 — Aussi *Lotus major* ; WOCKE.  
**euphorbiella.** — *Euphorbia dendroides* ; WOCKE.  
**ilicivora.** — *Quercus ilex* ; mars et avril.  
**cistivora.** — *Cistus monspeliensis* et *C. salviæfolius* ; tout le mois de janvier.

## MICROPTERYGINA

### MICROPTERYX

- salthella.** — *Caltha palustris*.  
**sparmannella.** — *Betula alba* ; mine les feuilles et s'enfonce ensuite dans la terre ; juin.  
**fastuosella.** — *Corylus avellana* ; juin. — AVRIL ; MERRIN.  
**subpurpurella.** — *Quercus robur* ; plaques brunâtres, pâles, sur les feuilles ; commencement de juin.  
**unimaculella.** — *Betula alba* ; mi-mai, août ? MERRIN.  
**semipurpurella.** — *Betula alba* ; août ; MERRIN.  
**purpurella.** — *Betula alba* ; août ? MERRIN.

## PTEROPHORINA

### AGDISTIS

- Heydenii.** — *Euphorbia spinosa*, *Lotus angustissimus* ; à toute sa grosseur commencement d'avril. — Et aussi *Atriplex halimus*, MILLIÈRE.  
**lerinsis.** — Vit sur le *Statice cordata* ; ronge les feuilles en hiver et les fleurs en été ; se transforme mi-juin ; MILLIÈRE.

- tamaricis.** — *Tamarix gallica*, *Myricaria germanica*; passe l'hiver et atteint toute sa taille, les premiers jours de mai; MILLIÈRE.
- staticis.** — *Statice cordata*; sur les feuilles en hiver et les fleurs en été; a toute sa grosseur fin de mai; MILLIÈRE.
- bennetii.** — *Statice limonium*; mai; MERRIN.

## GNÆMIDOPHORUS

- rhododactylus.** — Les *Rosa centifolia*, *canina* et *campestris*; dans les jeunes pousses; en mai et juin.

## PLATYPTILIA

- ochrodactyla.** — Dans les pousses de *Tanacetum vulgare*; juillet; JOURDHEUILLE.
- Bertrami.** — Dans les tiges d'*Achillea ptarmica* et *A. millefolium*; juin.
- similidactyla.** — Pousses et tiges de *Senecio aquaticus*; mai et août; MERRIN.
- gonodactyla.** — Dans les tiges de *Tussilago farfara*; RAGONOT. — Juin; JOURDHEUILLE. — La première génération dans les fleurs du *Tussilago farfara*.
- Zetterstedtti.** — *Senecio sylvaticus*, tiges; JOURDHEUILLE.
- nemoralis.** — Dans les tiges de *Senecio saracenicus*; lieux humides; fin août.
- tesseradactyla.** — Dans les tiges de *Gnaphalium dioicum*; mars.

## AMBLYPTILIA

- acanthodactyla.** — Feuilles de l'*Ononis spinosa*; FOUCARD. — Sur les fleurs d'*Ononis spinosa* et *Stachys palustris*; juillet, octobre; JOURDHEUILLE.
- cosmodactyla.** — *Aquilegia vulgaris*; juillet; FREY.

## OXYPTILUS

- lætus.** — *Andryala sinuata*; sort de l'œuf en juillet et se chrysalide au bout de vingt jours; lie les fleurs naissantes; MILLIÈRE.
- pilosellæ.** — Tiges d'*Hieracium pilosella*; mai; juin; MERRIN.
- hieracii.** — Tiges d'*Hieracium umbellatum*; juin.
- didactylus.** — *Leonurus cardiaca*; au printemps.

**parvidactylus.** — *Hieracium pilosella*, *Stachys alpina*; seconde moitié d'avril; FREY.

## MIMÆSEOPTILUS

**phœodactylus.** — *Ononis spinosa*; mai, juin.

**pelidnodactylus.** — Tiges de *Saxifraga granulata*; prairies montueuses janvier et février. — Mai; JOURDHEUILLE.

**serotinus.** — Tiges et fleurs de *Scabiosa*; mai, octobre. — *Linaria cymbalaria*; MILLIÈRE.

**zophodactylus.** — Dans les capitules vertes de l'*Erythrœa centaurium*; juillet, août et septembre.

**aridus.** — Fleurs et bourgeons de *Coris monspeliensis*; avril, mai; MERRIN.

**plagiodactylus.** — *Globularia alypum*; se métamorphose en janvier. — *Scabiosa*, *Veronica chamædrys*; avril, mai; MERRIN.

**graphodactylus.** — *Gentiana lutea*; FREY.

**pterodactylus (fuscus).** — *Veronica chamædrys*; mai. — *Chenopodium album*, *Atriplex patula*; août, octobre; JOURDHEUILLE.

**lithodactylus.** — *Inula salicifolia* et *I. dysenterica*; juin; FREY.

**Constanti.** — *Inula montana*; en captivité, s'élève sur les *Inula conyza*, *helenium*, *Vaillantii*; en mai; papillon fin juin; RAGONOT.

## PTEROPHORUS

**monodactylus.** — *Convolvulus arvensis*; mai et juin.

## LEIOPTILUS

**scarodactylus.** — Fleurs des *Hieracium umbellatum* et *murorum*; août; JOURDHEUILLE.

**lienigianus.** — *Artemisia vulgaris*; mai, juin; MERRIN.

**tephradactylus.** — *Solidago virgaurea*; perce les feuilles; juillet; JOURDHEUILLE. — Dans les lieux ombragés; de septembre en mars; MERRIN.

**carphodactylus.** — Dans les rameaux et les tiges de *Conyza squarrosa*; avril, mai. — Juillet; JOURDHEUILLE.

**microdactylus.** — *Eupatorium cannabinum*; passe l'hiver, se métamorphose sous la mousse ou les feuilles sèches. — Hiverne dans les tiges, se chrysalide dans la plante, vit en septembre; JOURDHEUILLE.

- osteodactylus.** — *Senecio nemorensis*, fleurs du *Solidago virgaurea*; octobre; JOURDHEUILLE. — De septembre en mars, avril; MERRIN.
- cinerariæ.** — Vit peut-être sur le *Senecio cineraria*; le papillon vole, fin mai, commencement de juin.
- brachydactylus.** — *Prenanthes purpurea*; mai et juin; FREY. — *Lactuca muralis*, etc.; MERRIN.

## ACIPTILIA

- galactodactyla.** — *Arctium lappa*; mai; MERRIN.
- spilodactyla.** — *Marrubium vulgare*; mai, juin; MERRIN. — *Echium?* MARTORELL.
- xanthodactyla.** — *Arctium lappa*; fin mai, commencement de juin. — Dans le parenchyme des feuilles de *Jurinea cyanoïdes*; juillet; JOURDHEUILLE.
- baliodactyla.** — *Organum vulgare*; juin.
- tetradactyla.** — *Thymus serpyllum*, *Pulmonaria officinalis*; ronge les feuilles radicales, juin; MILLIÈRE.
- pentadactyla.** — *Prunus domestica* et *P. spinosa*, *Convolvulus sepium* et *C. arvensis*; mai; MERRIN.

## ALUCITINA

## ALUCITA

- dodedactyla.** — *Lonicera xylosteum*; dans les rameaux de l'année précédente; la chenille produit une petite boursoufflure; juin.
- hexadactyla.** — *Lonicera xylosteum*; calice de la fleur; juin, juillet.
- Hubneri.** — *Lonicera xylosteum*; à toute sa taille en mai.