

**BULLETIN BI-MENSUEL**

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

ET DES

**SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON**

RÉUNIES

*Secrétaire gen.* : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; *Trésorier* : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement annuel	France et Colonies fr <sup>es</sup>	10 fr.
	Etranger . . . .	15 fr.

<b>SIÈGE SOCIAL A LYON :</b> 33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)
----------------------------------------------------------------------

3080 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux  
c/c Lyon, 101-98**AVIS A NOS LECTEURS**

*Une grève des principales Imprimeries lyonnaises, qui a duré plus d'un mois, ne nous a pas permis de publier en temps voulu les Bulletins n<sup>os</sup> 1 et 2 de 1930, le premier Bulletin de cette année porte donc les numéros 1, 2 et 3. Nous prions nos Collègues d'excuser ce retard tout à fait indépendant de notre volonté.*

**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions.***Ont été admis à la séance du 10 décembre 1929 :*

M. Bozon, M<sup>me</sup> Durand, M<sup>lle</sup> Pagès, MM. Aubin, Bouttet, Gaune, Pivot, Dubost, Arnaud, Cariffa, Lacombe, Rochaix, Faury, Roche, Bollache, Imatte, Laucquin, Barbezat, Bourcier, Desplace, Dussot, Bouvard, Bonathier, Hoffert, Rousset, Vancl, Eyraud, Charbonnier, Bienfait, Gay, Vuillemet, Bouillot, Bonhotte, Martin, Alezaïs, Sincine, Magnin, Girardant, M<sup>me</sup> Spaeni, MM. Vidil, Bourdier, Lavoilette, Tavardon, Janin, M<sup>lle</sup> Berthier, MM. Molimard, Gianinetto, Maire, Fangauthier, Meignier, Rey, Ferrand, Chazard, Raby, Fayolle, Pagnoz, Dudiviat, Bonhomme, Dégranges, Sisley, Heyriès, Bruyère, Martigny, Bonnet, Bourron, Manfredi, Reverter, Boissy, Montfort, Triboulet, Monestier, Dupont, Doleatto, Bertelon, Blanc, M<sup>lle</sup> Berton, MM. Forest, Dupond, Dury, Saubiez, Roche, Lecomte, Oriol, M<sup>me</sup> Rousset, MM. Nicolas, Baudin, Reboul, Bosdure, Châtelain, Bourriquant, Poullard, Ducoin, Duchêne, Sordet, Grange, Bernard, La Batie,

## SECTION BOTANIQUE

Séance du 22 Octobre 1929

### Stations de « *Lappa tomentosa* » dans le Haut-Bugey, aux environs de Brénod

Par M. QUENEY

Les Bardanes sont des plantes de décombres bien connues par leurs capitules munis de bractées terminées par des crochets en forme de hameçons. La pharmacie utilise leurs racines dans le traitement des affections de la peau notamment contre la furonculose contre laquelle elles sont très efficaces.

On en connaît trois espèces : *Lappa major*, *L. minor* assez communes au voisinage des habitations, dans les produits de démolitions notamment, faciles à distinguer l'une de l'autre par leurs capitules, ceux de la première espèce étant bien plus grands que ceux de la seconde; de plus ceux de *L. minor* présentent très souvent des poils aranéux qu'on ne trouve pas sur ceux de *L. major*.

La troisième espèce, ou le troisième type qu'on peut considérer comme une espèce distincte présente les caractères suivants comparés à ceux de *L. minor* principalement et avec laquelle on pourrait la confondre : tiges moins rigides que celles de *L. minor*, feuilles un peu moins allongées, à dents moins saillantes, à face inférieure moins blanche; les capitules intermédiaires comme grosseur, entre ceux de *L. major* et de *L. minor* sont enveloppés d'un abondant duvet aranéux qui les fait ressembler à de petits capitules de *Cirsium eriophorum*. Ces capitules, surtout quelque temps avant la floraison, sont groupés en corymbes compacts; ces deux caractères donnent à la plante une physionomie caractéristique qui permet aussitôt de la distinguer des deux autres espèces de *Lappa*. Les graines de *L. tomentosa* sont de dimensions intermédiaires entre celles de *L. major* et celles de *L. minor*. Quant à l'époque de floraison, elle a lieu en août à peu près en même temps que celle de *L. minor*, un peu plus tôt que celle de *L. major*. L'espèce la plus répandue est *L. minor*, puis vient *L. major*, — on les trouve assez fréquemment réunies aux mêmes endroits —; cependant, il y a des localités où c'est l'une qui prédomine —, c'est ainsi qu'à Brénod, on ne trouve guère que *L. minor* — à Outriaz et Lanténay, c'est surtout *L. major* — à Hauteville, à peu près autant l'une que l'autre. Quant à *L. tomentosa*, qui fait surtout l'objet de cette note, je ne l'ai rencontré que dans trois stations, à l'exclusion des deux autres espèces et encore les pieds y étaient-ils très rares. Voici quelles sont ces trois stations:

1<sup>o</sup> Près de l'ancienne ferme du Molard au bord du ravin, et à côté du chemin qui va de cette ferme vers le cimetière de Brénod;

2<sup>o</sup> Dans une haie, bordant le chemin près de la ferme dite La Pérouse;

3<sup>o</sup> Sur un tas de décombres à côté d'une des maisons forestières au lieu dit Meyriat où existait autrefois l'abbaye du même nom. Cette dernière station est indiquée dans une ancienne édition de la Flore de l'abbé CARRIOT, c'est cette indication qui a orienté mes recherches et qui m'a permis de retrouver la plante. Le même auteur la signale au Revermont, à Lavatey, près du col de La Faucille.

*Lappa tomentosa* est une plante intéressante et rare et dont l'existence un peu oubliée m'a semblé nécessaire d'être rappelée aux membres de la Société Linnéenne.