

# BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

**SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON**

RÉUNIES

*Secrétaire gen.* : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges; *Treasor.* : M. F. RAVINET, \*, 11, r. Franklin

 Abonnement } France et Colonies fr<sup>es</sup> 10 fr.  
 annuel } Etranger . . . . 15 fr.

**SIÈGE SOCIAL A LYON :**  
 33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

2779 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux  
c/c Lyon, 101-98

## PARTIE ADMINISTRATIVE

### Admissions

*Ont été admis à la séance du 10 novembre.*

 MM. Millet, Clozel, Péchoud, M<sup>me</sup> Clem, M. Esman, M<sup>me</sup> Rigoudy, MM. Ratalino, Duroussay, Paget, Duclot, Durand, Rogès, Ferre, Peloux, Saladin, Dumas, Esteler, Trillat, Chaffanjon, Scarenzi, Rignol, Vernet, M<sup>me</sup> Bouvier, M. Vidal, M<sup>lle</sup> Couibes, MM. Rayroud, Grata, de Costanzi, M<sup>me</sup> Pereny, M. Henriot.

## SECTION BOTANIQUE

ORDRE DU JOUR

DE LA

**Séance du Mardi 24 Novembre, à 20 h. 30**

- 1<sup>o</sup> M. le Professeur BEAUVÉRIE. — Adolf ENGLER, sa vie et ses œuvres;  
 2<sup>o</sup> Présentation de plantes.

## SECTION ENTOMOLOGIQUE

ORDRE DU JOUR

DE LA

**Séance du Mardi 1<sup>er</sup> Décembre, à 20 h 30**

- 1<sup>o</sup> M. J. JACQUET. — Une aberration curieuse de *Timarcha coriaria* F., capturée par M. BANGE, à Neuville-sur-Saône (Rhône);

raliter paulo piceo maculatis ; capite thoraceque dense punctatis ; capite parum elongato, postice ninapresso ; antennis elongatis, gracilibus, articulis ultimis paulo latioribus ; thorace parum elongato, antice paulo dilatato-rotundato ; elytris parum elongatis, subparalleles, postice attenuales, antice fere indistincte depressis, fortiter et dense punctatis. Long. 3 mill. Afrique Australe : Boroma (coll. Pic).

Diffère du précédent par les antennes moins grêles à l'extrémité et les élytres postérieurement maculés.

*Osdara metallica* n. sp. Subovata, nitida nigra elytris aeneo-rufis et nigro nitido tuberculatis, tarsi rufis ; capite dense rugulosa punctato ; thorace breve, sat lato, lateraliter inciso, medio subsulcato, dense et diverse granuloso. ant punctato ; scutello indistincte ; elytris latis et brevibus, apice attenuatis et valde declivibus, multi et diverse tuberculatis. Long. 6-7 mill. Indes : Madura (coll. Pic).

Espèce caractérisée par sa coloration foncée à reflets métalliques.

*Bruchus subaenescens* n. sp. Oblongus, nitidus, supra paulo et uniformiter griseo pubescens, infra corpore pro parte dense pubescente, niger, supra paulo aenescens, antennis, pedibus (femoribus posticis ad basin nigris), abdomine late pygidioque rufis ; antennis brevibus, apice latioribus ; thorace breve et lato, antice attenuato, minute et dense punctato ; elytris parum elongatis, lateraliter subarcuatis, striatis, intervallis multi punctatis ; femoribus posticis longe dentatis. Long. 3 mill. Brésil (coll. Pic).

Par sa coloration du dessus a un faux air de *B. obsoletus* Say ; il s'en distingue, à première vue, par le revêtement uniforme des élytres et leur reflet un peu bronzé.

*Lema semiopaca* n. sp. Grandis, oblongo-elongata, pro parte opaca, nigra, supra rufa, membris nigris, articulo 1<sup>o</sup> antennarum et pedibus anticis pro parte rufescentibus ; capite multiimpresso aut sulcato ; antennis sat validis apice paulo attenuatis ; thorace parum breve, sat lato, medio strangulato, postice transverse sulcato, fere impunctato ; elytris subparalleles, postice attenuatis, lineato punctatis, apice sulcatis ; infra corpore diverse pubescente. Long. 8 mill. Tonkin (coll. Pic).

Par sa grande taille se rapproche de *forticornis* Pic ; en diffère, à première vue, par la tête plus sculptée et l'aspect non très brillant.

*Antipa (Titubaea) tonkinea* n. sp. Oblonga, nitida, testacea, mandibulis, oculis, antennis apice, pectore pro parte, geniculis, tibiis anticis apice et tarsi pro parte et diverse nigris, capite parum robusto, parum punctato inter oculos vage et minute brunneo bimaculato ; antennis sat gracilibus ; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato, parum punctato ; elytris brevibus, postice attenuatis, minute punctatis, lateraliter marginatis : infra corpore dense argenteo pubescente ; pedibus anticis valde elongatis. Long. 8 mill. Tonkin (coll. Pic).

Diffère de *Paviei* Lef. au moins par la coloration plus claire du dessous du corps.

## SECTION BOTANIQUE

Séance du 27 Octobre

### Dissémination de « *Lepidium virginicum* »

Par M. QUENEY

Inconnue dans la région lyonnaise il y a peu d'années, *Lepidium virginicum* y semble aujourd'hui très répandue. J'ai signalé, il y a un an, à la session

d'octobre, l'existence de cette plante d'origine nord-américaine dans deux stations, la première à la Croix-Rousse en bordure d'une rue neuve, la rue Deleuvre, l'autre au sud de Lyon, sur la digue qui va du pont Pasteur au barrage de la Mulatière. Or, là où il n'y avait que quelques pieds, il y en a cette année des centaines dont quelques-uns de plus de 40 centimètres ; de plus, cette année, j'ai reconnu en me promenant à Lyon et aux alentours près d'une vingtaine d'autres stations. Leur emplacement sur des déblais, sables, graviers, montre qu'il s'agit d'ensemencements récents et que des graines de *L. virginicum* ont dû être amenées là avec des matériaux de construction provenant d'une région où cette plante est déjà naturalisée — Avant la guerre, cette plante n'a jamais été présentée aux séances de la Société botanique ; elle ne figure pas dans la dernière édition de Carriot et la seule mention que j'ai trouvée à son sujet est une note de VIVIAND-MOREL parue dans les *Annales de la Société botanique* de 1901 ; dans les Comptes rendus du tome XXVI on lit en effet ceci : « VIVIAND-MOREL signale l'introduction dans le domaine de la flore provençale d'une plante américaine *Lepidium virginicum* que M. KIEFFER vient de trouver près de Marseille à la colline Puget. On sait que cette espèce, d'abord observée à Bayonne, s'est propagée dans les départements des Basses et Hautes-Pyrénées, des Landes, de la Gironde, des Charentes, de la Loire-Inférieure, de la Manche et même dans plusieurs localités du centre de la France. » A cette époque, c'est-à-dire voici une trentaine d'années, elle était donc inconnue à Lyon ; on peut aujourd'hui la considérer comme faisant partie de la flore lyonnaise. Sans attacher aux observations qui précèdent plus d'importance qu'elles n'en méritent, j'ai pensé qu'il était intéressant de montrer sur un exemple nouveau le rôle que l'homme joue dans la dissémination des espèces.

### Herborisation publique du Mont Pilat

Cette herborisation se fit sous la direction de M. Octave MEYRAN, le spécialiste de la flore de cette région, le 12 juillet 1931.

Le programme de l'herborisation a été le suivant :

Matinée : montée dans les bois de la Jasserie.

Soirée : herborisation autour de la source du Giers (Prairie de la Grange), et à la ferme de Bot.

Donnons une liste des plantes récoltées en faisant remarquer que l'époque tardive de cette sortie n'était pas favorable à une récolte abondante.

En montant à la Jasserie :

Parmi les *Calluna* et les *Vaccinium*, notons :

*Polygonum bistorta*, *Gallium saxatile*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*, *Sarothamnus purgans*, *Arnica montana*, *Poa sudetica*, *Gnaphalium dioicum*, *Polystichum spinulosum*, *Alchemilla alpina*.

Dans les bois :

*Deschampsia flexuosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Viola sudetica*, *Adenostylis albiflora*, *Prenanthes purpurea*, *Potentilla aurea*, *Polygonatum verticillatum*, *Stellaria nemorum*.

Prairie de la Grange et source du Giers :

*Scorzonera plantaginea* (en fruit), *Orchis maculata*, *Angelica pyrenaica*, *Eriophorum angustifolium*, *Doronicum austriacum*, *Juncus squarrosus*, *Trifolium spadiceum*, *Carum verticillatum*, *Orchis conopsea*, *Carex stellulata*, *Centaurea nigra*, *Knautia longifolia*, *Campanula lignifolia*, *Gentiana campestris*, *Salix aurita*, *Drosera rotundifolia*, *Chærophyllum cicutarium*, *Viola sudetica*, *Parnassia palustris*.