

# ANNALES

DE LA

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

---

1831

*Année 1915*

(NOUVELLE SÉRIE)

TOME SOIXANTE DEUXIÈME

---

LYON

H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

36, PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU

MÊME MAISON A GENÈVE ET A BALE

1916

# DESCRIPTION

D'UNE

## NOUVELLE ESPÈCE DE TACHINAIRE

PAR

R. GRILAT

---

*Exorista Cotei*, nov. sp.

*Caractères communs aux deux sexes.* — Forme assez courte et épaisse. Yeux très distinctement pubescents. Trois soies sterno-pleurales ; quatre soies dorso-centrales externes. Abdomen dépourvu de macrochètes discales. Ecusson roux avec quatre soies de chaque côté, les deux postérieures se croisant. Ailes vitrées, jaunies à la base, ainsi que les nervures. Ecailles testacé jaunâtre. Thorax avec quatre raies, les deux externes interrompues à la suture. Sous-orbite nue. Interocelle avec deux macrochètes dressées en avant. Ocelles disposés en triangle isocèle, beaucoup plus étroit à sa base. Macrochètes de l'interoculaire supérieur n'atteignant pas le sommet du deuxième article des antennes. Palpes testacés, rembrunis à la base. Première cellule postérieure aboutissant un peu avant l'extrémité de l'aile.

*Mâle.* — Téguments noirs avec les trois premiers segments de l'abdomen roux par transparence sur les côtés. Premier segment avec trois macrochètes de chaque côté de l'excavation scutellaire. Deuxième segment avec six macrochètes au milieu de son bord postérieur. Troisième segment entièrement bordé d'une couronne de macrochètes. Quatrième segment très hérissé. Tout le dessus de l'abdomen est hérissé de soies dressées, longues. Les trois premiers segments sont densément couverts d'une pulvérulence grise uniforme, sans taches ou marbrures ; le quatrième segment en est dépourvu et est noir brillant. Thorax pulvérulent comme l'abdomen avec quatre lignes noires. Interoculaire un peu plus de la moitié de l'œil. *Vibrisses de*

*l'arête nasale remontant jusqu'à la moitié, mais elles sont faibles et inclinées vers l'angulaire, les supérieures plus courtes que les inférieures.* Troisième article des antennes deux fois environ aussi long que le deuxième, linéaire, étroit, avec l'angle apical externe accusé, n'atteignant pas tout à fait le bord postérieur de l'épistome. Ongles et pulvilli longs, très développés.

*Femelle.* — L'abdomen est hérissé comme chez le mâle, mais le premier segment n'a qu'une macrochète de chaque côté de l'excavation scutellaire. Tout le dessus de l'abdomen, y compris le quatrième segment, est couvert d'une pulvérulence dense et uniforme, d'un jaune presque doré, ainsi que le thorax et le dessus de la tête jusqu'aux antennes, la partie inférieure est blanc argenté. Interoculaire presque aussi large que l'œil, avec deux soies orbitales externes dressées en avant. Arête nasale dépourvue de vibrisses, sauf deux ou trois serrées contre l'angulaire. Troisième article des antennes un peu plus épais que chez le mâle. Ongles et pulvilli courts. Longueur 8 à 10 millimètres.

Cette espèce doit prendre place dans le voisinage d'*Exorista immunita* Pand., d'*Exorista (Alsomyia B. B.) gymnodiscus* B. B.

Un mâle et une femelle capturés en juin, par M. Cl. Côte, dans le bois de Chazelay, près Villars-les-Dombes (Ain).