

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON
FONDÉE EN 1822

DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
RÉUNIES

et de leurs **GROUPES** de **ROANNE, VIENNE** et **VILLEFRANCHE-SUR-SAONE**

Secrétaire général : M. le D^r BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; *Trésorier* : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	{	France et Colonies Françaises	15 francs
		Etranger.. . . .	20 —

2.337 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Mardi 11 Février, à 20 h. 30

1^o Vote sur l'admission de :

M^{lle} Pavalier (Andrée), 90, rue de Charlieu, Roanne (Loire), parrains MM. Bertrand et Larue. — M. Guillaume (F.), 1, rue de Machine, Louveciennes (Seine-et-Oise), parrains M^{lle} S. Gindre et M. H. Gindre. — M. l'abbé Barge (Jean), 30, rue Sainte-Hélène, Lyon, parrains MM. Domet de Vorges et Tronchet. — M. le D^r Abel, 19, boulevard Maurice-Clerc, à Valence (Drôme), parrains MM. Réveillat et Josserand. — M^{me} Théobald (M.), 159, rue Nationale, Olivet (Loiret), parrains MM. D^r Riel et Guillemoz. — M^{lle} Cavalléra (Jeanne), 7, rue Brison, Roanne (Loire), parrains MM. Bertrand et Larue. — M. Goux (L.), professeur au Lycée Périer, boulevard Périer, Marseille (Bouches-du-Rhône) (réintégration). — M. Ratgris (François), préparateur en pharmacie, 4, rue de Marseille, Lyon (Rhône) (réintégration). — M. Kremli (Vladimir), 147, cours Emile-Zola, Villeurbanne (Rhône), parrains MM. Battetta et Gabier. — M^{lle} Dalphin (Marguerite), 24, chemin Feuillat, Lyon, parrains MM. Pouchet et Pelletier. — M. Bollard, instituteur, 15, rue Niepce, Lyon, parrains MM. Queney et Nétien.

2^o Questions diverses.

EXONÉRATION

M. A. SABATIER, pharmacien à Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-et-Loire), s'est inscrit comme membre à vie.

COURS DE MYCOLOGIE

Le cours gratuit et public de Mycologie, donné par M. P. GUILLEMOZ, avec la collaboration de M. DUROUSSAY, commencera le vendredi 14 février, à 20 h. 1/4, pour se continuer chaque vendredi, de 20 h. 1/4 à 21 h. 1/4.

Tout comme l'an dernier, MM. GUILLEMOZ et DUROUSSAY, s'efforceront de donner aux débutants de solides bases, qui leur permettront d'aborder plus facilement la mycologie sur le terrain.

En plus de ce cours, plus particulièrement destiné aux débutants, des études plus poussées de chaque genre, faites par un collègue qualifié, auront lieu les 1^{er} et 4^e lundis de chaque mois, aux Offices mycologiques de M. POUCHET, à partir du lundi 3 février.

COURS DE BOTANIQUE

Les cours de Botanique seront donnés, cette année, en février et mars, les jeudis, à 20 h. 30, par M. G. NÉTIEN, au siège, 33, rue Bossuet.

Objet du cours : Mois de février : la plante et son milieu (projections).

Mois de mars : conceptions actuelles de la géo-botanique (projections et films).

NOS CONFÉRENCES

Le jeudi 20 février, à 20 h. 30, au local de la Société, 33, rue Bossuet, M. G. NÉTIEN, chef de travaux à la Faculté de Médecine de Lyon, docteur ès sciences, fera une conférence sur le sujet suivant : « La prairie alpine en Oisans et dans les Hautes-Alpes » (avec projection d'un film réalisé au plateau d'Em-Paris, et de nombreux clichés).

PARTIE SCIENTIFIQUE

SECTION BOTANIQUE

Séance du Lundi 9 Décembre 1935

Lichens récoltés dans la région de Beaufort (Savoie)

Par M. A. TRONCHET

J'ai fait en août 1931, dans la région de Beaufort-sur-Doron (Savoie), des herborisations dont j'ai donné le compte rendu, en ce qui concerne les Phanérogames et Cryptogames vasculaires, dans le *Bulletin* de notre Société (Séance du 4 juillet 1932, *Bulletin* de février 1933), et au Congrès de l'A. F. A. S., tenu à Chambéry en 1933. Au cours de ces mêmes excursions,

j'avais récolté des Mousses et quelques Lichens. Ces derniers ont été communiqués pour étude à M. Choisy qui a bien voulu (et je l'en remercie) venir les déterminer à la Faculté. D'autre part, au cours des dernières vacances, en août 1935, j'ai fait dans la même région de nouvelles récoltes de Lichens que j'étudie actuellement. Avant d'en publier la liste, qui fera l'objet d'une communication ultérieure, je donne ici celle des espèces recueillies en 1931.

1° Beaufort (758 m.), autour des ruines du château de la Grande Salle :

Peltigera Gandogeriana Choisy (*Bull. Soc. Bot. de France*, t. LXXVIII, p. 453, 1931).

Parmelia physodes, var. *vittata* Ach.

Parmelia saxatilis (L.) Fr. form. *furfuracea* Schaer.

Parmelia saxatilis (L.) Ach. form. *isidians* (Oliv.) Zahlbr.

Parmelia omphalodes (L.) Ach. var. *fallax* Oliv.

Xanthoparmelia conspersa (Ehrh.) Ach.

Rhizocarpon geographicum DC apud Lam. et DC form. *contiguum* (Schaer.) Mass.

Aspicilia coesiocinerea (Nyl.) Arnold.

Diploschistes scruposus (Schr.) Norm. = *Urceolaria scruposa* Ach.

Crocynia membranacea Dicks.

Crocynia coesioalba Bouly de Lesd.

Cladina laxiuscula Delis.

Lecidea pantherina (Hoffm.) Ach.

Cladonia (Corynephora) Floerkeana (Fr.) Somm. var. *trachypodes* Wainio.

2° Rochers et bois le long de la route de Beaufort aux Fontanus (1.040 m.) et au Pont du Ré (1.440 m.) :

Peltigera (Peltidea) aptosa Willd.

Peltigera rufescens (Weis.) Humb.

Peltigera pulverulenta (Tayl.) Nyl.

Peltigera spongiosa (Tuck) Choisy n. c. = *P. canina* var. *spongiosa auctoribus*.

Peltidea variolosa (Mass.) Choisy n. c. = *P. aptosa* var. *variolosa* Mass.

Peltigera Gandogeriana Choisy.

Peltigera Troncheti Choisy n. sp. = *P. Degeni* Gyelnik sed thallus tenuis, pellucidus ; a *P. canina* typica differt thallus nitidus et pellucidus. Contributions lichénographiques. Décades IV-V. Contr. n. 41.

Parmelia physodes (L.) Ach.

Parmelia saxatilis (L.) Fr.

Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach.

Cetraria (Platysma) glauca (L.) Ach.

Evernia furfuracea form. *ceratea* Ach.

Pseudovernia isidiophora Zopf.

Letharia divaricata (L.) Hue.

Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. = *U. barbata* Web. 1780 s. str.

Cladina rangiferina (L.) Nyl.

Cladonia chlorophaea? (Floerk.) Zopf. form. *integra* Schr.

Cladonia chlorophaea (Floerk) Zopf. form. *costata* Floerk.

Cladonia (Chasmaria) furcata (Huds.) Schrad. var. *racemosa* (Hoffm.) Floerk.

Cladonia (Chasmaria) furcata var. *pinnata* (Floerk.) Wainio form. *foliolosa* Delis.

Cladonia fimbriata (L.) Sandst.
Cladonia degenerans (Floerk.) Spreng. form. *trachyna* Flk. sec. Anders.
Cladonia macilenta Hoffm. var. *styracella* (Ach.) Wainio.
Cladonia nemoxyza (Ach.) Nyl. form. *Rei* Schaerer.
Haplocarpon Choisy nov. gen. = *Lecidea* sed paraphyses ram. connexae ;
a. gen. *Rhizocarpon* diff. sporae simplices et probabiliter plurinucleae.
Haplocarpon macrocarpum Choisy n. c. = *Lecidea macrocarpa* (DC.) Steudel.
Haplocarpon sterizum Choisy = *Lecidea macrocarpa* (DC.) Steud. var. *steriza*
(Ach.) Wainio = *Lecidea steriza* Wainio 1909.
Haplocarpon sterizodes Choisy n. sp. Contrib. lichen. Déc. IV-V. Contr. n. 37.
Lecidea convexa Th. Fr.
Lecidea Brujeriana Leight.
Thelidium papulare (Fr.) Arn.
Stereocaulon sp.

3° Vallon de Roselend (1.474 m.), Rocher du Vent, Plan de la Lai (environ 1.900 m.).

Cetraria (Platysma.) juniperina (L.) Ach.
Cetraria islandica (L.) Ach.
Placodium elegans DC.
Lecanora epibryon Ach.
Cladonia (Cladina) laxiuscula Delis.
Cladonia pyxidata (L.) Fr.
Cladonia (Cenomyce) cervicornis Ach.
Cladonia elongata (Jacq.) Hoffm. var. *esquamosa* Anders form. *subdilacerata*
Wainio.
Cladonia chlorophaea (Floerk.) Zopf. ad formam *costatam* Flk. vergentes.
Lecidea vulgata A. Zahlbr.
Lecidea Brujeriana Leight = *L. coarctata* var. *Brujeriana* Schaer. ap. Dietrich
1846.

Sur quelques Hépatiques de Beaufort (Savoie)

Par M. A. TRONCHET

Au cours d'excursions faites au mois d'août 1935 dans les environs de Beaufort, j'ai recueilli des Mousses, Hépatiques et Lichens. L'étude de ces récoltes n'étant pas encore terminée je me bornerai aujourd'hui à une première et courte énumération concernant des espèces provenant de la région des Fontanus, hameau situé à 1.040 mètres d'altitude, près de la route de Roselend, à 4 km. 500 de Beaufort.

Je désire attirer surtout l'attention sur une espèce considérée comme assez rare : *Blasia pusilla* L. J'ai trouvé cette Hépatique à thalle en grande abondance sur la terre humide le long d'un sentier qui se détache de la route près des Fontanus et monte à travers bois au hameau du Bersend (1.115 m.). Elle n'était pas fructifiée mais portait les réceptacles en forme de bouteilles remplis de propagules et munis d'un long col qui permettent de reconnaître très facilement cette plante. On la trouve aussi, mais moins abondante, sur le talus de la route de Roselend, entre Beaufort et les Fontanus. Cette espèce avait été signalée par Vénance Payot dans le Massif du Mont Blanc, voisin du Beaufortain et plus récemment (1933) P. CULMANN en a indiqué six localités dans le bassin supérieur de l'Arve.