

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON
SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

ANNÉE 1922

NOUVELLE SÉRIE

TOME SOIXANTE-NEUVIÈME

αἱ βοτάναι σιγηλῶς τὸ ὠφελοῦν
προτάχονται.

LYON

JOANNÈS DESVIGNE & C^{IE}, LIBRAIRES-ÉDITEURS

36 A 42, PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU

1923

NOUVEAUX COLÉOPTÈRES EXOTIQUES

PAR

MAURICE PIC

Mémoire présenté à la Société Linnéenne de Lyon.
en la séance du 12 décembre 1921.

PLATERODRILUS CRASSICORNIS n. sp. *Elongatus, rufus, antennis pedibusque pro majore parte nigris, elytris nigris, ad basin late rufis.*

Allongé, roux, antennes et majeure partie des pattes noires ; élytres noirs, largement roux à la base. Tête robuste avec les yeux gros ; antennes courtes, à articles médians élargis, noires avec les 3 premiers articles roussâtres ; prothorax court, arqué en avant ; élytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles, finement et multi-striés, noirs avec presque la moitié antérieure rousse, cette coloration mal limitée ; pattes foncées avec la base des cuisses et les hanches rousses.

Long 7 m/m.

Sumatra (coll. Pic).

Voisin de *P. Corporaali* Pic et distinct, à première vue, par les antennes à 4^e article et suivants moins longs et élargis.

PLATEROS BREVELINEATUS n. sp. *Parum elongatus, niger, thorace, illo in disco nigro notato, elytrisque purpureo-testaceis, his ad suturam pro parte nigro lineatis.*

Peu allongé, noir, sauf le prothorax et les élytres d'un pourpre testacé, le premier étant maculé de noir au milieu et les élytres ornés d'une bande présuturale noire effacée postérieurement. Tête bien plus étroite que le prothorax ; antennes épaisses ; prothorax transversal, droit sur les côtés, un peu prolongé en avant sur son milieu, faiblement impressionné

postérieurement ; élytres pas plus larges que le prothorax, faiblement et multicostés, largement ponctués ; pattes foncées, fémurs en partie teintés de testacés à la base.

Long. 7 m/m.

Formose (coll. Pic).

Voisin de *P. tuberculatus* Pic, prothorax différent, élytres plus longs, ornés d'une bande antérieure et présuturale noire.

PLANETEROS BICOLORIPES n. sp. *Elongatus, testaceus, antennis ad medium tibisque pro parte nigris.*

Allongé, testacé, sauf le milieu des antennes et les tibias en partie noirs. Tête de la largeur du prothorax ; antennes épaisses, atténuées à l'extrémité, noires avec les 2 à 4 derniers articles testacés ; prothorax transversal, un peu arqué en avant et faiblement échancré sur les côtés, courtement impressionné postérieurement ; élytres faiblement et multicostés, à ponctuation large ; pattes testacées avec les tibias en partie noirs.

Long. 6 m/m.

Sierra Leone (coll. Pic).

Voisin de *P. flavus* Brg., en diffère par le 8^e article des antennes testacé, les tibias non entièrement noirs, etc.

BULENIDES PURPUREUS n. sp. *Parum elongatus, niger, thorace pro majore parte, scutello elytrisque purpureis.*

Peu allongé, noir, prothorax, celui-ci rembruni postérieurement, écusson sur le pourtour et élytres pourprés ; antennes assez robustes, longuement pectinées ; prothorax peu long, rétréci en avant, à angles postérieurs très saillants ; élytres à 4 côtes nettes, avec les intervalles à deux rangées de points médiocres.

Long. 9 m/m.

Formose (coll. Pic).

Plus robuste et plus grand que *B. testaceus* Pic, avec les élytres pourprés.

HETEROTARSUS SUBINFLATUS n. sp. *Oblongus, nitidus, niger, thorace lateraliter undulato, sparse punctato; elytris striatis, intervallis convexis.*

Oblong, brillant, noir. Antennes longues, un peu épaissies à l'extrémité ; tête avec une petite carène près des yeux, inégale en dessus, moins éparsément ponctuée que le prothorax, celui-ci ondulé sur les côtés, à angles antérieurs non saillants ; ponctuation espacée sur le disque ; élytres modérément larges, striés avec les intervalles convexes, à ponctuation indistincte mais subalutacés.

Long. 13-14 m/m.

Chine (coll. Pic).

Voisin de *H. inflatus* Lac., élytres moins larges, prothorax à angles antérieurs non saillants, etc.

HETEROTARSUS ROTUNDICOLLIS n. sp. *Oblongus, nitidus, niger, thorace antice lateraliter rotundato, dense punctato; elytris punctato-striatis, intervallis parum convexis, minute punctatis.*

Oblong, brillant, noir ; antennes assez longues, à dernier article subovalaire ; tête densément ponctuée ; prothorax densément ponctué, court, nettement arrondi sur les côtés antérieurs d'où angles tout à fait nuls, les postérieurs peu marqués, presque droits ; élytres peu larges, un peu dilatés postérieurement, entre les stries ponctués de points forts, intervalles peu convexes, finement ponctués.

Long. 11 m/m.

Côte d'Ivoire (coll. Pic).

Espèce caractérisée par la structure de son prothorax ; à placer près de *H. bogosensis* Mars.

HETEROTARSUS CEPHALOTES n. sp. *Elongatus, nitidus niger; thorace breve, antice lateraliter subrotundato; elytris minute striato-punctatis, intervallis subconvexis.*

Allongé, brillant, noir, antennes courtes, à dernier article

large ; tête grosse par rapport au prothorax, à épistome peu échancré, peu densément ponctuée ainsi que le prothorax, ce dernier court, subarrondi en avant latéralement, angles postérieurs un peu saillants en arrière ; élytres subparallèles, striés, les stries modérément ponctuées, intervalles peu convexes, sans ponctuation appréciable.

Long. 11-12 m/m.

Zanguebar (coll. Pic).

Espèce voisine de la précédente plus allongée et très caractérisée par sa large tête et les angles postérieurs du prothorax projetés en arrière.

CTENIOPINUS RUBER n. sp. *Elongatus, parum nitidus, ruber, antennis tarsisque pro parte brunnescentibus, sutura elytrorum nigra.*

Allongé, peu brillant, rouge avec les antennes et les tarses rembrunis en partie, suture noire. Tête longue, densément ponctuée ; prothorax assez court, un peu rétréci en avant, densément ponctué ; élytres nettement plus larges que le prothorax, assez longs, modérément striés-ponctués à intervalles densément ponctués.

Long. 15 m/m.

Yunnan (coll. Pic).

Sa coloration pourprée distinguera, à première vue, cette espèce des autres du genre.

CTENIOPINUS SEMIRUFUS n. sp. *Satis elongatus, parum nitidus, rufo-testaceus, elytris et infra corpore sulphureis, abdomine pro parte nigrescente.*

Assez allongé, peu brillant, roux-testacé avec les élytres et le dessous sulphureux, l'abdomen en partie obscurci. Tête longue et étroite ; prothorax assez court, rétréci en avant ; élytres finement striés-ponctués, à intervalles indistinctement ponctués.

Long. 13 m/m.

Thibet (coll. Pic).

Voisin de *C. hypocritus* Mars., moins allongé et de coloration différente.