

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
RÉUNIES
et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, etc.

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6^e)

ABONNEMENT ANNUEL C. C. P. Lyon 101-98	France et Colonies Françaises	500 francs
	Etranger	600 —

PARTIE ADMINISTRATIVE

AVIS DU TRÉSORIER

Le Trésorier remercie les nombreux Sociétaires qui ont réglé la cotisation 1953. Il rappelle aux retardataires de ne pas manquer, dès réception de ce quatrième Bulletin, de se mettre à jour.

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION : Mardi 14 Avril, à 20 h. 15

Admission de :

M. Lucien GAGNOL, Professeur au Collège Moderne de Roanne, rue Joseph-Fouillant, Riorges (Loire), parrains MM. Larue et Guy. — M. Jacques SURÉL, 1, rue Lucien-Sampaix, Roanne (Loire), parrains Mme Colon et M. Dieudonné. — Mlle Marie-Louise SOUCHON, 10, avenue de Paris, Roanne (Loire), parrains Mmes Fontaine et Varambon. — M. Charles DOUCHET, Ecole du Service de Santé Militaire, avenue Berthelot, Lyon, parrains MM. D^{rs} Viallier et Roman.

Questions diverses.

SECTION ENTOMOLOGIQUE : Samedi 11 Avril, à 15 heures

C. DENNINGER : Sur la présence à Lyon de *Lyctus brunneus* Steph. (Col. Lyct.).
Présentation d'insectes. — Questions diverses.

SECTION BOTANIQUE : Samedi 11 Avril, à 17 heures

† A.-J. BANGE : Sur la distribution actuelle en France de *Genista horrida*.
M. CHOISY : Causerie d'initiation à la Lichénologie.
Présentation de Plantes. — Questions diverses.

moins abondantes que celles-ci : 6 ex. en juillet, septembre et octobre 1952.

Les deux espèces suivantes proviennent de St-Genis-Laval (Rhône) au Sud de Lyon, mais ont été prises de la même façon :

Cryphia ochsi Brsn. — Point de capture le plus septentrional en France. Espèce non encore signalée du Lyonnais. 5 ex. en juillet et août 1951, parmi un grand nombre de *C. algae* F. (BOURSIN dét.).

Cryphia ravula Hb. ssp. *ravulatra* Aubert i. l. — Cette forme que M. AUBERT décrira dans une prochaine note, représente l'espèce à St-Genis-Laval (et sans doute dans le Lyonnais), où elle est plutôt commune en juillet et août.

Enfin je profite du présent travail pour signaler l'existence à Saint-Michel-l'Observatoire, d'*Eilema uniola* Rbr. Mon attention avait été attirée sur cette espèce par l'intéressant article de M. DE TOULGOËT⁸. *E. uniola* Rbr. n'était pas rare pendant la seconde quinzaine d'août et le mois de septembre 1952, elle venait à la lampe avec des *E. pallifrons* Z., *palliatella* Scop. et *caniola* Hb., dont elle diffère nettement par sa plus petite taille (22-26 mm.) et ses antérieures à léger reflet argenté et à côte concolore. C'était, cet été, la plus fréquente de ces quatre *Eilema*.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 10 Janvier 1953.

8. Rev. Fr. Lépidopt., T. XIII, 1952, p. 181.

VERONICA LAMIIFOLIA HAYNE, DANS L'AIN

par L. BOUVEYRON.

Tout le monde connaît la Véronique petit-chêne commune le long des chemins et des haies, au bord des champs et des bois. Sans en donner la description complète, disons que c'est une plante herbacée, printanière, aux feuilles opposées, fortement dentées en scie, *non pétiolées*, aux jolies fleurs d'un bleu de ciel veinées de violet, blanches au centre et disposées en grappes longuement pédonculées.

Cette petite Véronique présente une variété qui nous paraît rare puisque nous ne l'avons rencontrée qu'une seule fois dans l'Ain, depuis plus de quarante années d'herborisations. Cette variété présente des feuilles *toutes pétiolées*, des grappes de fleurs opposées, égalant la tige. Les botanistes l'identifient sous le nom de : *Veronica chamaedrys* L., var. *lamiifolia* Hayne.

C'est au cours d'une excursion botanique à la ruine du château de Lomont, face à Nivigne, point culminant du Revermont, que, dans les bois humides, nous avons trouvé la Véronique à feuilles de Lamier. Depuis, nous avons recherché cette variété dans toute la chaîne jurassienne, mais sans aucun résultat. La Flore complétive de P. FOURNIER signale cette plante comme rare. Nous possédons maintenant cette forme remarquable, en quelques échantillons, dans notre herbier.

Présenté à la Section Botanique en sa séance du 10 Janvier 1953